

Astron.

Obs.

QB

1
M73

15703
28

MONATLICHE
CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG
DER *Leibnizianischen*
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

vom

Freyherrn F. von ZACH,
Herzoglichen Sachsen-Gothaischen
Oberhofmeister.

JULIUS 1813.

G O T H A,
in der Beckerschen Buchhandlung.



Der Zweck dieser *Monatlichen Correspondenz* ist: Die Freunde der *Erd- und Himmels-Kunde* und der dahin einschlagenden Wissenschaften und Künste von den Fortschritten, welche von Zeit zu Zeit in diesen Fächern der Gelehrsamkeit geschehen, frühzeitig zu benachrichtigen. Sie beruht auf einer von dem Herrn Herausgeber mit vielen gründlichen Gelehrten im Fache der Astronomie und Geographie (beydes im weitesten Sinne,) in den verschiedenen europäischen Staaten getroffenen Uebereinkunft, ihm die Resultate ihrer Forschungen, Beobachtungen und Lectüre mitzutheilen, um solche mittelst dieser Zeitschrift sowohl gegenseitig auszuwechseln, als auch durch öffentliche Bekanntmachung gemeinnützig zu machen.

Sie enthält also:

- I. Neue eigene Aufsätze der Herren Correspondenten über Gegenstände der Astronomie, der mathematischen, physischen und politischen Geographie, und der zu diesen Fächern gehörigen Hilfswissenschaften und Fertigkeiten, welchen, wo es zur Erläuterung nothwendig ist, Zeichnungen, Pläne und Landkarten beygefügt werden.
- II. Einzelne eigene Beobachtungen, Erfahrungen, Entdeckungen und Erfindungen in diesen Wissenschaften.
- III. Urtheile und Nachrichten von neuen in diese Wissenschaften einschlagenden Schriften, wodurch die Wissenschaft erweitert oder berichtigt wird.
- IV. Beurtheilende Nachrichten von neuen Landkarten, Plänen, astronomischen und mathematischen Werkzeugen u. s. w.
- V. Biographische Nachrichten von Männern, die in diesen Fächern viel geleistet haben, mit ihren Bildnissen.
- VI. Berichte von Reisenden, die auf die Länder- und Völkerkunde Bezug haben.

2711

MONATLICHE
CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

vom

Freyhern F. von ZACH,

Herzoglichen Sachsen-Gothaischen Oberhofmeister.

XXVIII. BAND.

G O T H A,

im Verlage der Becker'schen Buchhandlung.

1 8 1 3.

MONATLICHE
CORRESPONDENZ
ZUR BEFÖRDERUNG
DER
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

JULIUS 1813.

I.

Untersuchung
über die
Elemente der Merkurs-Bahn *).

Nach Beendigung meiner Untersuchungen über die Theorie der Marsbahn, war ich anfangs ungewiss, welchen Planeten, ob ich den von der Sonne entfernen-

*) Wir liefern hier im Auszug die Resultate einer Arbeit, deren Details, in einer in wenig Wochen in der Beckerschen Buchhandlung herauskommenden Schrift: "*Investigatio nova orbitae a Mercurio circa Solem descriptae; accedunt tabulae planetarum ex elementis recens repertis, et theoria gravitatis ill. de la Place constructae*," enthalten sind.

v. L.

ferntesten oder ihr zunächst seine Bahn beschreibenden, zum Ziel einer ähnlichen Bearbeitung wählen sollte. Nur diese beyden Planeten sind es unter den ältern, deren Bahnen noch nicht so bestimmt sind, wie es der Zustand der heutigen Sternkunde wohl verlangt, und da sich *Bouvard* schon seit einiger Zeit mit dem Uranus beschäftigt, so bestimmte dies mich zu einer neuen Untersuchung der Merkursbahn. Trotz der vielen vortrefflichen Arbeiten, die in neuern Zeiten von mehreren Astronomen und namentlich von *Lalande*, *Oriani*, *Triesnecker*, *Wurm* und *Delambre* über diesen Gegenstand geliefert worden sind, schien es mir doch, als werde eine neue Discussion der Merkurs-Theorie, aus doppeltem Grunde, den vorhandenen Hülfsmitteln und dem Bedürfnis der Wissenschaft angemessen seyn. Einmal waren bey allen diesen frühern Untersuchungen, fast immer ausschliessend nur die Durchgänge zur Bahnbestimmung benutzt worden, und dann waren auch dabey die vollständigen Störungs-Gleichungen, wie sie *La Place* im dritten Bande der *Mécaniq. cél.* gegeben hat, unberücksichtigt geblieben. So wenig es in Zweifel gezogen werden kann, daß die durch die Durchgänge gegebenen heliocentrischen Merkurs-Orte, den sichersten Grund jeder Merkurs-Theorie abgeben, so ist doch auch das Zuhülfe-Nehmen guter geocentrischer Beobachtungen hier um so passender, da alle jene Durchgänge nur in zwey Puncten der Bahn statt fanden, und dadurch deren Bestimmung bloß aus diesen minder zuverlässig wird. Wenn in dieser Hinsicht eine Verbesserung der vorhandenen Bestimmungen noch mit einiger Wahrscheinlichkeit

erwar-

erwartet werden konnte, so bot eine neue Bearbeitung der Mercur-*Theorie* auch noch ein anderes theoretisches Interesse dar, was uns mit hauptsächlich zu der vorliegenden Untersuchung veranlaßte. Den Astronomen ist es zur Gnüge bekannt, wie schwankend noch immer unsere Massen Bestimmungen aller Planeten ohne Sattelliten sind, und daß es dazu kein anderes und besseres Mittel gibt, als die Vergleichung der beobachteten Störungen, mit den durch die Theorie gegebenen. Zwar hat man auf diesem Wege durch die Discussionen von *Wurm*, *Triesnecker* und *Delambre* für Venus und Mars Bestimmungen erhalten, deren Bestätigung aber immer sehr wünschenswerth ist, da bey Untersuchungen dieser Art, eine Schärfe der Beobachtungen supponirt wird, die für einzelne imaginär seyn würde, und nur durch Vereinigung einer großen Anzahl erreicht werden kann.

Besonders ist für das ganze System der Astronomie, die genaue Kenntniß der Venus-Masse sehr wichtig, da von dieser die Secular-Abnahme der Schiefe der Ecliptik hauptsächlich abhängt. *La Place* nahm diese $= \frac{1}{383137}$ an, (*Méc. cél.* T. III S. 61); aus Sonnen-Beobachtungen fand *Delambre* für diese Größe den Corrections-Factor $= 1,0743$, während im Gegentheil die in den letzten 50 Jahren beobachtete Abnahme der Obliquität eine Verminderung der Venus-Masse zu verlangen scheint. *) Zu Erlangung
neuer

*) Nach einer neuern Aeußerung des Grafen *La Place*, kann diese scheinbare Anomalie, durch eine periodische, von der Verschiedenheit beyder Erd-Halbkuugeln, abhängende Gleichung erklärt werden. v. L.

neuer Bestimmungen über diesen Gegenstand, eignet sich die Merkurs-Theorie ganz besonders; da die Venusmasse den vorzüglichsten und beynahe alleinigen Einfluß, auf Störung der außerdem beynahe rein elliptischen Merkurs-Bewegung hat. Dem gemäß war der Gang und Zweck meiner Arbeit gleich vom Anfang auf folgende zwey Gegenstände gerichtet:

1. *Bestimmung der Venusmasse, aus den vorhandenen vorzüglichsten Merkurs-Beobachtungen.*
2. *Bestimmung der heliocentrischen Merkursbahn, die allen Beobachtungen am besten genug thut.*

In wiefern es mir gelungen ist, diesen Zweck zu erreichen, werden Astronomen aus der nachfolgenden Darstellung beurtheilen können. Die Untersuchung selbst verfällt in vier Abschnitte, von denen zwey sich mit den beobachteten Merkurs-Durchgängen, zwey mit den aus Meridian-Beobachtungen hergeleiteten geocentrischen Merkurs-Oertern beschäftigen. Die vorläufig supponirten Elemente der Merkursbahn, deren Verbesserung gesucht wurde, waren folgende:

Epoche 1750 Seeb. Merid.	$8^{\text{h}} 13^{\circ} 5' 24,0''$ n. Triesn.		
Aphel.	8 13 33 29, 0	-	-
Excentricität	0 2056528	-	-
Motus annuus	$1^{\text{s}} 23^{\circ} 43' 3,5''$	-	-
Knoten	1 15 20 43, 0 n. Lalande		
Neigung	$7^{\circ} 0' 0''$	-	-
Jährl. Aender. des Aphel. =	55,74 nach La Place		
- - - des Knoten =	42, 54	-	-
- - - der Excent. =	+ 0,00684	-	-
- - - der Neig. =	+ 0, 1772	-	-

Venus-

Venus-Masse = $\frac{1}{383137}$, so wie solche bey den periodischen und den eben angegebenen Secular-Aenderungen der Mercursbahn zum Grunde liegt.

Zuerst wurden die Durchgänge discutirt und zu einer doppelten Bestimmung benutzt, nachdem eine vorläufige Vergleichung mit den eben angeführten Elementen gezeigt hatte, daß alle noch daran anzubringende Correctionen in den Gränzen einer kleinen Anzahl von Secunden eingeschlossen seyn mußten, wodurch einige im Laufe der nachherigen Untersuchungen, gemachte Voraussetzungen, erlaubt und rechtmäßig wurden.

Aus den Durchgängen, die eine genaue Breitenbestimmung zuließen, wurde der Knoten nebst dessen jährlicher Bewegung hergeleitet und dadurch die erste Gleichung für die Venus-Masse erhalten.

Die Anwendung eines anderweiten Verfahrens, aus diesen Durchgängen, die jährliche Aenderung des Apheliums, und die mittlere Bewegung in der Bahn, ohne genaue Kenntniß der übrigen elliptischen Elemente zu bestimmen, wurde durch die Eigenthümlichkeit möglich, daß alle in einerley Knoten eintretenden Durchgänge, immer sehr nahe in denselben Puncten der Bahn statt finden, und dadurch die Elimination von Fehlern, in Epoche, Excentricität und Aphelium erlauben. Die hieraus gefundene Bewegung des Apheliums, verglichen mit der durch die Theorie gegebener, gab eine zweyte Bestimmung der Venusmasse an die Hand.

Die elliptischen Elemente selbst, mittlere Bewegung, Aphelium, Epoche und Excentricität, nebst dem Corrections-Factor für die angenommene Venus-

Masse, mit der die Störungen bey Vergleichung der beobachteten und berechneten Oerter bestimmt worden waren, wurden aus siebzehn durch die Durchgänge gegebenen heliocentrischen, und hundert geocentrischen Merkurs - Längen hergeleitet. Einfluß von Neigung und Knoten, beyde aus den vorherigen Rechnungen schon nahe bekannt, konnte hier ganz unbedenklich vernachlässiget werden. Die gehörige Behandlung dieser hundert und siebzehn Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate, gab die gesuchten Verbesserungen der elliptischen Elemente, und zugleich auch die dritte Gleichung für den Corrections - Factor der supponirten Venusmasse. Mit diesen verbesserten Elementen, und den nach *La Lande* angenommenen für Knoten und Neigung wurden nun die heliocentrischen Breiten berechnet, die beobachteten geocentrischen mit dem Radius der verbesserten Elemente auf heliocentrische reducirt, und dadurch hundert Bedingungs - Gleichungen zu genauer Bestimmung von Neigung und Knoten erhalten. Mein Wunsch, die Neigung noch für eine frühere Epoche bestimmen, und daraus eine vierte Gleichung für die Venusmasse herleiten zu können, wurde durch den Mangel tauglicher Beobachtungen vereitelt. — Dies war der Gang meiner Bearbeitung im Allgemeinen, deren Detail nun dargelegt werden soll.

I. *Bestimmung von Knoten, dessen jährlicher Aenderung und Neigung der Bahn, aus den beobachteten Merkurs-Durchgängen.*

Jeder Merkurs-Durchgang gibt einen heliocentrischen Ort, der nahe am Durchschnitt der Planetenbahn mit der Ecliptik liegt. Der Abstand beyder wird durch gegenseitige Neigung und durch die heliocentrische Breite des Planeten bestimmt. Ist dieser Abstand bekannt, so folgt dann aus der Länge des Sonnen- oder Merkurs-Ortes, auch unmittelbar die des Knotens. Da hier so wie bey allen nachherigen Rechnungen die Sicherheit der Bestimmungen, hauptsächlich mit von der Richtigkeit der Sonnen-Längen abhng, so bin ich überall, wo es nur möglich war, daraufbedacht gewesen, die Sonnentafeln aus guten Beobachtungen zu verbessern. Da die hierdurch veranlaßten Vergleichen von mehr als hundert und funfzig Sonnen-Oertern, zum größern Theile, schon bey einer andern Gelegenheit abgedruckt worden sind, so halte ich es für unnöthig, solche hier noch einmal bezubringen, und füge daher nur die Bemerkung bey, daß alle nachherige Sonnenörter auf diesen verbesserten Bestimmungen beruhen.

Sey λ heliocentrische Merkurs-Länge, β , b heliocentrische und geocentrische Breite, i Neigung, D Abstand des Planeten vom Knoten in der Ecliptik, K Knotenlänge, so ist

$$\sin D = \frac{\tan \beta}{\tan i}$$

und

und jeder Merkurs-Durchgang gibt die Gleichung

$$\lambda \mp D \mp K = 0;$$

woraus K folgt. Um daher die Genauigkeit bestimmen zu können, mit der auf diese Art K erhalten wird, muß es untersucht werden, in wiefern Fehler in β und i auf den Werth von D influiren. Es ist,

$$dD = d\beta \frac{\operatorname{tang} D}{\sin \beta} - di \cdot \operatorname{tang} D \cotg. i \quad (I)$$

Seyen Δ , r Abstände des Mercur von Erde und Sonne, so ist

$$\operatorname{tg.} \beta = \frac{\Delta}{r} \cdot \operatorname{tg.} b$$

und bey Merkurs-Durchgängen mit einer hier ausreichenden Genauigkeit

$$\operatorname{tg.} \beta = \frac{1-r}{r} \cdot \operatorname{tg.} b$$

$$d\beta = -dr \frac{\operatorname{tg.} b \cos^2 \beta}{r^2} + db \cdot \frac{(1-r) \cdot \cos^2 \beta}{r \cdot \cos^2 b}; \quad (II)$$

Bey beobachteten Ein- und Austritten, oder bey gemessenen Abständen Merkurs von den Sonnen-Rändern, wird db oder der Fehler der geocentrischen Tafelbreite unmittelbar aus den Beobachtungen hergeleitet, und kann daher in der Gleichung (II) $= 0$, gesetzt werden. Da aber der Coefficient von db in (II) zwey und der von $d\beta$ in (I) acht beträgt, und hiernach eine Secunde in geocentrischer Breite, den Abstand des Planeten vom Knotenpunct um 16—17" irrig machen kann, so folgt daraus die Nothwendigkeit, zu der Bestimmung von der jetzt die Rede ist, nur solche Durchgänge zu benutzen,

wo

wo sich der Breitenfehler der Tafeln mit Sicherheit ausmitteln läßt.

Das Maximum des möglichen Einflusses von dr läßt sich so bestimmen, Für den größten Werth von $b = 16'$ wird

$$d\beta = 8000'' dr$$

wo dr in Theilen des Radius ausgedrückt ist; soll $d\beta = 1''$ werden, so muß $dr = 0,00012$ seyn. Nun ist $M = \text{anom. med.}$; $a = \text{semi axis major}$,

$$dr = \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) da + (ae + \cos M) de$$

$$= 1,02 da + 0,405 de$$

wenn für a , e , die numerischen Werthe und für M , 30° (so wie dies bey den Durchgängen der Fall ist) substituirt wird.

Dass die Correction der oben angenommenen mittlern jährlichen Bewegung keine zwey Secunden betragen könne, hatten frühere Rechnungen außer allen Zweifel gesetzt, und da

$$da = -\frac{2}{3} \cdot \frac{a}{nt} dnt \quad (nt = \text{motus annuus } \S)$$

hiernach da weniger als $0,0000001$ beträgt, so wird

$$dr = 0,405 de$$

und sollte nun dr , durch ein de , den Werth von $0,00012$ erhalten, so müßte

$$de = \frac{0,00012}{0,405} = 0,000296 = 61''$$

seyn; eine Correction, die vermöge einer vorläufigen Vergleichung der Durchgänge mit den supponirten Elementen, ebenfalls unmöglich wird.

Es

Es kann also, die Beobachtungen als fehlerfrey angenommen, der berechnete Abstand D nur durch einen Fehler in der angenommenen Neigung irrig gemacht werden, weshalb in der Bedingungs-Gleichung ein Glied

$$- di. tg. D. cotg. i$$

mit aufgenommen werden muß,

Sey nun der angenommene Knoten für die Epoche von 1750 $= K$; jährliche Knoten-Bewegung nach *La Place* $= nK$, T , Epoche des Durchganges, Correction des Knotens $= d\Omega$, so ist mit Beybehaltung der vorherigen Benennungen,

$$\lambda - K - (T - 1750)nK - d\Omega - \text{arc. sin}\left(\frac{tg.\beta}{tg.i}\right) + di. tg. D \cotg. i = 0;$$

nennt man $1 + \mu$ den Corrections-Factor für die angenommene Bewegung des Knotens und entwickelt

$$\text{arc. sin.}\left(\frac{tg.\beta}{tg.i}\right) \text{ so folgt}$$

$$\lambda - K - (T - 1750)nK(1 + \mu) - d\Omega + di. tg. D \cotg. i - 8'' 14434\beta - 0,00000000218006\beta^3 = 0; \quad (A)$$

wo β oder die heliocentrische Breite in Secunden ausgedrückt werden muß. Die Zeichen dieses Ausdrucks gelten für aufsteigenden Knoten und nördliche Breite; bey südlicher ändern sich die der drey letzten Glieder. Das umgekehrte findet heym ϑ statt. Jeder Mercur's-Durchgang gibt eine solche Gleichung, aus deren Complexu, μ , $d\Omega$, und di bestimmt werden muß. Mit sorgfältiger Benutzung der vorzüglichsten Beobachtungen und Anwendung der Rechnungs-Elemente so wie sie die heutige Astro-

nomie

nomie gewährt, wurden überhaupt siebenzehn Durchgänge in Rechnung genommen und daraus folgende Resultate erhalten:

Jahr	Mittl. Zeit in Seeberg	Beobachtete heliocentrische ☿ Länge	Beob. geocentrische ☿ Breite
1631 6 Nov.	20 ^U 5 36, 2	44° 41' 28, 7	. . .
1661 3 May	5 15 49, 5	223 33 18, 2	. . .
1677 7 Nov.	0 54 2, 6	45 44 16, 7	0° 4' 14, 1
1690 9 Nov.	18 37 32, 2	48 20 28, 5	. . .
1697 2 Nov.	18 1 24, 0	41 34 37, 3	0 10 52, 9
1723 9 Nov.	5 44 13, 8	46 47 20, 4	0 5 53, 5
1736 10 Nov.	23 27 17, 2	49 23 25, 6	0 14 9, 3
1740 2 May	11 2 55, 1	222 43 14, 5	. . .
1743 4 Nov.	22 53 18, 4	42 37 58, 5	. . .
1753 5 May	18 56 36, 3	225 47 33, 5	0 2 19, 5
1756 6 Nov.	16 43 38, 4	45 13 45, 2	0 0 59, 1
1769 9 Nov.	22 34 39, 5	47 50 36, 8	0 7 38, 2
1782 12 Nov.	4 14 52, 2	50 26 36, 2	0 15 54, 9
1786 3 May	17 45 30, 3	223 49 42, 5	0 11 38, 6
1789 5 Nov.	3 43 54, 2	43 40 43, 6	0 7 25, 9
1799 7 May	1 42 14, 4	226 54 21, 8	0 5 45, 7
1802 8 Nov.	21 36 7, 2	46 17 13, 6	0 0 59, 0

Der Durchgang von 1651 mußte weggelassen werden, da er zu stark von allen andern abweicht; nur aus zwölf beobachteten Durchgängen, konnten die geocentrischen Breiten mit der Sicherheit bestimmt werden, um zur gegenwärtigen Bestimmung angewandt zu werden. Substituirt man die vorstehenden Werthe in dem Ausdruck A , und nimmt dabey auf die Modification der Coefficienten von β , β^3 hinsichtlich der Secular-Aenderung der Neigung gehörig Rücksicht, so wird folgendes System von Bedingungen-Gleichungen erhalten:

$$\begin{aligned}
1677 &+ 32,0 - \delta \Omega + 3072,1 \mu + 0,178 \delta i = 0; \\
1697 &+ 69,2 - \delta \Omega + 2218,8 \mu - 0,450 \delta i = 0; \\
1723 &+ 90,8 - \delta \Omega + 1112,2 \mu + 0,248 \delta i = 0; \\
1736 &+ 94,9 - \delta \Omega + 559,1 \mu + 0,595 \delta i = 0; \\
1753 &+ 68,5 - \delta \Omega - 142,9 \mu + 0,055 \delta i = 0; \\
1756 &+ 73,5 - \delta \Omega - 291,1 \mu - 0,028 \delta i = 0; \\
1769 &+ 79,4 - \delta \Omega - 843,5 \mu + 0,339 \delta i = 0; \\
1782 &+ 58,5 - \delta \Omega - 1399,9 \mu + 0,668 \delta i = 0; \\
1786 &+ 47,7 - \delta \Omega - 1546,3 \mu - 0,280 \delta i = 0; \\
1789 &+ 81,2 - \delta \Omega - 1695,2 \mu - 0,310 \delta i = 0; \\
1799 &+ 42,0 - \delta \Omega - 2099,4 \mu + 0,139 \delta i = 0; \\
1802 &+ 51,8 - \delta \Omega - 2249,2 \mu + 0,042 \delta i = 0;
\end{aligned}$$

und hieraus mittelst der Methode der kleinsten Quadrate

$$\begin{aligned}
&- 779,5 + 12,0 \delta \Omega + 3306,0 \mu - 1,196 \delta i = 0; \\
&- 184468 + 3306,0 \delta \Omega + 33417740 \mu - 491,72 \delta i = 0; \\
&+ 91,29 - 1,196 \delta \Omega - 491,72 \mu + 1,4102 \delta i = 0; \\
&\delta \Omega = + 64,17; \mu = - 0,0009851; \delta i = - 10,32.
\end{aligned}$$

Mit Substitution dieser Werthe sind die übrig bleibenden Fehler in den vorstehenden Gleichungen folgende:

	Fehler ohne Corr.	Fehler mit Corr.
1677	+ 32,0	- 37,0
1697	+ 69,2	+ 7,4
1723	+ 90,8	+ 23,0
1736	+ 94,9	+ 24,1
1753	+ 68,5	+ 3,8
1756	+ 73,5	+ 9,9
1769	+ 79,4	+ 12,6
1782	+ 58,5	- 11,0
1786	+ 47,7	- 12,0
1789	+ 81,2	+ 21,9
1799	+ 42,0	- 21,6
1802	+ 51,8	- 10,7

Ohne

Ohne Correction ist die Summe der Fehler der Quadrate $= 55854^{\circ}$, mit den verbesserten Werthen $= 4143$.

Aus dem Werth von μ folgt die Gleichung für Correction der Venus-Masse auf folgende Art: Nach *La Place* ist (*Méc. cél.* Tom. III.)

$$\begin{aligned} \text{jährl. Aenderung des } \Omega &= 50,11 - 7,566 - 4,054 \mu' \\ \text{nach mir} &= (50,11 - 7,566) \cdot \mu' \\ &= 42,5021 \end{aligned}$$

hiernach

$$(I) + 0,0419 - 4,054 \cdot \mu' = 0;$$

II. Bestimmung der mittlern Merkurs-Bewegung in der Bahn, und der jährlichen Aenderung des Apheliums, aus den durch die Durchgänge gegebenen heliocentrischen Längen.

Da, wie wir im Eingange bemerkten, alle gleichartige Durchgänge, das heisst, alle in einerley Knoten statt findende, sehr nahe immer in denselben Puncten der Bahn wiederkehren, so wird es dadurch möglich, die beobachteten heliocentrischen Längen in der Ecliptik, auf mittlere in der Bahn zu reduciren, und daraus die jährliche Aenderung des Apheliums zu bestimmen, ohne dass irgend ein anderes Element, als mittlere jährliche Bewegung, diese Reduction irrig machen könnte. Freylich werden dabey schon genäherte Elemente der Mercursbahn vorausgesetzt, wie dies denn aber auch mit den oben angegebenen wirklich der Fall ist. Jede zwey auf diese Art reducirten und verglichenen Längen geben eine Bedingungs-Gleichung, die nur Correction der

ange-

angenommenen mittlern Bewegung, und jährliche Aenderung des Apheliums, als unbekannte Größen enthält, die aus dem Complexu jener bestimmt werden können. Das zu Formation dieser Bedingungs-Gleichungen angewandte Verfahren, bestand in folgendem:

Es seyen zwey durch Beobachtung gegebene heliocentrische Längen λ , λ' , die Aphelien für diese Epochen P , $P + T.dp$, T inne liegende Jahrreihe, dp jährliche Aenderung des Apheliums, γ Excentricität, Ω , Ω' , p , p' Knoten und Störungen der heliocentrischen Länge, die den beyden Epochen entsprechen; bey genau richtigen Beobachtungen und Elementen würde die Gleichung statt finden:

$$(B) \quad \lambda + F. [\gamma(\lambda - P)] + T.nt + f[i(\lambda - \Omega)] - p - \lambda' \\ - F'[\gamma'(\lambda' - P')] + f'[i(\lambda' - \Omega')] + p' = 0;$$

wo durch F , f ... Functionen von Excentricität, Aphelium, Neigung und Knoten, oder mit andern Worten, Mittelpuncts-Gleichung und Reduction auf die Bahn ausgedrückt sind. Jede Combination von zwey und zwey beobachteten Längen, wird eine Gleichung dieser Art geben, deren Abweichung von Null, von dem irrigen der dabey gebrauchten Reductions-Elemente abhängt.

Wird vorerst auf Fehler der mittlern Bewegung und der jährlichen Aenderung des Apheliums keine Rücksicht genommen, so ist wenn di , $d\Omega$, $d\gamma$, dP die Fehler der angenommenen Neigung, Knoten, Excentricität und Aphelium ausdrücken (Epoche kann hier unberücksichtigt bleiben, da die Länge durch Beobachtung gegeben ist) der dadurch bey Reduction

duction der wahren Länge in der Ecliptik auf mittlere in der Bahn, statt findende Einfluß, mit Annahme einiger hierbey vollkommen erlaubten Abkürzungen

$$= 0,061 \sin \beta \sin (\lambda - \Omega) . d \Omega + 0,^{\circ} 5 \sin \beta \cos (\lambda - \Omega) . di \\ + 2 d \gamma \sin (\lambda - P) - 2 d P . \gamma \cos . (\lambda - P);$$

Bezeichnen wir nun die reducirten mittlern Längen mit (λ) , (λ') , und den Fehler ihrer Differenz mit E , so wird.

$$E = \begin{cases} 0,^{\circ} 061 d \Omega [\sin \beta \sin (\lambda - \Omega) - \sin \beta' \sin (\lambda' - \Omega')] \\ + 0,^{\circ} 5 di [\sin \beta \cos (\lambda - \Omega) - \sin \beta' \cos (\lambda' - \Omega')] \\ + 2 d \gamma [\sin (\lambda - P) - \sin (\lambda' - P')] \\ - 2 \gamma d P [\cos (\lambda - P) - \cos (\lambda' - P')] \end{cases} \quad (a)$$

Strenggenommen sollte hier, so wie bey der vorherigen Knotenbestimmung, auch noch untersucht werden, in wiefern die zu Reduction des beobachteten Ortes auf den elliptischen angewandten Störungen oder deren Differenzen, durch einen Fehler in der dabey zum Grunde liegenden Venusmasse, irrig werden können. Allein da ich diese periodischen Störungen mit *Delambre's* Venusmasse, deren Werth aus Gründen mancherley Art keine Correction von 0,1 zuläßt, berechnet habe, und hiernach der größte daraus entspringende Irrthum nie auf zwey Secunden ansteigen kann, so konnte dieser um so unbedenklicher vernachlässiget werden, da er hier immer die inne liegende Jahrreihe zum Divisor hat, bey der vorherigen Knotenbestimmung aber, es auf eine GröÙe von 2" eben nicht ankam.

Um zugleich einem, von dem bloßen Mathematiker hierbey vielleicht zu machenden Einwand zu begegnen, als beruhe dies Verfahren, wo für die periodischen Störungen die Venusmasse, deren Bestimmung aus der jährlichen Aenderung des Apheliums erst erhalten werden solle, schon als bekannt angenommen werde, auf einem logischen Kreis, füge ich die Bemerkung bey, daß diese Art von successiver Verbesserung der Elemente, der ganzen Bearbeitung unserer heutigen Planeten-Theorie zum Grunde liegt.

Bey der nachfolgenden numerischen Anwendung dieses Verfahrens auf die combinirten Durchgänge von

$\{1631\}$, $\{1677\}$, $\{1677\}$, $\{1690\}$, $\{1697\}$, $\{1723\}$,
 $\{1802\}$, $\{1802\}$, $\{1789\}$, $\{1782\}$, $\{1789\}$, $\{1802\}$,

$\{1736\}$, $\{1736\}$, $\{1743\}$, $\{1756\}$, $\{1661\}$, $\{1661\}$,
 $\{1802\}$, $\{1782\}$, $\{1789\}$, $\{1802\}$, $\{1799\}$, $\{1786\}$,

$\{1740\}$, $\{1753\}$, $\{1753\}$, schwanken die Bögen $\lambda - \Omega$,
 $\lambda' - \Omega'$, zwischen 356° und 5° für den aufsteigen-

den Knoten und zwischen $6^{\text{Z}} 1^\circ$ und $5^{\text{Z}} 27^\circ$ für den niedersteigenden; die Differenz von β , β' kann nie über $34'$ gehen; die wahren Anomalien sind in den Grenzen von $153 - 156$, und $330 - 333^\circ$ eingeschlossen; mit Substitution dieser Grenzwerte in der Gleichung (a) ergibt sich das Maximum von E

$$= 0,0004 d\Omega + 0,005 di + 0,092 d\gamma - 0,0099 dP.$$

Bey den aus der vorherigen Untersuchung für $d\Omega$ und di erhaltenen schon genäherten Werthen, kann von einem störenden Einfluß dieser Glieder nicht die Rede seyn. Daß aber die Werthe von $d\gamma$ und

und dP in den Grenzen von 15 und 60" eingeschlossen sind, ist eine Voraussetzung, deren Rechtmäßigkeit durch das End-Resultat meiner Untersuchungen vollkommen constatirt worden ist. Hiernach würde der mögliche Reductionsfehler im ungünstigsten Falle werden.

$$= \pm 0,092.15 \mp 0,0099.60. = \pm 1,97$$

was bey den bedeutenden Zeiträumen, die zwischen den verglichenen Durchgängen inne liegen, die gesuchte Bestimmung keinesweges wesentlich stören kann.

Die Abweichung der im Eingang aufgestellten allgemeinen Gleichung (B) von Null, kann also nur (die Beobachtungen als fehlerfrey angenommen) Function der mittlern jährlichen Bewegung und der jährlichen Aenderung des Apheliums seyn.

Sind nun (λ) , (λ') die, mit dem für die Epoche der erstern berechneten Apheljo, reducirten mittlern Längen in der Bahn, dnt Correction der mittlern jährlichen Bewegung, so ist mit Beybehaltung der vorherigen Benennungen,

$$(\lambda') + A. Tdp - T(nt + d.n) - (\lambda) = 0; \quad (C)$$

Nun ist bekanntlich Reduction der wahren Anomalie auf mittlere, mit Vernachlässigung der sechsten Potenzen der Excentricität

$$= 2\gamma \sin(\lambda - P) + \left(\frac{3}{4}\gamma^2 + \frac{1}{8}\gamma^4 + \frac{3}{64}\gamma^6\right) \sin 2(\lambda - P) + \\ + \left(\frac{1}{3}\gamma^3 + \frac{1}{8}\gamma^5\right) \sin 3(\lambda - P) + \frac{5}{32}\gamma^4 \sin 4(\lambda - P) + \\ + \frac{3}{40}\gamma^5 \sin 5(\lambda - P) + \dots$$

hiernach bey Entwicklung durch endliche trigonometrische Differentiale

$$\begin{aligned}
 AT.dp = & -4\gamma \sin \frac{1}{2} T.dp \cos (\lambda - P - \frac{1}{2} T.dp) - \\
 & -3\gamma^2 \sin \frac{1}{2} T.dp \cos^2 (\lambda - P - \frac{1}{2} T.dp) - \\
 & -2\gamma^3 \sin \frac{1}{2} T.dp \cos^3 (\lambda - P - \frac{1}{2} T.dp)
 \end{aligned}$$

wobey nur die Abkürzung statt findet, daß in dem zweyten und dritten Glied, statt $\sin n T.dp$, $n \sin T.dp$ gesetzt wurde. Daß die hierbey vernachlässigten von der 4^{ten} und 5^{ten} Potenz der Excentricität abhängigen Glieder

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{4}\gamma^4 \cos^2 (\lambda - P) T.dp; -\frac{3}{8}\gamma^5 \cos^3 (\lambda - P) T.dp \\
 & -\frac{5}{8}\gamma^4 \cos^4 (\lambda - P) T.dp; -\frac{3}{8}\gamma^5 \cos^5 (\lambda - P) T.dp
 \end{aligned}$$

keinen störenden Einfluß haben können, übersieht sich leicht, indem bey den für die vorliegende Unter-

suchung vorkommenden Werthen von $\lambda - P = \begin{cases} 152^\circ \\ 330^\circ \end{cases}$

und dem Maximo von $T.dp = 90'$

I. Gl.	II. Gl.	III. Gl.	IV. Gl.
= - 1,"35	+ 0,"00	+ 2,"45	- 0,"57

werden, und sich also gegenseitig bis auf eine Kleinigkeit aufheben.

Wird der Werth von $A.T.dp$ in der Gleichung (C) substituirt, so ergibt sich die specielle Form, der für die gegenwärtige Untersuchung numerisch zu entwickelnder Bedingungs-Gleichungen:

$$\left. \begin{aligned}
 (\lambda') - 4\gamma \cos (\lambda' - P - \frac{1}{2} T.dp) \\
 - 3\gamma^2 \cos^2 (\lambda' - P - \frac{1}{2} T.dp) \\
 - 2\gamma^3 \cos^3 (\lambda' - P - \frac{1}{2} T.dp)
 \end{aligned} \right\} \cdot T. \sin \frac{1}{2} dp$$

$$- T(nt + d.nt) - (\lambda) = 0; \quad (D)$$

Daß hier $\sin \frac{1}{2} T.dp$ in $T \sin \frac{1}{2} dp$ verwandelt worden ist, kann hier, wo $dp < 28,"5$, nicht den geringsten

sten Einfluß haben. Der in der Gleichung (D) vorläufig erforderliche Werth von dp wurde nach der Theorie von *La Place* = 55,"74 angenommen; eben so jährliche Aenderung der Excentricität = 0,"0068. Für Aphelium, mittlere Bewegung, Knoten und Excentricität wurden die oben angegebenen Werthe benutzt. Die Reduction der wahren Anomalie auf mittlere, wurde nach folgenden endlichen Ausdrücken berechnet:

E, v, μ , excentrische, wahre, mittlere Anomalie;
 $\gamma = \sin \varphi$; so ist nach *Gauß* (*Theoria motus corp.* S. 8)

$$\cotg \frac{1}{2} E = \cotg \frac{1}{2} v \operatorname{tg} (45^\circ - \frac{1}{2} \varphi); \mu = E + \gamma \sin E,$$

Hiernach wurde aus obigen siebzehn Durchgängen folgende Reihe von Bedingungs-Gleichungen erhalten:

1. $1631-1802; -3193,2 + 113,1950 \sin \frac{1}{2} \delta P - 171,01 dnt = 0;$
2. $1677-1802; -2328,8 + 82,6041 \sin \frac{1}{2} \delta P - 125,01 dnt = 0;$
3. $1677-1789; -2050,0 + 72,8495 \sin \frac{1}{2} \delta P - 111,99 dnt = 0;$
4. $1690-1782; -1750,0 + 62,1693 \sin \frac{1}{2} \delta P - 92,01 dnt = 0;$
5. $1697-1789; -1691,1 + 59,7823 \sin \frac{1}{2} \delta P - 92,01 dnt = 0;$
6. $1723-1802; -1463,3 + 52,0784 \sin \frac{1}{2} \delta P - 79,00 dnt = 0;$
7. $1736-1802; -1223,4 + 43,4815 \sin \frac{1}{2} \delta P - 65,99 dnt = 0;$
8. $1736-1782; -869,4 + 31,0265 \sin \frac{1}{2} \delta P - 46,00 dnt = 0;$
9. $1743-1789; -840,0 + 29,8260 \sin \frac{1}{2} \delta P - 46,01 dnt = 0;$
10. $1756-1802; -856,2 + 30,1986 \sin \frac{1}{2} \delta P - 46,01 dnt = 0;$
11. $1661-1799; +3152,7 - 112,8246 \sin \frac{1}{2} \delta P - 138,01 dnt = 0;$
12. $1661-1786; +2744,4 - 97,9322 \sin \frac{1}{2} \delta P - 124,99 dnt = 0;$
13. $1740-1799; +1337,4 - 47,8422 \sin \frac{1}{2} \delta P - 59,02 dnt = 0;$
14. $1753-1786; +739,3 - 25,5775 \sin \frac{1}{2} \delta P - 32,99 dnt = 0;$
15. $1753-1799; +1046,0 - 37,2548 \sin \frac{1}{2} \delta P - 46,01 dnt = 0;$

Da

Da aber offenbar der absolute Werth dieser Gleichungen nicht durchaus derselbe, sondern im Verhältniß der Sicherheit der Beobachtungen und Größen der innen liegenden Jahrreihe ist, so muß auch deren Form noch eine Modification erhalten, ehe daraus die unbekannten Größen mit gehöriger Bestimmtheit hergeleitet werden können. Wird den Beobachtungen aus dem 17^{ten} Jahrhundert der halbe Werth zugestanden, und ein Zwischenraum von 46 Jahren als Einheit angenommen, so wird folgendes System von Bedingungen - Gleichungen erhalten:

$$\begin{array}{ll}
 1. & - 34,708 + 1,2303 \sin \frac{1}{2} dP - 1,8588 dnt = 0; \\
 2. & - 25,313 + 0,8979 - - - 1,3588 - = 0; \\
 3. & - 22,283 + 0,7919 - - - 1,2173 - = 0; \\
 4. & - 18,980 + 0,6757 - - - 1,0000 - = 0; \\
 5. & - 18,380 + 0,6497 - - - 1,0000 - = 0; \\
 6. & - 31,804 + 1,1321 - - - 1,7174 - = 0; \\
 7. & - 26,587 + 0,9454 - - - 1,4346 - = 0; \\
 8. & - 18,470 + 0,6745 - - - 1,0000 - = 0; \\
 9. & - 18,260 + 0,6483 - - - 1,0000 - = 0; \\
 10. & - 18,610 + 0,6564 - - - 1,0000 - = 0; \\
 11. & + 34,268 - 1,2263 - - - 1,5000 - = 0; \\
 12. & + 29,831 - 1,0646 - - - 1,3586 - = 0; \\
 13. & + 29,074 - 1,0397 - - - 1,2831 - = 0; \\
 14. & + 16,072 - 0,5562 - - - 0,7172 - = 0; \\
 15. & + 22,750 - 0,8097 - - - 1,0000 - = 0;
 \end{array}$$

hieraus, vermöge der Methode der kleinsten Quadrate

$$\begin{array}{l}
 - 337,673 + 11,991 \sin \frac{1}{2} dP - 5,247 dnt = 0; \\
 + 146,942 - 5,247 \sin \frac{1}{2} dP + 24,046 dnt = 0; \\
 \frac{1}{2} dP = 28,177; \quad dnt = + 0,0369;
 \end{array}$$

Mit

Mit Substitution dieser Werthe sind die Fehler der vorstehenden Gleichungen folgende:

Nro.	Fehler,	Nro.	Fehler	Nro.	Fehler
1	— 0,09	6	+ 0,04	11	— 0,34
2	— 0,06	7	+ 0,01	12	— 0,21
3	+ 0,00	8	+ 0,40	13	— 0,27
4	+ 0,02	9	— 0,03	14	+ 0,38
5	— 0,11	10	— 0,15	15	— 0,11

Doch darf es dabey nicht unbemerkt bleiben, daß die wahren Fehler der Beobachtungen in Gemäßheit der mit den Bedingungs-Gleichungen vorgenommenen Transformation die 46fachen der hier dargestellten sind.

Nun ist nach *La Place*

jährl. Aender. d. Aphel. = 50,"11 + 5,"626 + 3,"023 μ'
nach mir = 50, 11 + 6,"244

hiernach zweyte Gleichung zu Bestimmung der Venus-Masse:

$$\text{II. } + 0,"618 - 3,"023 \mu' = 0;$$

(Die Fortsetzung folgt.)

II.

Rectificirte Beobachtungen des ersten großen Cometen vom Jahr 1811, im ersten Zweige seiner Bahn, vor seinem Durchgange durch die Sonnen-Nähe. Angestellt auf der Sternwarte des Freyherrn von Zach in St. Péyre bey Marseille.

Es ist eine alte, schon von *Newton* geäußerte, heut zu Tage durch Erfahrung bestätigte Bemerkung, daß alle Cometen, welche lange sichtbar waren, und sehr genau beobachtet worden, eine Ellipticität ihrer Bahnen zeigten. Hätten wir von allen Cometen so genaue Beobachtungen, wie man solche in unsern Tagen macht, und hätte man sie in einen hinlänglich langen Bogen verfolgen können, kein Zweifel, daß man bey allen Spuren von Abweichungen von der parabolischen Bahn bemerkt hätte.

Bald nach Entdeckung der Attractions-Gesetze, und bey der ersten Anwendung derselben auf Cometen-Theorie, fand *Newton*, daß sich alle Beobachtungen des Cometen vom Jahr 1680 in einer sehr verlängerten elliptischen Bahn darstellen ließen. *Halley* brachte alle *Kürch'sche* und *Flamsteed'sche* Beobachtungen dieses Weltkörpers in eine Ellipse von 575 Umlaufjahre, woraus *Newton* den Schluß zog, daß Cometen eben so alte perennirende und periodische Welt-

Weltkörper sind, wie die ältern Planeten die wir kennen, und die sich in weniger excentrischen Bahnen bewegen.

Die parabolische Bahnen sind daher von *Newton* keinesweges als wirkliche Cometen-Bahnen, sondern blos zum Rechnungs-Behelf vorgeschlagen worden, weil sich kleine Bögen sehr excentrischer Ellipsen, in der kurzen Erscheinungszeit, in welcher Cometen sich zeigen, füglich und ohne Fehler mit parabolischen Bögen verwechseln lassen, und der Tetragonismus dieser letztern große Rechnungs-Abkürzungen erlaubt.

Unseren Tagen, wo sich die practische und rechnende Sternkunde so sehr vervollkommnet, ihre Verehrer und Pfleger so vervielfältiget haben, mußte es vorbehalten seyn, die Ellipticität der Cometen-Bahnen früher zu bemerken, weil hier die Güte und die Menge der Beobachtungen, die Länge des beobachteten Bogen ersetzt. Der Genauigkeit, dem Eifer der heutigen Beobachter, der Rüstigkeit, der Fertigkeit der heutigen Berechner, haben wir es zu verdanken, daß in neuern Zeiten elliptische Bahnen mehrerer Cometen, selbst während ihrer Erscheinung am Himmel, berechnet worden sind, welches bisher noch nie der Fall gewesen war.

So wurden die Abweichungen der Cometen von 1807 und 1811 von einer parabolischen Bahn bald bemerkt, und man schritt sogleich zur Berechnung der elliptischen. Schon im October 1811, (der Comet war bis zum 15. Jan. 1812 sichtbar geblieben,) beschenkte uns Hr. *Bessel* mit einer elliptischen Bahn dieses Cometen. (*Mon. Corresp.* XXIV. Bd. S. 514.)

Er

Er behielt sich vor, nach Beendigung aller Beobachtungen und nach Empfang aller auswärtigen, die letzte Hand an die Ausfeilung dieser Elemente zu legen. Da wir die einzigen Beobachter sind, die so glücklich waren, diesen damals so äußerst schwer zu beobachtenden Cometen, im ersten Zweige seiner Bahn, vor seinem Durchgange durch die Sonnen-Nähe, beynahe zwey Monate lang zu beobachten, und diese Beobachtungen zur Begründung einer wahren elliptischen Bahn von der größten Wichtigkeit sind, so versprochen wir (*M. C. XXIV. B. S. 527*) wegen des Gebrauchs einiger bey *La Lande* und *Bode* unrichtig bestimmter Sterne, eine neue Reduction derselben vorzunehmen, sobald wir alle die Sterne in der Buchdrucker-Werkstätte, im Einhorn und im kleinen Hund, welche wir bey diesen Beobachtungen gebraucht hatten, selbst auf das allerge-naueste würden bestimmt haben. Dies haben wir nun gethan, und unsre Leser erhalten dies kleine Stern-Verzeichniß im nachfolgenden Aufsatze dieses Hefts, woraus sie nicht ohne Verwunderung die großen Unterschiede unserer Bestimmungen mit jenen eines *De Lalande* und *Bode* bemerken und daraus den Schluß ziehen werden, wie wenig man Beobachtungen trauen darf, bey welchen solche Bestimmungen zum Grunde liegen.

Gegenwärtig sind wir also im Stande, unsern Lesern unsere rectificirte und neu berechnete Beobachtungen dieses Cometen zu übergeben. Die Unrichtigkeiten der Stellungen der verglichenen Sterne, sind also hier ganz beseitiget, und es bleibt nur noch der unvermeidliche Fehler übrig, welcher aus der
Schwäche

Schwäche und Undeutlichkeit entstehen konnte, mit welcher sich der Comet in dieser ganzen Zeit so nahe am Horizonte zeigte. Wir glauben jedoch, daß dieser äußerste Fehler sich nie über eine Minute belaufen konnte. Um jedoch künftigen Bahnen-Berechnern den innern Werth dieser Beobachtungen zu erkennen zu geben, so werden wir solche mit einigen Bemerkungen begleiten, welche sie in der Auswahl derselben zu ihren Berechnungen werden leiten können. Uebrigens haben wir alle unsere Original-Beobachtungen Herrn *Bessel* in Abschrift mitgetheilt;*) die Reduction, welche er seinerseits vornehmen wird, werden in der Folge die Richtigkeit der unsrigen bewähren.

1811

*) Leider sind diese rectificirten Beobachtungen, wie wir aus einem neuerlich erhaltenen, am Schlusse dieses Heftes abgedruckten Brief ersehen haben, nicht in *Bessels* Hände gekommen. *Bessels* Reductionen dieser Cometen-Beobachtungen, die sich nur auf Stern-Positionen von *Lalande* gründen, weichen, wie natürlich, von den hier mitgetheilten Cometen-Oertern zum Theil merklich ab. Ich habe eine zweyte Abschrift der neuen Sternbestimmungen des Freyherrn v. *Zach* vor einigen Wochen noch einmal an Hrn. Prof. *Bessel* abgesandt; und ich wünsche auf das lebhafteste, daß dieser Brief richtig nach Königsberg gelangen möge, um dadurch Erstern vergebliche Rechnungen zu ersparen, und durch diese wichtigen Beobachtungen eine sichere Grundlage zu seiner elliptischen Bearbeitung dieses Cometen zu verschaffen.

v. L.

1811	Mittl. Zeit in St. Peyre	Scheinb. gerade Aussicht des α	Scheinbare Abweich. des α	Verglichene Sterne S. M. C. XXIV. Bd. S. 191
April 11	8 17 24,0	117 18 32,3	19 57 56,0 S	Nr. 75 Bode Nr. 10 Z. M. C. B. S.
15	9 51 59,0	116 50 15,9	17 48 2,0 -	Nr 77 — N. 13—
16	8 50 0,0	116 40 12,3	17 9 39,0 -	6 Flamst. Schiff n. Piazz
17	8 23 41,9	116 41 42,8	16 35 9,9 -	Derfelbe
19	8 53 8,0	116 33 5,8	15 8 13,7 -	56 u. 58 B. Nr. 4 und 5 Z.
19	8 18 14,1	116 34 1,7	15 22 1,3 -	7 großer Hund n. Piazz
22	9 10 22,7	116 44 12,0	13 48 29,0 -	9 Flamst. Schiff n. P.
24	8 57 4,3	116 19 44,1	12 44 39,6 -	8 Flamst. — n. P.
27	8 44 16,9	116 18 3,8	11 8 13,0 -	87 Bode Nr. 21 v. Zach
28	8 34 35,5	116 17 55,6	10 34 51,1 -	Derfelbe
30	8 54 3,2	116 20 44,4	9 13 19,8 -	26 Fl. Einhorn n. Piazz
May 3	8 59 54,6	116 24 59,5	8 2 21,1 -	Nr. 15 u. 17 n. Zach
3	9 19 11,7	116 25 38,5	8 1 25,0 -	172 Bode Einhorn Nr. 1 Z.
4	8 57 41,9	116 27 51,7	7 52 50,1 -	Derfelbe
7	9 5 19,7	116 37 54,2	6 3 17,1 -	77 B. Einhorn Nr. 2, 3 u. 14 Z.
8	8 37 55,5	116 41 27,9	5 33 16,1 -	Nr. 14 Z.
9	8 29 21,0	116 45 27,2	5 5 6,9 -	Nr. 182 B. Einhorn. Nr. 7. Z.
11	9 55 2,0	116 54 49,6	4 7 52,3 -	Nr. 12 Zach
12	8 57 37,2	116 59 50,6	3 42 28,8 -	27 Fl. Einhorn Piazz
12	9 50 24,9	117 0 25,9	3 38 4,5 -	30 Fl. — P.
14	8 52 12,5	117 11 23,8	2 45 57,3 -	27 Fl. — P.
22	9 13 0,2	118 9 22,3	0 47 15,0 N	Nr. 6, 8, 11, 18 Z.
23	8 58 50,2	118 17 28,6	1 12 32,0 -	Nr. 9 Z.
24	9 6 3,8	118 26 43,6	1 37 17,6 -	Derfelbe
25	9 15 48,0	118 35 44,0	2 2 55,5 -	kl. Hund P.
27	8 55 49,0	118 54 11,2	2 51 26,5 -	1: Fl. Schiff P.
28	8 50 31,4	119 4 29,3	3 14 4,6 -	Derfelbe
Jun. 2	9 4 41,0	119 56 30,8	5 13 36,5 -	55 B. σ kl Hund Nr. 12 Z.

Anmerkungen zu obigen Beobachtungen.

April 11 Zweifelhafte Beob. Besteht bloß darin, daß der Comet vor dem Stern 75 Bode Buchdr. W. 1' 10" in Zeit vorhergegangen, und um 8 U 17' 24" M. Z. auf demselben Parallel mit dem Stern war.

April 15. Zwey Vergleichen am Stunden-Faden eines Semi-rhomboidal-Netzes. Der Unterschied dieser beyden Vergl. war in AR 1' 30". Die Abweichung wurde bloß am Declinationskreis der parallactischen Maschine genommen, welche nur Minuten angibt.

April 16. Drey Vergl. am Kreis-Micrometer. Größte Differ. in AR. 30" in Decl. 39".

April 17. Sechs Vergl. am Kreis-Mikr. Größte Diff. in AR 13,5 in Decl. 62,9. Die Decl. deswegen etwas zweifelhaft, weil der Comet durchs Centrum des Kr. Mikr. ging.

April

- April 19. Drey Vergl. mit Nr. 56, und vier mit Nr. 58 am Kr. Mikr. Größte Diff. bey 3 Vergl. $52^{\circ}5'$ in AR und 46° in Decl. Bey 4 Vergl. mit Nr. 58 gr. Diff. 15° in AR u. $77^{\circ}6'$ in Decl. Untersch. der AR aus beyden Sternen $16^{\circ}7'$ in AR. u. $10^{\circ}4'$ in Decl.
- April 19. Eine einzige Vergl. mit γ im grossen Hund am Semi-rhomboidal-Netz. Der Stern war $12^{\circ}7'$ in AR. vom Cometen entfernt.
- April 22. Fünf Vergl. am Semi-rhomb. Netz, blos allein am Stunden-Faden. Größte Diff. 120° in AR. Die Differenz der Decl. wurde am Declinations-Kreis abgenommen.
- April 24. Vier Vergl. am Kreis-Mikr. Gr. Diff. $22^{\circ}5'$ in AR. und $26^{\circ}7'$ in Decl.
- April 27. Drey Vergl. am Kr. Mikr. Gr. Diff. $41^{\circ}4'$ in AR. und $87^{\circ}4'$ in Decl.
- April 28. Eine Vergl. am Kr. Mikr. Die Decl. aus dem innern und äussern Ring geschlossen, stimmt bis auf $26^{\circ}5'$.
- April 30. Drey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Größte Diff. $82^{\circ}2'$ in AR und $47^{\circ}3'$ in Decl.
- May 3. Drey Vergl. am Kreis-Mikr. mit zwey Sternen. Gr. Diff. $37^{\circ}5'$ in AR. und $23^{\circ}2'$ in Decl. Die AR. des Cometen aus beyden Sternen stimmt bis auf $13^{\circ}3'$. Die Decl. auf $1^{\circ}3'$.
- May 3. Zwey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Gr. Diff. $0^{\circ}0'$ in AR. u. $29^{\circ}7'$ in Decl.
- May 4. Zwey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Gr. Diff. $22^{\circ}5'$ in AR. und $111^{\circ}1'$ in Decl.
- May 7. Eine Vergl. am Semi-rhomb. Netz mit drey Sternen. Die AR. stimmen auf $15^{\circ}3'$. Die Decl. bis auf $30^{\circ}8'$.
- May 8. Eine einzige Vergleichung am Semi-rhomb. Netz.
- May 9. Zwey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Gr. Diff. $33^{\circ}8'$ in AR. und $14^{\circ}9'$ in Decl.
- May 11. Eine einzelne Vergl.

May

- May 12. Drey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Größte Diff. 32" in AR. und 60" in Decl. Die Declin. ist etwas zweifelhaft, weil der Comet in der obersten Spitze des Netzes, wo die drey Fäden zusammen kommen, beobachtet worden.
- May 12. Eine Vergl. am Semi-rhomb. Netz.
- May 14. Fünf Vergl. am S. R. Netz. Gr. Diff. 46,"8 in AR. 90" in Decl.
- May 22. Zwey Vergl. mit 4 Sternen. Gr. Diff. 33,"8 in AR. und 29,"4 in Decl. Aus den Vergl. der vier Sterne gr. Diff. 16,"4 in AR und 51,"4 in Decl.
- May 23. Zwey Vergl. am S. R. Netz. Gr. Diff. 37,"5 in AR und 95,"4 in Decl.
- May 24. Drey Vergl. am S. R. Netz. gr. Diff. 30" in AR. und 105" in Decl.
- May 25. Eine einzige Vergleichung.
- May 27. Drey Vergl. am S. R. Netz. gr. Diff. 18,"8 in AR. und 45,"0 in Decl.
- May 28. Zwey Vergl. am S. R. Netz. gr. Diff. 18,"8 in AR und 105" in Decl.
- Jun. 2. Eine einzige Vergleichung.

Die angezeigten Differenzen der AR sind im Bogen zu verstehen. Die etwas starken Differenzen der Declinationen kommen von der Bewegung des Cometen her, da die Zwischenzeit von einer Vergleichung zur andern, öfters von einer Stunde und mehr war. Bey den letzten Beobachtungen war der Mondschein und der tiefe Stand des Cometen sehr hinderlich. Die Höhen, in welchen diese Beobachtungen gemacht wurden, waren von 5 bis 10 Grade, demungeachtet hat die Wirkung der Strahlenbrechung sehr wenig betragen, da der Comet jedesmal mit sehr nahen Sternen verglichen worden. Wir haben diese Wirkung für zwey der allernüchternsten

den Lagen berechnet. Einmal, wo der Comet nur eine Höhe von 5 Grad hatte, und der verglichene Stern 2 Grad in \mathcal{R} davon entfernt war. Ein andermal, wo der Comet 8 Grad hoch stand, und die Differenz der Declin. mit dem Stern 23 Minuten betrug. In beyden Fällen war die Wirkung der Strahlenbrechung nicht über 10" in \mathcal{R} , und 5" in Declin. Wir vernachlässigten solche daher bey allen übrigen Beobachtungen.

Herr *Andrea Conti*, Astronom im Collegio Romano zu Rom, berechnete gleichfalls elliptische Elemente der Bahn dieses Cometen. Der Senator *Oriani* in Mailand, hatte ihm zu diesem Behufe unsere obigen Beobachtungen mitgetheilt, aber so wie sie im XXIV. Bande der *M. C. S.* 191 stehen, und noch bevor wir sie rectificiren konnten. Mit ihrer Beyhülfe, mit Orianischen, und mit seinen eigenen Beobachtungen hatte er folgende Ellipse gefunden:

Durchg. durch die ☉ Nähe 1811 Spt. 11 um 6 U 41' 54." 7 M. Z. zu Rom.

Länge des ☉ Nähepuncts	74° 59' 59." 6	} v. mittl. Aequinoct. gezählt.
Länge des aufst. Knoten	140 24 25, 8	
Neigung der Bahn . .	73 2 42, 7	
Log. des kleinsten Abstandes	0,0151869	N. Z. 1,0355879
Log. der Excentricität . .	9,9978592 0,9950827
Log. der halben gr. Axe . .	2,3334602 210,6008741
Log. der halben kl. Axe . .	1,3192918 20,8589189
Log. des halben Parameters	0,3151234 2,0659671
Log. der mittl. tägl. Beweg.	0,0648163 1,1609575
Umlaufs-Zeit	3056,3 Jahre.	

Diese Ellipse, deren Umlaufszeit sich 327 Jahre von der *Bessel'schen* entfernt, stellt folgende äußersten

sten und mittlern Beobachtungen sehr Befriedigend dar, wie man aus nachstehender Vergleichung sieht.

1811	Fehler der Elemente		Beob- achter
	in Länge	in Breite	
April 16	— 0' 59"	— 1' 20"	v. Zach
22	— 2 31	— 0 12	—
28	+ 0 58	+ 0 25	—
May 7	— 0 10	+ 0 14	—
14	— 0 49	— 0 49	—
25	— 0 26	— 0 14	—
Jun. 2	— 0 59	+ 3 21	—
Sept 1	— 0 10	+ 0 16	Oriani
6	— 0 11	+ 0 57	—
13	— 0 3	+ 0 13	—
Sept. 16	+ 1 2	— 1 9	Conti
26	— 0 15	+ 0 21	—
28	+ 0 57	+ 0 33	—
Oct. 2	+ 2 17	— 2 28	—
6	— 0 30	+ 0 31	—
8	— 0 11	— 0 2	—
9	+ 0 2	+ 0 33	—
10	+ 0 39	— 0 52	—
12	+ 0 55	+ 0 21	—
16	+ 1 40	— 0 30	—
22	+ 0 17	+ 0 41	—
25	+ 0 49	+ 0 1	—
30	— 0 10	+ 0 56	—
Nov. 1	+ 0 8	+ 0 16	—
7	— 0 7	+ 0 38	—
13	+ 0 23	+ 0 20	—
20	+ 0 55	+ 0 32	—
30	— 0 11	+ 0 48	—
Decb. 8	— 0 19	+ 0 16	—
19	+ 0 42	+ 0 58	—

III.

Verzeichniß

einiger sehr schlecht, oder noch nie bestimmter Sterne im *Einhorn*, und in der *Buchdrucker-Werkstatt*, beobachtet auf der Sternwarte à la Capelle bey Marseille.

Bey Gelegenheit der ersten Erscheinung des großen Cometen vom Jahr 1811, welcher im ersten Zweige seiner Bahn, und vor seinem Vorübergang durch die Sonnen-Nähe die Himmels-Gegend durchzog, welche die Sternbilder das *Einhorn* und die *Buchdrucker-Werkstatt* einnehmen, waren wir gezwungen, den damals sehr schwachen Cometen mit mehreren Sternen zu vergleichen, welche in diesen Sternbildern sehr sparsam, theils sehr schlecht, theils gar nicht bestimmt waren. Einige dieser Sterne fanden wir in den Verzeichnissen von *Piazzi*, andere bey *Lalande* und *Bode*; allein die Bestimmungen des letztern waren so fehlerhaft, daß wenn sie gleich bis auf einzelne Secunden angegeben waren, denselben doch kaum auf Minuten zu trauen war, wie wir dies gleich bey der ersten Reduction unserer Cometen-Beobachtungen wahrgenommen, und auch in einer Note angezeigt hatten. (*M. C.* XXIV. Bd. S. 192). Unsere damit reducirten Cometen-Oerter

Mon. Corr. XXVIII. Bd. 1813. C muß-

mussten folglich aller dieser Fehler theilhaftig werden. Wir haben daher in demselben Bande der *M. C.* S. 527 das Versprechen gegeben, die genaueste Bestimmung aller dieser Sterne nachzuholen; wir ließen uns diese Arbeit um so mehr angelegen seyn, nachdem uns auch unser verdienstvolle *Bessel* hierum ersucht hatte, da er gesonnen ist, die elliptische Bahn dieses Cometen auf dieselbe musterhafte Art zu bearbeiten, wie er es bekanntlich mit jenem vom Jahr 1807 gethan hatte. Da nun unsere Beobachtungen dieses Cometen im ersten Zweige seiner Bahn die einzig vorhandenen, und hierzu unumgänglich nothwendigen sind, so haben wir die Bestimmungen dieser Sterne mit desto größerer Sorgfalt unternommen, und so ist nachstehendes kleine Stern-Verzeichniß entstanden.

Die geraden Aufsteigungen sind mit einem zweyfüßigen Passagen-Instrument, die Abweichungen mit einem zwölfzolligen *Reichenbach'schen* Kreis, und jeder Stern mehrmals, auf das allerwenigste *dreymal* beobachtet worden. Unter diesen zwey und zwanzig Sternen sind mehr als die Hälfte, nämlich zwölf neue, welche noch nie beobachtet worden sind; folglich eine neue Bereicherung für diese Sternbilder.

Die beygesetzte Vergleichung mit den *La Lande'schen* und *Bode'schen* Bestimmungen gibt einen neuen Beweis, in wie ferne man auf Cometen-Beobachtungen Vertrauen setzen kann, welche aus Vergleichungs-Beobachtungen mit kleinen Sternen geschlossen werden, und bestätigen was wir gegen diese Beobachtungs-Methode, und den ungleich schätz-

schätzbaren Vortheilen der Azimuthal- und Höhen-Methode im XXIV. Bande der *M. C. S.* 545 ff. erinnert haben.

Unsere sämmtlichen Original-Beobachtungen des Cometen haben wir Herrn *Bessel* zugesandt, damit er selbst ihre Reduction vornehmen, und dadurch sich von dem Grad der Genauigkeit überzeugen könne, welche er zur Begründung des Werthes seiner elliptischen Bahn selbst zu erkennen nöthig hat. Unfern Lesern werden wir vom Erfolg dieser Arbeit zu seiner Zeit die Nachricht mittheilen. Bey der Vergleichung unserer Bestimmungen mit den *La Lande'schen* und *Bode'schen*, haben wir uns des Stern-Verzeichnisses des letztern bedient, welches er zu seiner *Uranographie*, oder Sammlung von Himmelskarten im Jahr 1801 herausgegeben hat.

Bey dieser Gelegenheit zeigen wir, zu den im *Jun.* Heft S. 497 angegebenen Druckfehlern in den schätzbaren *Piazzi'schen* Stern-Verzeichnissen, noch folgende drey an, auf welche wir erst kürzlich gestoßen sind:

Gerad., Aufst. in Zeit	5U 43' 6" . . .	64 χ 4 Orion. muß heiss.	57 χ 2 Orion.
	5 51 36 . . .	64 χ 4 Orion. — —	χ 3 —
	5 52 2 . . .	62 χ 3 Orion. — —	62 χ 4 —

Nr. 64 und 65 *Flamst.* haben nie am Himmel gestanden, und sind nur durch einen Rechnungs-Fehler ins *Flamsteed'sche* Stern-Verzeichniß gekommen. (*M. C.* IX, Bd. S. 154.)

Verzeichniß einiger Fixsterne im Einhorn und in der Buchdrucker-Werk-
statt zu Anfang des Jahres 1813.

Namen der Sterne	Größe	Gerad. Aufn.	Jährl. Veränd.	Abweichung	Jährl. Veränd.	unterschiede in AR. in Decl.	Beobach- ter
172 Bode Einhorn	2	112° 53' 5" 08	41" 39	7° 45' 41" 3 S	+ 7" 78	+ 4" 1	La Lande
177 Bode X Einhorn	6 7	114 13 10. 1	43, 89	6 19 13, 3	+ 8, 21	+ 14, 4	—
Anonyma	7	114 40 53, 4	41, 89	6 19 13, 3	+ 8, 35	+ 14, 4	—
56 Bode Buchdr. Werkh.	7	114 46 49, 0	40, 78	15 31 26, 9	+ 8, 38	+ 96, 8	Bode
58 Bode Buchdr. Werkh.	7	114 38 37, 4	40, 78	15 31 53, 4	+ 8, 39	+ 95, 0	—
Anonyma	7	115 19 21, 1	45, 06	0 32 13, 8 N	+ 8, 56	—	—
182 Bode Einhorn	6 7	115 53 18, 5	41, 34	4 47 15, 8 S	+ 8, 74	+ 9, 4	La Lande
Anonyma	7 8	116 3 40, 3	45, 15	0 43 31, 1 N	+ 8, 79	—	—
Anonyma	7	116 54 35, 8	46, 40	1 37 5, 6	+ 9, 05	—	—
25 Bode 2 M Buchdr. W.	7	117 2 8, 8	39, 42	19 57 50, 3 S	+ 9, 09	+ 11, 8	Bode
Anonyma	7 8	117 2 0, 7	46, 14	0 47 20, 8 N	+ 9, 09	—	—
55 Bode σ klein. Hund	6	117 49 58, 3	47, 57	5 23 14, 0	+ 9, 34	+ 41, 5	Bode
72 Bode N Buchdr. W.	5 6	117 52 22, 7	40, 13	17 52 56, 6 S	+ 9, 35	+ 37, 1	—
Anonyma	7 8	118 58 21, 6	44, 06	5 51 38, 9	+ 9, 39	—	—
Anonyma	7 8	118 10 40, 6	43, 39	8 5 27, 1	+ 9, 45	—	—
Anonyma	7 8	118 11 38, 8	43, 48	7 47 57, 3	+ 9, 45	—	—
Anonyma	8 9	119 0 9, 4	41, 32	8 42 6, 8 N	+ 9, 79	—	—
Anonyma	7 8	119 10 51, 2	46, 15	0 50 6, 3 N	+ 9, 76	—	—
190 Bode Einhorn	7	119 41 37, 9	43, 24	8 43 9, 7 S	+ 9, 87	+ 32, 1	Bode
Anonyma	7 8	119 55 41, 2	46, 02	0 25 14, 0 N	+ 9, 98	—	—
87 Bode Buchdr. Werkh.	6 7	120 1 4, 5	42, 59	10 42 55, 7 S	+ 10, 01	+ 6, 6	La Lande
Anonyma	6	123 49 17, 8	44, 70	4 7 12, 2	+ 11, 14	+ 3, 6	—

Stern-Bedeckungen, beobachtet à la Capelle bey Marseille.

1813 6 März 14 Wallfisch Eintritt 9U 18' 43" 56 M. Z.
8 — α Ster. Austritt 8 0 48, 89 —

IV.

Die Attraction
homogener elliptischer Sphäroiden
nach
einer neuen Methode
entwickelt
von
Herrn Professor Ritter *Gauß*.*)

I.

Daß die genaue Bestimmung der Attraction eines homogenen elliptischen Sphäroids auf irgend einen Punct, unter die schwierigsten Aufgaben der physischen Astronomie gehört, deren Lösung seit *Newtons* Zeiten von vielen Geometern wiederholt versucht wurde,

- *) Mehrere unserer mathematischen Freunde, denen diese meisterhafte Abhandlung zeither nur durch die im May-Heft der *Mon. Corr.* 1813 gegebene Uebersicht bekannt worden ist, haben den Wunsch geäußert, solche ganz in dieser Zeitschrift erscheinen zu sehen. Da durch die ganz neue und eigenthümliche Entwicklung, welche Herr Prof. *Gauß* von dieser schweren Aufgabe gegeben hat, die physische Astronomie wesentlich gewinnt, und sonach der Gegenstand ganz dem bekannten Zweck dieser Zeitschrift angemessen ist, so eilen wir, diesen Wunsch zu erfüllen, indem wir durch die hier folgende treue Uebersetzung der ganzen Abhandlung, diese früher zur allgemeinen Kenntniß des mathematischen Publicums

wurde, ist eine bekannte Sache. Wie die Attraction eines durch Revolution um die Axe einer Ellipse entstandenen Sphäroids auf einen in der Axe gelegenen Punct zu finden sey, lehrte zuerst der große *Newton*, wobey er zugleich das Verhältniß der Attractionen, auf die innerhalb des Sphäroids in demselben Durchmesser liegenden Puncte, bestimmte, (*Princip. Lib. I. Cap. XCI*), Auf einem sehr eleganten synthetischen Wege, fand dann der scharfsinnige *Mac-Laurin* die Attraction der auf der Oberfläche, oder in der verlängerten Ebene des Aequators eines Sphäroids, gelegenen Puncte, wodurch denn zugleich die Theorie der Attraction auf alle innerhalb des Sphäroids gelegenen Puncte, vollkommen gegeben war, da diese vermöge des *Newton'schen* Theorems leicht auf Puncte in der Oberfläche übertragen werden konnte. (*De causa physica fluxus et refluxus, maris*, im *Recueil des pièces qui ont remporté les prix de l'Acad. roy. des sc. T. IV. Treatise of fluxions*, B. I. Chap. 14.) Was *Mac-Laurin* synthetisch gefunden hatte, das entwickelte späterhin auf eine nicht minder elegante Art *La Grange* durch Analyse (die man anfänglich für solche Fragen für unzureichend hielt) und bahnte dadurch den Weg zu weitem Fortschritten. (*Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin 1773*). Die damals noch fehlende Auflösung des schwierigsten Theils der Aufgabe, die Bestimmung der Attraction auf die außerhalb des Sphä-

cums bringen, als es außerdem der Fall seyn würde, da der diesen Aufsatz enthaltende Band der Göttinger Commentarien, erst in einigen Monaten im Buchhandel erscheinen wird. v. L.

Sphäroids weder in der Direction der Axen, noch in der Ebene des Aequators gelegenen Puncte, glückte zuerst *Legendre*. (*Recherches sur l'Attraction des Sphéroides homogènes, Mémoires présentés à l'Acad. roy. des sc. T, X.*)

2.

Die ganz allgemeine Untersuchung über die Attraction solcher Sphäroiden, die nicht durch Revolution entstanden sind, sondern beym Durchschnitte mit jeder Ebene Ellipsen geben, war von *Mac-Laurin* zwar angefangen, allein nur auf die Puncte ausgedehnt worden, die in der Richtung einer der drey Axen des Sphäroids liegen. Das Haupt-Theorem, auf das sich die allgemeine Auflösung dieses Problems hauptsächlich gründet, hatte zwar schon *Le Gendre* in der oben angeführten Abhandlung durch Induction gefolgert; allein *La Place* gelang es zuerst, alles streng zu beweisen, und dadurch die Auflösung vollkommen zu machen. (*Hist. de l'Acad. roy. des sciences de Paris 1782*). Auch in den Werken (*Théorie du mouvement et de la figure ellipt. des planètes*, und in der *Méc. cél. Vol. 2*) ist dieselbe Auflösung enthalten. Die Eleganz und der Scharfsinn dieser *La Place'schen* Auflösung wird gewiss niemand unbewundert lassen; allein eben die viele Kunst, mit der große Schwierigkeiten überwunden werden mußten, machte den Geometern eine einfachere, minder verwickelte und directere Auflösung, immer noch wünschenswerth. Auch der neue von *Le Gendre* gegebene Beweis des Haupt-Theorems (*Hist. de l'Acad. roy. des sc. 1788 sur les intégral. doubles*), entsprach diesem Wunsche nicht ganz, so sehr auch aller

Mathe-

Mathematiker Urtheil dessen seltne analytische Kunst anerkennt. *) Späterhin haben *Biot* und *Plana*, diese Auflösung einfacher zu machen versucht, (*Mém. de l'Institut. T. IV. Memor. di matem. e di fisic. della societ. ital. T. XV*), allein daß beyder Auflösungen demohngeachtet noch immer zu den verwinkeltesten analytischen Entwicklungen gehören, wird gewiß von allen Kennern nicht bezweifelt.

Erwünscht glauben wir daher, wird den Analytisten und Astronomen eine neue und eigenthümliche Auflösung dieses Problems seyn, die, wie es uns scheint, vermöge ihrer Einfachheit nichts zu wünschen übrig läßt.

Diese Auflösung selbst nimmt nur ein paar Seiten ein; allein vor Uebergang auf das Problem, was der eigentliche Zweck dieser Abhandlung ist, schien es der Mühe werth, einige vorläufige auch anderswo brauchbare Untersuchungen, allgemeiner und umständlicher abzuhandeln, als es jene Aufgabe an sich erfordert.

Es wird ganz allgemein, ein endlicher Körper von irgend einer Gestalt angenommen, der vom übrigen unendlichen Raum, durch eine oder mehrere continuirliche, von einander unterschiedene Flächen (im Fall der Körper vielleicht eine oder mehrere Höhlungen in sich schlosse) getrennt ist, und dessen

Com-

*) *La Grange* fällt von diesen beyden Auflösungen folgendes Urtheil: *On ne peut regarder leurs solutions que comme des chefs d'oeuvres d'analyse, mais on peut desirer encore une solution plus directe et plus simple; et les progrès continuels de l'analyse donnent lieu de l'espérer. Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin 1793 p. 263.*

Complexus die Oberfläche des Körpers ausdrückt. Sey diese Oberfläche in eine unendliche Zahl von Elementen ds getheilt; P ein Punct des Elementes ds , dessen auf drey unter sich recht winklige Ebenen bezogene Coordinaten $= x, y, z$: PX , PY , PZ , sind gerade den Coordinaten-Axen parallele, nach der Richtung zugehende Linien, in der die Incremente der Coordinaten positiv genommen werden; PQ Normal von aussen her auf die Oberfläche. Sey ferner M ein irgendwo befindlicher angezogener Punct, dessen Coordinaten a, b, c , und der immer positiv anzunehmende Abstand $PM = r$. Die zwischen PM und PX , PY , PZ eingeschlossenen Winkel, sollen durch MX , MY , MZ , und die zwischen PQ und PX , PY , PZ , PM , durch QX , QY , QZ , QM , bezeichnet werden. Alle diese Bezeichnungen gelten unbestimmt für Puncte der Oberfläche, und sobald von mehreren bestimmten Puncten derselben die Rede ist, werden dieselben Zeichen durch Accente unterschieden werden.

3.

Man denke sich eine der Coordinaten-Axe x normale Ebene, von der Beschaffenheit, daß wenn deren Gleichung $x = \alpha$, α kleiner als der kleinste Werth der Coordinate x , auf der Oberfläche des Körpers ist. Der auf diese Ebene projecirte Körper, wird dort eine endliche Figur bilden, die wir in eine unendliche Menge von Elementen $d\Sigma$ zerlegt annehmen. Im Puncte Π des Elements $d\Sigma$ werde ein Perpendikel errichtet (oder mit andern Worten, eine der Coordinaten-Axe x parallele Linie), was den

den Körper in den Punkten $P', P'', P''' \dots$ schneidet; die Zahl dieser durchschnittenen Punkte wird offenbar gleich seyn. Man ziehe ferner aus den einzelnen Punkten des Umkreises von $d\Sigma$ Perpendikel auf die Ebene, die im weitem Verstand eine cylindrische Oberfläche bilden, und von der des Körpers die Elemente, $ds', ds'', ds''' \dots$ abschneiden. Das Element $d\Sigma$ wird die Projection der einzelnen Elemente $ds', ds'', ds''' \dots$ seyn und daher $d\Sigma = \pm ds' \cos QX, = \pm ds'' \cos QX'' = \pm ds''' \cos QX''' \dots$ wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem der Cosinus spitzig oder stumpf ist. Da aber offenbar das Perpendikel bey P' im Körper eintritt, bey P'' wieder aus, bey P''' ein, und so fort, so sieht man leicht, daß QX' stumpf, QX'' spitzig, QX''' stumpf \dots seyn werde; hiernach $d\Sigma = - ds' \cos QX' = + ds'' \cos QX'' = - ds''' \cos QX''' \dots$

und wegen Gleichheit der Glieder

$$ds' \cos QX' + ds'' \cos QX'' + ds''' \cos QX''' + \dots = 0;$$

Werden alle übrige Elemente $d\Sigma$ eben so behandelt und summirt so ergibt sich

Theorema I.

Das auf die ganze Oberfläche des Körpers ausgedehnte Integral $\int ds \cos QX = 0$;

Allgemeiner findet sich, daß das Integral:

$$\int (T \cos QX + U \cos QY + V \cos QZ) ds$$

Null wird, wenn $T, U, V \dots$ rationale Functionen, respective von y, z , von x, z , und von x, y , bezeichnen.

Da

4.

Da die Volumina der zwischen jener Ebene und den Puncten P' , P'' , P''' , enthaltenen Cylinderstücken, respective sind $= d\Sigma (x' - a)$, $d\Sigma (x'' - a)$, $d\Sigma (x''' - a) \dots$ so wird das innerhalb dieser Cylinder befindliche Volumen des Körpers

$$\begin{aligned} &= -x' d\Sigma + x'' d\Sigma - x''' d\Sigma + \dots \\ &= ds' x' \cos QX' + ds'' x'' \cos Qx'' + \\ &\quad ds''' x''' \cos QX''' + \dots \end{aligned}$$

woraus bey Summation für alle $d\Sigma$ erhalten wird,

Theorema II.

Das Volumen des ganzen Körpers wird durch das über die ganze Oberfläche ausgedehnte Integral $\int ds x \cos QX$ ausgedrückt.

Offenbar kann dasselbe Volumen auch durch $\int ds y \cos QY$, oder durch $\int ds \cos QZ$ ausgedrückt werden,

5.

Wir betrachten zuerst einen gleichförmig mit Materie angefüllten Cylinder, um die Attractionsfähigkeit seiner einzelnen Theile auf einen Punct M , zu bestimmen. Es werde dieser Cylinder durch der Grundfläche parallele, einander unendlich nahe Ebenen, in Elementar-Cylinder zertheilt, so wird deren einer $= d\Sigma d\xi$, wenn ξ, η, ζ , die Coordinaten für einen Punct dieses Elementar-Cylinders bedeuten. Dessen Abstand vom Puncte M ist

$$= r[(a - \xi)^2 + (b - \eta)^2 + (c - \zeta)^2] = r;$$

die Attraction selbst auf den Punct M kann daher gegeben werden durch $d\Sigma d\xi f_r$; wo f_r das At-

tra-

tractions - Gesetz ausdrückt. Da durch den ganzen Cylinder nur ξ als variabel anzusehen ist, so wird

$$\rho d\rho = -(a - \xi) d\xi, \text{ und hiernach die Attraction des Elementes } = - \frac{\rho f \rho d\rho d\Sigma}{(a - \xi)}.$$

Wird die Attraction in drey partielle den Coordinaten - Axen parallele und entgegengesetzte aufgelöst, so ist die erste $= - \int \rho d\rho d\Sigma$. Es werde das Integral $\int \rho f \rho d\rho$ durch $F\rho$ bezeichnet, so ist die Attraction des Cylinders von der Grundfläche $d\Sigma$ bis zu dem Punct dessen Coordinate $= \xi$, in der Richtung der Coordinaten - Axe x auf den Punct M

$$= - (F\rho - \text{const.}) d\Sigma = - (F\rho - FR) d\Sigma,$$

wo R die Distanz der Basis $d\Sigma$ von M bedeutet. Hieraus folgt dieselbe partielle Attraction aller innerhalb des Cylinders liegenden Theile des Körpers

$$= (Fr' - Fr'' + Fr''' - \dots) d\Sigma$$

$$= - Fr' ds' \cos QX' - Fr'' ds'' \cos QX'' \\ - Fr''' ds''' \cos QX''' - \dots$$

Wird diese Schlussfolge auf alle Elemente $d\Sigma$ ausgedehnt, so folgt

Theorema III.

Die der Coordinaten - Axe x parallele und entgegengesetzte Attraction des Körpers auf den Punct M wird ausgedrückt durch das auf die ganze Oberfläche ausgedehnte Integral $-\int Fr ds \cos QX$.

Offenbar wird die Attraction nach der Richtung der beyden andern Haupt - Axen auf eine ähnliche Art durch die Integrale

$$-\int Fr ds \cos QY, \quad -\int Fr ds \cos QZ, \text{ gegeben.}$$

6.

Um den Gegenstand auf eine andere Art anzugreifen, so denke man sich, eine mit dem Radius $= r$ um den Mittelpunct M beschriebene, in unendlich kleine Elemente zerlegte sphärische Oberfläche. Sey Π ein auf der Oberfläche dem kleinern Raum $d\Sigma$ zugehöriger Punct, und $M\Pi$ ein, nöthigen Falls, unbestimmt über die Oberfläche hinaus verlängerter Radius. $P', P'', P''' \dots$ sind die Puncte, wo dieser Radius den fraglichen Körper durchschneidet, jedoch mit Ausschluss des Punctes M , wenn dieser vielleicht in dessen Oberfläche selbst läge. Die Zahl dieser Durchschnittspuncte wird gleich oder ungleich seyn, je nachdem M innerhalb oder außerhalb des körperlichen Raums liegt, und dessen Lage auf der Oberfläche selbst, muss zur ersten oder letzten Cathégorie gerechnet werden, je nachdem der Radius $M\Pi$ anfanglich entweder den Körper verlässt oder in diesen eintritt. Von M aus ziehe man an die Peripherie des Raumes $d\Sigma$ gerade Linien, die im weitern Sinne eine conische Oberfläche bilden, und auf der Oberfläche des Körpers an den Puncten P', P'', P''' , die Räume $ds', ds'', ds''' \dots$ begrenzen. Endlich beschreibe man aus dem Mittelpuncte M , mit den Radien $MP' = r', MP'' = r'', MP''' = r''' \dots$ durch die Puncte $P', P'', P''' \dots$ Theile sphärischer Oberflächen; $d\sigma', d\sigma'', d\sigma''' \dots$ sind die Räume, die jene Kegel-Oberfläche aus ihnen ausschneidet. Alle diese Räume, $d\Sigma, ds', d\sigma' \dots$ werden als positiv angesehen. Vermöge dieser Constructionen ist

$$d\Sigma = \frac{d\sigma'}{r' r'} = \frac{d\sigma''}{r'' r''} = \frac{d\sigma'''}{r''' r'''} \dots \quad \text{Der}$$

Der Elementar-Raum $d\sigma'$ kann angesehen werden, als die Projection des Raumes ds' auf eine Ebene, der die Gerade $P'M$ normal ist; hiernach $d\sigma' = \pm ds' \cos MQ'$, wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem MQ' spitzig oder stumpf ist: das erstere findet Statt, so oft die von P nach M gezogene Linie sich vom Körper entfernt d. h. so oft M außerhalb dessen liegt, das letztere aber wenn $P'M$ im Körper eintritt. Ferner wird seyn

$$d\sigma'' = \mp ds'' \cos MQ'', \quad d\sigma''' = \pm ds''' \cos MQ''', \dots$$

woraus folgt

I. Wenn M innerhalb des Körpers liegt

$$ds' \cos MQ' = + r' r' d\Sigma$$

$$ds'' \cos MQ'' = - r'' r'' d\Sigma$$

$$ds''' \cos MQ''' = + r''' r''' d\Sigma$$

...

II. Wenn M außerhalb des Körpers liegt

$$ds' \cos MQ' = - r' r' d\Sigma$$

$$ds'' \cos MQ'' = + r'' r'' d\Sigma$$

$$ds''' \cos MQ''' = - r''' r''' d\Sigma$$

...

Im erstern Falle wird daher (wegen Gleichheit der Zahl der Gleichungen)

$$\frac{ds' \cos MQ'}{r' r'} + \frac{ds'' \cos MQ''}{r'' r''} + \frac{ds''' \cos MQ'''}{r''' r'''} + \dots = 0;$$

im zweyten Falle aber (wegen ungleicher Anzahl der Gleichungen)

$$\frac{ds' \cos MQ'}{r' r'} + \frac{ds'' \cos MQ''}{r'' r''} + \frac{ds''' \cos MQ'''}{r''' r'''} + \dots = - d\Sigma;$$

Werden alle Elemente $d\Sigma$ so behandelt und summirt, so ist auf der linken Seite offenbar, das über die ganze Ober-

Oberfläche ausgedehnte Integral $\int \frac{ds \cos MQ}{r r}$, zur rechten aber, für den ersten Fall Null, für den letzten aber, die ganze mit dem Radius $= 1$ beschriebene sphärische Oberfläche, negativ genommen, d. h. $= -4\pi$; $\pi =$ der Semiperipherie eines Kreises, dessen Radius $= 1$;

Der Fall, wo M in der Oberfläche des Körpers selbst liegt, bedarf einer besondern Betrachtung. Man denke sich eine die Oberfläche des Körpers an dem Punkte M berührende Ebene; die die sphärische Oberfläche in zwey gleiche Hälften theilt; die eine auf derselben Seite, wo sich das körperliche Volumen bey M befindet, die andere auf der entgegengesetzten Seite. Hinsichtlich aller Elemente $d\Sigma$ die sich in der ersten Hälfte befinden, muß der Punkt M als ein innerer, für alle übrigen aber, als ein äußerer angesehen werden. Aus der Summation aller

$$\frac{ds' \cos MQ'}{r' r'} + \frac{ds'' \cos MQ''}{r'' r''} + \frac{ds''' \cos MQ'''}{r''' r'''} + \dots$$

wird daher nur die negativ zu nehmende halbe Kugel-Oberfläche erhalten. Hiernach folgt

Theorema IV.

Das über die ganze Oberfläche des Körpers ausgedehnte Integral $\int \frac{ds \cos MQ}{r r}$ wird entweder $= 0$, oder $= -2\pi$, oder $= -4\pi$, je nachdem M innerhalb des Körpers oder in dessen Oberfläche, oder außerhalb des Körpers liegt.

Durch

Durch dieselben Schlüsse läßt es sich übrigens erweisen, daß das Integral $\int \frac{P ds \cos MQ}{r r}$ im erstern Falle verschwindet, wenn P eine rationelle Function der Gröſſen $\cos MX$, $\cos MY$, $\cos MZ$ ist.

7.

Das Volumen des Kegel-Raums von der Spitze bis zu dem Punct P' , P'' , P''' ist respect. $= \frac{1}{3} r' d\sigma'$, $\frac{1}{3} r'' d\sigma''$, $\frac{1}{3} r''' d\sigma''' \dots$ oder $= \pm \frac{1}{3} r' ds' \cos MQ'$, $= \mp \frac{1}{3} r'' ds'' \cos MQ''$, $= \pm \frac{1}{3} r''' ds''' \cos MQ''' \dots$ wo die obern oder untern Zeichen gelten, je nachdem M inner- oder auſſerhalb des Körpers liegt. Im erstern Falle machen die Kegeltheile von P' zu P'' , von P''' zu $P^{iv} \dots$ im andern aber die von M zu P' , von P'' zu $P''' \dots$ Theile der Solidität des Körpers aus. In beyden Fällen ist der Theil des Körpers, der in dem, $d\Sigma$ zur Grundfläche habendem Kegel, inne begriffen ist,

$$= -\frac{1}{3} (r' ds' \cos MQ' + r'' ds'' \cos MQ'' + r''' ds''' \cos MQ''' + \dots)$$

Bey gleichartiger Behandlung aller Elemente $d\Sigma$ und durch Summation, ergibt sich

Theorema V.

Das Volumen des ganzen Körpers ist gleich dem über dessen ganze Oberfläche ausgedehnten Integral, $-\frac{1}{3} \int r ds \cos MQ$.

8.

Sey nun ein gleichförmig dichter Körper, dessen einzelne Elemente auf den Punct M eine Attraction ausüben, die einer Function der Distanz proportional

ist, so daß wenn ϱ die Distanz des Elementes von dem angezogenen Punct ausdrückt, die Attraction gleich ist dem Product aus dem Volumen des Elementes in f_{ϱ} . Man denke sich nun, den auf der Grundfläche $d\Sigma$ construirten Kegel, ganz mit Materie angefüllt, und durch sphärische aus dem Mittelpuncte M beschriebene unendlich nahe Oberflächen, in eine unendliche Menge von Elementen zerlegt. Ein solches Element in der Kugel deren Radius $= \varrho$ $= - \varrho \varrho d\varrho d\Sigma$ und hiernach dessen Attraction auf $M = d\Sigma \varrho \varrho f_{\varrho} d\varrho$. Bezeichnet man das Integral von $\int \varrho \varrho f_{\varrho} d\varrho$ durch φ_{ϱ} , so drückt $d\Sigma (\varphi_{\varrho} - \varphi_0)$ die Attraction des Kegeltückes von der Spitze bis zum Abstand ϱ auf den Punct ϱ aus, oder allgemeiner, $d\Sigma (\varphi_{\varrho'} - \varphi_{\varrho})$ ist der Attraction des Kegeltückes zwischen den Abständen ϱ' , ϱ vom Scheitel, gleich. Der Punct M wird daher von allen innerhalb des Kegels liegenden körperlichen Theilen, in der Richtung MII , angezogen durch die Kraft

$$= d\Sigma (-\varphi r' + \varphi r'' - \varphi r''' + \dots)$$

wenn M innerhalb des Körpers liegt, oder

$$= d\Sigma (-\varphi_0 + \varphi r' - \varphi r'' + \varphi r''' - \dots)$$

wenn außerhalb. Oder es ist im erstern Fall diese Kraft

$$= - \frac{d\Sigma \varphi r' \cos MQ'}{r' r'} - \frac{d\Sigma \varphi r'' \cos MQ''}{r'' r''} - \frac{d\Sigma \varphi r''' \cos MQ'''}{r''' r'''} - \dots$$

zu der im letztern Fall noch das Glied $- d\Sigma \varphi_0$ hinzugesetzt werden muß.

Das Product dieses Ausdrucks in $\cos MX$ gibt die Kraft, womit der Punct von den innerhalb des Kegels liegenden Theilen des Körpers parallel mit

den Coordinaten x und im entgegen gesetzten Sinn angezogen wird. Die Kraft also, womit der ganze Körper nach eben dieser Richtung wirkt, wird durch das Integral

$$- \int \frac{ds \varphi r \cos MQ \cos MX}{r^2}$$

ausgedrückt werden, welches über die ganze Oberfläche des Körpers auszudehnen ist: Zu dieser Formel, welche für den Fall gilt, wo der angezogene Punkt ausserhalb des Körpers liegt, muß, wenn dieser innerhalb liegt, noch hinzukommen:

$$- \varphi \circ \int d\Sigma \cos MX$$

über die ganze Oberfläche der Kugel genommen.

Endlich wird, wenn der angezogene Punkt in der Oberfläche des Körpers selbst liegt, eben dies Integral $-\varphi \circ \int d\Sigma \cos MX$ hinzugefügt werden müssen, aber nur über die halbe Kugelfläche ausgedehnt; diese Halb Kugelfläche wird nämlich bestimmt durch eine den Körper in M berührende Ebene, so daß sie auf derselben Seite dieser Ebene liegt, wie der Körper selbst am Punkte M . Um den Werth dieses hinzuzufügenden Integrals auszumitteln, wollen wir uns eine solide halbe Kugel vorstellen, zwischen jener Halb Kugelfläche und der Ebene. Es mag θ allgemein den Winkel vorstellen, zwischen einer nach aussen gerichteten Normale auf die Oberfläche und einer Parallele mit der Axe der x . Vermöge unseres ersten Theorems wird das Integral $\int ds \cos \theta$, über die ganze Oberfläche unserer körperlichen Halbkugel ausgedehnt $= 0$ seyn. Setzen wir also das Integral, insofern es nur über den ebenen Theil dieser Oberfläche

fläche ausgedehnt wird $\equiv J$, so wird dasselbe Integral, blos über den krummen Theil der Oberfläche erstreckt, nothwendig $\equiv -J$ seyn müssen. Da aber in dem ebenen Theil der Oberfläche θ offenbar constant und dem Werthe von MX gleich ist, welcher in dem Puncte M statt findet, so wird J gleich seyn dem Product des Cosinus dieses Winkels in den Flächeninhalt des ebenen Theils der Oberfläche d. i. in Π . Hieraus ziehen wir den Schluss, daß das Integral $-\phi \circ \int d\S \cos MX$, über die vorhin bestimmte Halb-Kugelfläche ausgedehnt, $\equiv -\pi \phi \circ \cos MX$ werde, wo für MX der in M statt findende Werth zu nehmen ist. Ganz auf gleiche Weise findet sich der Werth des Integrals $-\phi \circ \int d\S \cos MX$ über die andere Hälfte der Kugelfläche erstreckt $\equiv +\pi \phi \circ \cos MX$; daher es über die ganze Kugelfläche ausgedehnt $\equiv 0$ wird.

Durch dies alles begründet sich

Theorema VI.

Die der Coordinaten-Axe x parallele und entgegen gesetzte Attraction des Körpers auf den Punct M ist gleich dem Integral

$$-\int \frac{ds \phi r \cos MQ \cos MX}{r^2};$$

über die ganze Oberfläche ausgedehnt, es mag M , inner oder außerhalb des Körpers liegen, wozu der Theil $-\pi \phi \circ \cos MX$ hinzugesetzt werden muß, wenn M in der Oberfläche selbst befindlich ist, wo dann für MX der bestimmte in M statt findende Werth anzunehmen ist.

Offenbar werden die im Sinne der Coordinaten-Axen y, z und entgegen gesetzt genommenen Kräfte, ausgedrückt durch die Integrale

$$- \int \frac{ds \varphi r \cos MQ \cos MY}{r r}, \quad - \int \frac{ds \varphi r \cos MQ \cos MZ}{r r},$$

denen für ein in der Oberfläche liegendes M , die Werthe $-\pi \varphi \circ \cos MY$, $-\pi \varphi \circ \cos MZ$ (mit Substitution der bestimmten Angular - Werthe für M) hinzugefügt werden müssen. Uebrigens sieht man leicht, daß die drey Kräfte $-\pi \varphi \circ \cos MX$, $-\pi \varphi \circ \cos MY$, $-\pi \varphi \circ \cos MZ$, der einzigen der Oberfläche selbst normalen und nach innen zu gerichteten Kraft $-\pi \varphi \circ$ gleich sind.

Der Entwicklung des Integrals $-\varphi \circ \int d\Sigma \cos MX$ hätten wir offenbar überhoben seyn können, wenn die Function f so beschaffen ist, daß $\varphi \circ = 0$ angenommen werden kann; allein es ist nicht geschehen, um die Untersuchung in größter Allgemeinheit durchzuführen. So oft aber die Anziehung im Verhältniß des Cubus oder einer höhern Potenz der Distanz angenommen wird, ist jene Voraussetzung nicht erlaubt, indem dann nothwendig $\varphi \circ = -\infty$ und folglich jeder in der Oberfläche selbst befindliche Punct, mit einer unendlichen Kraft nach dem Körper gravitirt.

9.

Vermöge der hier auseinander gesetzten Methoden, sind die auf das ganze körperliche Volumen auszudehnende Integralen (dreyfache Integrale) auf einem doppelten Wege auf solche reducirt worden, die nur die Oberfläche des Körpers umfassen. Die

Natur

Nur der Oberfläche wird durch eine Gleichung zwischen den Coordinaten x, y, z , also durch die Gleichung $W=0$, ausgedrückt; wo für W eine rationale Function der veränderlichen Größen x, y, z , angenommen werden kann. Die Differentiation dieser Function gibt

$$dW = Tdx + Udy + Vdz;$$

wo bekanntlich T, U, V den Cosinussen der Winkel proportional sind, die zwischen einer geraden der Oberfläche normalen Linie und den Parallelen der Coordinaten-Axen x, y, z eingeschlossen sind; d. h. die Winkel $\angle QX, \angle QY, \angle QZ$. Hiernach folgt:

$$\cos \angle QX = \frac{\pm T}{\sqrt{(TT + UU + VV)}};$$

$$\cos \angle QY = \frac{\pm U}{\sqrt{(TT + UU + VV)}};$$

$$\cos \angle QZ = \frac{\pm V}{\sqrt{(TT + UU + VV)}};$$

wo es jedoch unentschieden bleibt, was für Zeichen anzunehmen sind. Sey, um dies zu entscheiden, in der geraden, der Oberfläche in P normalen und aufserhalb gerichteten Linie PQ ein Punct P' , P unendlich nahe, deren Distanz $PP' = dw$; die Coordinaten dieses Punctes P' werden respect. seyn

$$x + dw \cos \angle QX = x + dx;$$

$$y + dw \cos \angle QY = y + dy;$$

$$z + dw \cos \angle QZ = z + dz;$$

folglich das Increment der Function W vom Puncte P (wo $W=0$,) bis zu P' ,

$$= dw$$

$$\begin{aligned}
 &= dw (T \cos QX + U \cos QY + V \cos QZ) \\
 &= \pm dw (TT + UU + VV)
 \end{aligned}$$

Es folgt hieraus, daß das obere Zeichen statt finden wird, wenn abwärts vom Körper die Function W einen positiven und im körperlichen Volumen selbst einen negativen Werth erhält; im umgekehrten Fall gilt das untere Zeichen. Da die Oberfläche von der hier die Rede ist, einmal den soliden Körper vom übrigen leeren Raum trennt, dann die Raumtheile, wo die Function W positiv ist, von denen wo jene einen negativen Werth erhält, so wird allgemein der Werth der Function W entweder außerhalb positiv, innerhalb negativ, und hierfür die obern Zeichen gelten, oder außerhalb negativ und innerhalb positiv seyn, wo dann das untere Zeichen zu nehmen ist.

Noch leichter lassen sich die Cosinuse der übrigen in unsern Formeln vorkommenden Winkel bestimmen. Es ist

$$a = x + r \cos MX$$

$$b = y + r \sin MY$$

$$c = z + r \sin MZ$$

hiernach

$$r = \sqrt{(a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2}$$

$$\cos MX = \frac{a-x}{r};$$

$$\cos MY = \frac{b-y}{r};$$

$$\cos MZ = \frac{c-z}{r};$$

und vermöge eines bekannten Theorems

$$\cos MQ = \cos MX \cos QX + \cos MY \cos QY + \cos MZ \cos QZ$$

oder

oder

$$\cos MQ = \pm \frac{T(a-x) + U(b-y) + V(c-z)}{r\sqrt{TT+UU+VV}}$$

10.

Um die Integration dieser Differential-Ausdrücke für die ganze Oberfläche bewirken zu können, müssen diese in solche verwandelt werden, wo nur zwey veränderliche Größen vorkommen. Dies könnte durch Elimination einer der variablen Größen x, y, z , mittelst der Gleichung $W = 0$ geschehen; allein da auf diesem Wege meistens sehr verwickelte Ausdrücke erhalten werden, so ist es vorteilhafter, zwey neue unbestimmte Größen p, q einzuführen, von denen die Werthe von x, y und z abhängen.

Sobald also die Größen p, q bestimmte Werthe erhalten, werden auch die von x, y, z bestimmt seyn, d. h. daß ein bestimmter Punct auf der Oberfläche des Körpers ihnen entspricht. Sey, um diese gegenseitige Abhängigkeit augenscheinlich darzustellen, eine unbestimmte Fläche, deren einzelne Puncte durch die rechtwinklichten Coordinaten p, q dargestellt werden. Jedem Punct der Ebene wird ein Punct der Oberfläche entsprechen, und zwar nur ein einziger, wenn x, y, z , einförmige Functionen von p, q sind. Daß aber auch umgekehrt, durch x, y, z , die Größen p, q vollkommen und ohne Zweydeutigkeit bestimmt werden, so kann offenbar jedem Punct der körperlichen Oberfläche nur ein einziger der Ebene entsprechen, die in diesem Falle überall ins Unendliche ausgedehnt werden muß,

um

um die ganze Oberfläche des Körpers zu umfassen. Außerdem braucht aber nur der durch endliche oder unendliche Gränzen bestimmte Theil der Ebene berücksichtigt werden, der die Oberfläche des Körpers gewissermaßen darstellt. Sey nun diese Ebene durch eine unendliche Menge gerader Linien, die der Abscissen-Axe theils parallel theils normal sind, in rechtwinkliche Elemente zerlegt, so ist ein solches Element, was zwischen den Punkten enthalten ist, deren Coordinaten

$$\begin{aligned} p, q \\ p + dp, q \\ p, q + dq \\ p + dp, q + dq \end{aligned}$$

sind, $= dp dq$ und entspricht auf der Oberfläche des Körpers dem parallelogrammischen Element, dessen vier Eckpunkte folgende Coordinaten haben:

I. x, y, z

II. $x + \lambda dp, y + \mu dp, z + \nu dp$

III. $x + \lambda' dq, y + \mu' dq, z + \nu' dq$

IV. $x + \lambda dp + \lambda' dq, y + \mu dp + \mu' dq, z + \nu dp + \nu' dq$;

es ist dabey

$$dx = \lambda dp + \lambda' dq$$

$$dy = \mu dp + \mu' dq$$

$$dz = \nu dp + \nu' dq.$$

Die Projectionen dieser $= ds$ angenommenen Fläche, auf drey den Coordinaten-Axen x, y, z , normale Ebenen, findet sich leicht

$$\begin{aligned} &= \pm (\mu \nu' - \nu \mu'). dp dq \\ &\pm (\nu \lambda' - \lambda \nu'). dp dq \\ &\pm (\lambda \mu' - \mu \lambda'). dp dq \end{aligned}$$

und

und hiernach vermöge eines bekannten Theorems, die Fläche des Elementes selbst

$$= dp dq \sqrt{[(\mu v' - v \mu')^2 + (v \lambda' - \lambda v')^2 + (\lambda \mu' - \mu \lambda')^2]}$$

Es folgt hieraus, daß die in unsern sechs Theoremen dargestellten einzelnen Integrale, auf die Form $\int S dp dq$ reducirt werden, wo S entweder explicite oder implicite Function der beyden unbestimmten Grö-
ßen p, q ist, und daß die Integration entweder über die ganze unendliche Ebene, oder nur über den Theil derselben auszudehnen ist, der die ganze Oberfläche des befragten Körpers so zu sagen darstellt. Ueber die Integration selbst lassen sich keine allgemeinen Regeln geben, da dazu bald diese bald jene Kunstgriffe erforderlich werden.

Uebrigens bemerken wir noch, daß bey Ausdrückung der Grö-
ßen x, y, z , durch p, q die Function W nothwendig identisch $= 0$ werden muß, und eben so auch, unabhängig von den Werthen dp, dq ,

$$0 = (\lambda T + \mu U + v V) dp + (\lambda' T + \mu' U + v' V) dq;$$

oder

$$\lambda T + \mu U + v V = 0;$$

$$\lambda' T + \mu' U + v' V = 0;$$

Daraus folgt, daß die Grö-
ßen $\mu v' - v \mu', v \lambda' - \lambda v', \lambda \mu' - \mu \lambda'$ respect. T, U, V oder den Cosinussen der Winkel QX, QY, QZ , proportional sind, was sich schon aus dem obigen nur mit einer über die Zeichen übrig bleibenden Unbestimmtheit herleiten liefs.

(Die Fortsetzung folgt.)

V.

Über die Gleichung von langer Periode
in der Theorie des Mondes.

Vom

Grafen *La Place*.*)

Ich lege hier das Resultat der Vergleichen vor, die auf meine Bitte von *Bouvard* und *Arago*, zwischen den vom *Bureau des Longitudes* herausgegebenen *Bürgschen* Mondstafeln und den Beobachtungen von *La Hire* und *Flamsteed*, angestellt worden sind. Die Orte und die Bewegungen der Sterne, mit denen der Mond bey diesen Beobachtungen verglichen wurde, sind aus den Catalogen von *Bradley*, *Mayer* und *La Caille* für 1750 verglichen mit den neuern Bestimmungen von *Maskelyne* und *Piazzi* hergeleitet worden; bleibt auch noch vielleicht eine kleine Ungewissheit über Präcession der Nachtgleichen übrig, so kann doch diese auf die mittlere Sideral Bewegung des Mondes und die darinnen vorkommenden Anomalien keinen Einfluss haben.

Von *La Hire* wurden 72 Beobachtungen in Rechnung genommen, die in dem Zeitraum vom 4. Julius 1685 bis zum 27. Nov. 1686 gemacht wurden, so daß deren mittlere Epoche auf 1685,4 **) fällt

*) *Connoissance des tems* 1815.

**) Diese Angabe scheint durch einen Druckfehler entstellt zu seyn.

fällt. Ihre Summe gibt $+ 1,^{\circ}25$ Correction der Tafel-Epoche, das heißt, so viel muß zu der Epoche addirt werden, um die aus den Beobachtungen hergeleitete mittlere Länge zu erhalten. Verwirft man zehn Beobachtungen, die mehr als $30''$ Fehler geben, so wird die Correction der Epoche $+ 1,^{\circ}08$, was nur wenig vom vorherigen Resultat abweicht; wir behalten jedoch hier das Resultat aus der ganzen Summe der Beobachtungen bey. Allein da die hier gefundene Epochen - Correction die langjährige Monds - Ungleichheit, die für diese Zeit $10,^{\circ}80$ beträgt, in sich faßt, so beträgt die wahre von dieser Gleichung unabhängige Verbesserung der Epoche $- 9,^{\circ}55$.

Aus *Flamsteeds* Beobachtungen wurden achtzig gewählt, die in dem Zeitraum vom 23. Jan. 1690 bis 11. Junius 1693 gemacht worden sind. Ihre Summe gibt für die mittlere Epoche von 1691,4 Correction der Tafel-Epoche $+ 1,^{\circ}45$; die Correction wird $+ 1,^{\circ}70$, wenn funfzehn Beobachtungen, die über $30''$ Fehler geben, verworfen werden. Für diese Zeit betrug der Werth der langjährigen Ungleichheit $- 9,^{\circ}0$, und hiernach wahre Correction der Tafel-Epoche $- 7,^{\circ}55$.

Bürg, den ich zu ähnlichen Untersuchungen aufgefördert hatte, findet aus 165 *Flamsteed*'schen Beobachtungen für die Epoche Correction seiner Tafeln, so wie sie vom *Bureau des Longitudes* herausgegeben worden sind $- 8,^{\circ}03$. Das mittlere Resultat aus beyden Bestimmungen gibt für 1691,4 Correction der Tafel-Epoche $- 7,^{\circ}79$.

Aus meinen frühern Untersuchungen *) über diesen Gegenstand, sieht man, daß diese Correction für 1756 $+ 12,^{\circ}0$, für 1779 $+ 9,^{\circ}9$ und für 1801 $+ 2,^{\circ}0$ beträgt; die mittlere Mondsbe-
 wegung ist also von 1691,4 — 1756 größer als die der Tafeln um $12,^{\circ}0 + 7,^{\circ}79$ und dagegen von 1756 — 1801 kleiner um $12,^{\circ}0 - 2,^{\circ}0$.

Diese Abnahme der jetzigen mittlern Mondsbe-
 wegung folgt auch aus den Rechnungen, die neuer-
 lich vom *Bureau des Longit.* bey Vergleichung der
Burckhardtschen und *Bürg'schen* Mondstafeln ver-
 anlaßt worden sind. Vermöge der Regeln, die ich
 hierüber in meiner *Théorie des probabilités* gegeben
 habe, mußten die Tafeln, in denen die Summe der
 Fehler-Quadrate die kleinste war, vorgezogen wer-
 den, was sowohl in Länge als Breite bey denen von
Burckhardt der Fall war.

Ein hundert und sechs und sechszig zu Green-
 wich und auf der kaiserlichen Sternwarte zu Paris
 gemachte Beobachtungen geben für 1804,5 die Cor-
 rection der *Bürg'schen* Epoche $- 0,^{\circ}37$; hundert sie-
 ben und dreyßig Beobachtungen von *Burchardt* ge-
 ben diese Correction für 1811,5 $- 2,^{\circ}46$, so daß
 also auch die neuesten Beobachtungen die jetzige Ver-
 minderung der mittlern Mondsbe-
 wegung bestätigen. Um diese Anomalien der mittlern Mondsbe-
 wegung zu verbessern, hatte ich *Bürg* eine Gleichung von
 langer Periode angezeigt, die vom Sinus des Argu-
 ments ($2 \text{ long. } \Omega \gg + \gg \text{ perig.} - 3 \text{ long. } \odot \text{ perig.}$)
 abhing, und durch die alle Beobachtungen von
 1685

*) *Mon. Corresp.* Bd. XXIV S. 564.

1685 — 1811 gut dargestellt werden. Allein dasselbe geschieht mittelst einer Gleichung, die vom Cosinus des Arguments ($2 \text{ long. } \Omega + \text{perig.}$) abhängt, und deren Coefficient wie die Theorie zeigt, merklicher als der, der vorherigen Gleichung seyn muß. Aus diesem Grunde habe ich *Burckhardt* veranlaßt, in seinen Tafeln von der letztern Form Gebrauch zu machen, und wird, wie es die vorherigen Rechnungen sehr wahrscheinlich machen, diese Ungleichheit durch künftige Beobachtungen bestätigt, so werden daraus, über die Differenz der beyden Erd Halbkugeln, von der jene Gleichung abhängt, Resultate erhalten werden können.

VI.

Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806, auf Befehl Seiner kais. Maj. *ALEXANDER DES ERSTEN* auf den Schiffen *Nadeshda* und *Newa*, unter dem Commando des Capitains von der kaiserl. Marine, *A. J. von Krusenstern*.
III. Theil. St. Petersburg 1812.

Fast unerwartet war es uns, als wir vor wenig Tagen den vor uns liegenden Band der *Krusenstern'schen* Reise erhielten, und wir säumen nicht unsern Lesern einen kurzen Auszug davon mitzutheilen, da in diesem Augenblick wahrscheinlich nur wenig Exemplare davon in Deutschland vorhanden sind. Aus frühern in dieser Zeitschrift befindlichen Anzeigen (*M. C.* Bd. XXI S. 340, 400. Bd. XXIV. S. 148, 473) sind unsre Leser mit dem Inhalte der beyden erstern, die eigentliche Reisebeschreibung in sich fassenden Bände dieses wahrhaft classischen Werks bekannt geworden. Der dritte Theil enthält Beylagen, in einer Reihe sehr interessanter naturhistorischer, physikalisch-nautischer Abhandlungen von *Tilesius*, *Esperberg*, *Horner* und *Krusenstern*. In der Vorrede macht uns der Verfasser noch zu einem Supplement-Band Hoffnung, dessen Erscheinen wir mit Erwarten entgegen sehen, da alles, was ein *Krusenstern* liefert, reeller Gewinn für die Wissenschaften ist.

Der

Der aus sechs Heften (erst zwey davon sind in un-
 tern Händen,) bestehende Atlas, ist mit Ausschluss
 der Karten, ganz das Werk von *Tilesius*. Japan,
 diesem so merkwürdigen und so wenig bekannten
 Lande, sind allein sechzehn Blätter gewidmet, vier
 und zwanzig enthalten Abbildungen naturhistorischer
 Gegenstände, mehrere andere die Portraits von *Nu-
 kahiwer*, *Kamtshadalen*, *Ainos etc.* die um so in-
 teressanter seyn werden, da nach des Verfassers Ver-
 sicherung, Hofrath *Tilesius* das große Talent besitzt,
 nicht nur eine Aehnlichkeit auffallend zu treffen,
 sondern auch den Charakter der portrairten Person
 sehr lebendig auszudrücken. Eine genaue Erklärung
 dieses Atlases vom Künstler selbst, wird dessen Werth
 gewiss noch wesentlich erhöhen, so dass dadurch
 unstreitig dem ganzen, für Natur- und Völkerkunde
 empfänglichen Publicum ein äußerst lehrreicher Ge-
 nuss gewährt werden wird.

Die einzelnen Abhandlungen, die den Inhalt
 des vorliegenden Bandes ausmachen, sind folgende:

- I. *Ueber die Seeblasen, ein räthselhaftes Thier-
 geschlecht, welches auch unter dem Namen:
 Galeere, Fregatte, the portuguese man of war,
 Besandjes und Bydewind-Seglare, unter den
 Seeleuten bekannt ist; in mehreren Bruchstücken
 gesammelt vom Dr. Tilesius, Naturalisten der
 Expedition.*

Wir können uns bey dieser rein naturhistorischen
 Abhandlung hier nicht aufhalten, allein wir glauben
 mit Recht alle Naturforscher darauf aufmerksam ma-
 chen zu müssen, da sich wohl noch niemand so sorg-
 fältig

fältig und anhaltend mit der Untersuchung dieses räthselhaften, außerordentlichen Geschöpfes beschäftigt hat, wie der Verfasser. Auch die Litteratur dieses Gegenstandes ist mit großer Vollständigkeit beigebracht worden, woraus man sieht, daß alle zeitlicher darüber vorhandene Nachrichten, eben so mangelhaft als zum Theil irrig und widersprechend waren.

II. *Bemerkungen über den Jocko oder Orang-Outang von Borneo, oder den ostindischen Waldteufel. (Simia satyrus L.) Entworfen von D. Tilesius.*

Der Besitzer dieses Orang-Outang war der Portugiesische Gouverneur von Macao in China, *Dom Captano da Sousa*, bey dem der Verfasser dieses Thier zu untersuchen und abzuzeichnen Gelegenheit fand. Der Atlas enthält einige diesem Gegenstande gewidmete Blätter, unter andern die Zeichnung des Affen nebst seinem Wärter, einem äußerst häßlichen Kaffer, der nach des Verf. Versicherung eben so sicher auf der niedrigsten Menschenstufe stand, als der Affe auf der höchsten unvernünftiger Thiere, so daß beyde einander nicht unähnlich waren, und eine sehr abentheuerliche Gruppe bildeten, wenn der Kaffer sein verjüngtes Ebenbild auf dem Arme trug. Der GröÙe nach glich der Affe einem drey bis vierjährigen Kinde; allerdings hat er viel menschenähnliches, allein sein Kopf bildet eine Fratze oder eine menschliche Mißgestalt. Es war ein Weibchen und schien noch sehr jung zu seyn. *Er schien es sehr gerne zu sehen, heißt es hier, wenn er geschmeichelt wurde, wenn man*

man ihn strich und freundlich mit ihm sprach; ja er kam auch oft selbst unaufgefordert zu den Personen die ihm gefielen, ergriff ihre Hand, untersuchte mit vieler Aufmerksamkeit ihre Kleider, Knöpfe u. dgl. bog an ihren Fingerspitzen, und kletterte endlich an ihnen in die Höhe und umarmte sie. Seinen Wärter, den Kaffer, und seinen Herrn, küßte er sogar. Sein Mißfallen gab er durch Kopfschütteln, mißtrauische Seitenblicke und Entfernung zu erkennen, besonders wenn er nicht erhielt, was er verlangte, oder wenn ihm sein Wille nicht geschah. Wenn er aber gar ungedultig, ärgerlich oder gereizt und durch den Pöbel beleidigt ward, so wurde er zornig, der Hals schwoh ihm auf, der Kropf trat heraus und die Augen hervor, er blies, seufzte und schrie, und wälzte sich auf der Erde. Uebrigens schien er nicht böseartig zu seyn; er war größtentheils ruhig, und schien in allem, was er that, bedächtig und vorsichtig zu Werke zu gehen; seine Bewegungen waren vielmehr langsam als heftig; er hatte nicht das schnelle, heftige, mißtrauische und unruhige in seinem Betragen wie der Macao und andere Affen; seine Physiognomie war ernst und finster. Unser Orang-Outang aß ganz wie der Mensch; er führte mit den Fingern sehr zierlich seine Nahrungsmittel nach dem Munde, und reinigte sich die Finger nach gehaltener Mahlzeit mit einem Tuche. Auch seine Nahrungsmittel waren die nämlichen, welche die Menschen genießen, Brod, Fleisch, Gemüse, Hülsenfrüchte, Milch, Eyer; aber Zucker, Nüsse, Chocolate, Caffee und Obst, waren Leckerbissen für ihn. Unbekannte Früchte, Gebackenes und andere ihm fremde Spei-

sen, pflegte er vorher sorgfältig durch Geruch und Geschmack zu prüfen, bevor er etwas davon genießen wollte; und so bewies er auch überall in andern Stücken die größte Vorsicht, Klugheit und Sorgfalt zur Erhaltung seiner Gesundheit und seines Lebens. Seine Sinne sind scharf, jedoch nicht schärfer und ausgedehnter als die menschlichen, aber die Schriftsteller, welche die geistigen Fähigkeiten der Thiere, ihre Vorsicht, Schlanheit, List u. dgl. als Resultate der feinern Organisation, der ausgedehntern Sinnesfähigkeit betrachten, können sich gerade bey diesem Thiere von ihrem Irrthum überzeugen. Die eigentlich wissenschaftliche Beschreibung des Thieres muß im Buche selbst nachgelesen werden.

III. Temperatur des Meerwassers in verschiedenen Tiefen. Von dem Astronomen der Expedition Hofrath Horner.

Die bekannte von Hales angegebene Vorrichtung, war anfangs zu diesen Versuchen bestimmt und mitgenommen worden; allein da mehrere Umstände die Brauchbarkeit dieses Instruments sehr wesentlich vermindern, so daß man schwerlich erwarten darf, dadurch wirklich die in der Tiefe statt findende Temperatur zu erfahren, so wurde kein Gebrauch davon gemacht. sondern ein Thermometrograph vorgezogen, der nach der Angabe des Hrn. Six, von Adams in London verfertigt war, und sich nach Horners Angabe, durch die Stärke der gläsernen Röhren und die Solidität der hölzernen Scale vollkommen zu solchen Versuchen eignete. Da dieses Instrument nur die Extreme einer gewissen Temperatur anzeigt,

10

VI. Capit. Krusensterns Reise um die Welt. 67

Es mußte durch Einfenkungen in verschiedene Tiefen erprobt werden, daß in demselben Gewässer die Temperatur mit der Tiefe beständig abnehme, was denn auch einigemale durch eine Reihe von Lothungen außer allen Zweifel gesetzt wurde. Die Resultate dieser Versuche sind folgende:

Zeit der Beobachtung		Temperatur		Tiefe in Faden*)	Temperatur der Luft	Schiffs	
		an der Oberfl.	in der Tiefe			Breite	Länge
1803	4 Decb.	20,5	19,0	80	21°	15° S.	31° W.
1804	23 Febr.	9,6	6,3	55	—	52 S.	66 W.
	7 März	3,7	3,1	60	4,0	59 S.	71 W.
	—	—	1,8	100	—	—	—
	13 März	5,2	3,2	100	4,5	57 S.	80 W.
	—	—	—	—	—	—	—
	19 März	6,2	4,7	200	7,0	56 S.	90 W.
	—	—	5,5	50	—	—	—
	24 May	22,3	12,0	100	—	1,5 S.	146 W.
	25 May	23,5	11,6	200	—	Aequ.	146 W.
1804	13 Jun.	20,5	13,3	125	23,2	23 N.	182 W.
	—	—	17,3	50	—	—	—
	—	—	19,7	25	—	—	—
	—	—	20,5	1	—	—	—
	1 Jul.	17,0	9,6	200	—	33 N.	190 W.
	—	—	12,7	55	—	—	—
	14 Jul.	5,0	—0,4	100	—	52 N.	200 W.
	10 Sept.	12,3	+0,5	80	—	31 N.	216 W.
	26 Sept.	22,3	17,4	80	—	—	—
1805	17 May	1,3	0,0	60	—	46 N.	216 W.
	3 Aug.	9,7	—1,0	80	—	53 N.	216 W.
	22 Aug.	7,4	—1,6	110	—	53 N.	208 W.
	23 Aug.	6,3	—1,6	115	—	53 N.	208 W.
	—	—	—1,6	60	—	—	—
	—	—	—1,6	30	—	—	—
	—	—	—1,3	21	—	—	—
	—	—	—0,2	18	—	—	—
	—	—	+2,0	16	—	—	—
	—	—	+5,5	14	—	—	—
	—	—	+6,3	0,5	—	—	—
	2 Nov.	20,5	14,3	120	—	27 N.	213 W.
	—	—	14,3	100	—	—	—
	—	—	14,5	90	—	—	—
	—	—	17,3	30	—	—	—

*) Die Tiefen sind in Faden zu sechs englischen Füssen; die

E 2

Tem-

Zeit der Beobachtung		Temperatur		Tiefe in Faden	Temperatur der Luft	Schiffs	
		an der Oberfl.	in der Tiefe			Breite	Länge
1805	13 Nov.	18. 7	14. 7	130		23 N.	228 W.
			17. 8	50			
1806	14 Febr.	17. 8	11. 5	70			
	11 Jun.	18. 7	13. 7	200		19 N.	246 W.
	—		15. 0	70.5		26 N.	37 W.
	17 Jun.	18. 0	13. 5	140		30 N.	40 W.
	—	—	13. 5	170			
	—	—	13. 5	200			
	—	—	15. 0	63			
	—	—	16. 3	30			
	—	—	17. 2	15			
	—	—	17. 4	0.5			

Mit diesen eignen Versuchen verbindet *Horner* einen Auszug aus den frühern hierher gehörigen Arbeiten von *Phipps*, *Irwing*, *Baily* und *R. Forster*. Leider finden in diesen manche Unzuverlässigkeiten statt, aber aus allen ohne Ausnahme ergibt sich verminderte Temperatur bey zunehmender Tiefe. Stellen wo dies nicht der Fall ist, wie z. B. im Gulph-Stream an den Küsten von Amerika, wo ein aus der Tiefe von 80 bis 100 Faden heraufgezogenes Bleyleth heifs ist, sind blofse Ausnahmen von der allgemeinen Regel, die wahrscheinlich Wirkungen unterirdischer heifser Quellen oder vulkanischer Ebullitionen sind. Das merkwürdigste Resultat, was sich aus den vorherigen Beobachtungen ergibt, scheint uns die bey einer gewissen, von geographischer Breite, abhängigen Tiefe eintretende constante Temperatur des Meerwassers. Nach *Horners* Bestimmung tritt diese constante Temperatur ein:

in

Temperatur gilt für Therm. Reaum.; die Länge ist von Greenwich aus gezählt.

in der Süd-See	in 23° N. B.	in 120 Faden	Temp.	+ 13,3	Mon. Juny
im japan. Meere	27	—	100	—	14, 3 — Novb.
atlant.	—	30	—	110	— 13, 5 — Jun.
Ochotzk.	—	53	—	25	— 1, 5 — Aug.

Horner vermuthet, daß die im ochotzkischen Meere beobachtete Temperatur von $-1,5$ wohl die Gränze der Erkältung des Meerwassers ausmache, und erklärt sich, und wie es uns scheint, sehr mit Recht, gegen die von einigen Naturforschern geäußerte Vermuthung, daß der Grund des Meeres in sehr großen Tiefen eine völlige Eismasse sey. Der Salzgehalt des Meeres, und der große Druck des Wassers in jenen Tiefen, machen die Formation des Eises theils unmöglich, theils sehr unwahrscheinlich.

IV. Specifisches Gewicht des Meerwassers. Von dem Astronomen Hofrath Horner.

Die Versuche wurden mit einem messingenen Aërometer von der Fahrenheit'schen Einrichtung gemacht. Es war von Troughton in London verfertigt, und gab seines äußerst dünnen Halses wegen auf $\frac{1}{4}$ Gran einen merklichen Ausschlag. Die Temperatur des Wassers im Gefäße, wurde jedesmal im Augenblick des Versuchs mit einem achtzigtheiligen Quecksilber-Thermometer bestimmt. Wiederholte Versuche gaben die Verminderung der Schwere des Seewassers für $+1^{\circ}$ Reaum. = 0,446 Gran. Damit wurden die Temperaturen aller Versuche auf 10° Reaumur reducirt, und so aus der Summe aller Beobachtungen, folgende allgemeine Ueberlicht der specifischen Gewichte des Meerwassers in verschiedenen Gewässern erhalten:

Atlan-

Atlantisches Meer			Süd-See		
Breite	Monat	Specif. Gewicht	Breite	Monat	Specif. Gewicht
4,° N.	May	1.0280	22° N.	Jun.	1.0280
25,5 -	Jun.	1.0295	23 -	—	1.0274
26 -	—	1.0295	31 -	Sept.	1.0278
28 -	—	1.0295	32 -	Octbr.	1.0265
30 -	—	1.0290	32 -	Novbr.	1.0274
39 -	—	1.0286	40 -	Octbr.	1.0270
55 -	Jul.	1.0275	46 -	—	1.0248
60,5 -	—	1.0271	48 -	Sept.	1.0278
40 S.	Febr.	1.0293	50 -	Octbr.	1.0221
44 -	—	1.0271	51 -	Jul.	1.0249
48 -	—	1.0266	52 -	—	1.0246
52 -	—	1.0264	3 S.	May	1.0279
58 -	—	1.0251	8 -	—	1.0281
			31 -	April	1.0274
			32 -	—	1.0276
			39 -	—	1.0267
			56 -	März	1.0252
			56 -	—	1.0255
			57 -	—	1.0258

Eingeschlossene Meere			Eingeschlossene Meere		
Breite	Monat	Specif. Gewicht	Breite	Monat	Specif. Gewicht
Japanif. und	Tatari-	fches Meer	Chine-	fisches	Meer
40,° N.	May	1.0256	6° N.	Febr.	1.0270
43 -	—	1.0258	10 -	—	1.0262
43 -	—	1.0248	19 -	—	1.0273
46 -	—	1.0221	22 -	Nov.	1.0272
46 -	—	1.0233	Off. See		
Ochotz-	kifches	Meer	56 N.	August	1.0059
53,° N.	August	1.0212	60 -	—	1.0068
54 -	—	1.0222			
54 -	—	1.0244			
54 -	—	1.0246			
54 -	—	1.0251			

Im atlantischen Meer ist die specifische Schwere von 4 – 30° N Br. 1,0291, von 55 – 60,° S N. B. 1,0273; das Seewasser zwischen den Wendekreisen hat also um $\frac{1}{555}$ mehr Salz als in höhern Breiten. Es ist merkwürdig, daß das Wasser am Cap Horn um $\frac{1}{454}$ leichter ist, als das Wasser in der nämlichen Breite in der Nord-See, bey den Shetlandischen Inseln. In der Süd-See ist der Unterschied zwischen dem Salzgehalt an den Wendekreisen und den höhern Breiten nahe derselbe; der des atlantischen Oceans übertrifft im allgemeinen den der Süd-See um $\frac{1}{1000}$; Alle eingeschlossene Meere sind auffallend süßser als der Ocean, am meisten die Ost-See, deren Gewicht um $\frac{1}{44}$ geringer, als das des atlantischen Oceans ist.

V. Ueber die Oscillationen des Barometers zwischen den Wende-Kreisen. Von dem Astronomen Hofrath Horner.

Ein sehr interessanter Aufsatz, da dieser über die Allgemeinheit der mit Bestimmtheit zuerst von Humboldt in Süd-Amerika wahrgenommenen täglichen barometrischen Aenderungen, keinen Zweifel übrig läßt. Diese Beobachtungen zeigen von einer seltenen Ausdauer und Fleiß; jeder der sich je mit ähnlichen Untersuchungen beschäftigte, wird es bewundern wenn er hört, daß wir hier die Resultate von Beobachtungen erhalten, die während eines Zeitraums von ein und sechzig Tagen von Stunde zu Stunde gemacht wurden. Wenn, sagt hier Horner, diese Arbeit in Europa beschwerlich ist, so erforderte sie doppelte Anstrengung in den Erschöpfungen der tropischen Hitze und einer anhaltenden Seereise.
Allein

Allein die Erforſchung einer ſo kleinen Bewegung, deren Periode uns damals noch unbekannt war, ließ keine größern Intervallen zu; auch diente die Wiederholung der Beobachtungen in kürzern Zwischenzeiten die möglichen Fehler derſelben zu compenſiren. Das zu dieſen Beobachtungen gebrauchte Barometer war ein nach *Nairne's* Angabe von *Troughton* verfertigtes Gefäß-Barometer mit einer engen Röhre, deſſen oberes Ende, ſo weit als die Scale reichen konnte (etwa einen Fuß lang) auf zwey Linien inwendig erweitert war, wodurch die Schnelligkeit der Bewegungen des Queckſilbers ſehr vermindert wurde. Natürlich wurden durch die Schwankungen des Schiffes die Beobachtungen ungemein erſchwert, demohngeachtet glaubt *Horner*, daß die Angaben immer bis auf 0,1 genau ſind, indem dies gemeinlich der größte Unterſchied war, welcher in der Schätzung der drey Beobachter, die dieſe Arbeit theilten, ſtatt fand. Da das Detail dieſer Beobachtungen für viele Naturforſcher von Intereſſe ſeyn wird, ſo laſſen wir eine Tabelle darüber als Beylage zu dieſem Heft mit abdrucken. Das Mittel aus den 61 tägigen Beobachtungen gibt für die Zeiten der größten und kleinſten Höhen, folgende Werthe:

Das Barometer

iſt am höchſten Vormittags um 9 ^U 39' u. zeigt	29,898
niedrigſten Abends - 3 55 - -	29, 809
ſteigt alſdann bis Abends - 10 6 - -	29, 891
u. fällt wieder bis Morgens - 3 40 - -	29, 823

Bis auf unbedeutende Kleinigkeiten ſtimmen dieſe Reſultate mit denen von *Humboldt* überein, dieſer fand

fand für die Zeiten der größten und kleinsten Höhen
 (*Tableau physiques des regions équatoriales* p. 91)

$$\begin{array}{rcl}
 \text{à } 21^h & z + 0,15 & | \quad \text{à } 11^h & z + 0,11 \\
 4 & z - 0,4 & | & 16 & z - 0,2
 \end{array}$$

(z = mittlerer Barometer-Stand.)

und aus den *Horner'schen* Beobachtungen folgt,
 wenn das englische Maß auf französisches reducirt
 wird:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{à } 21^h & 39' & z + 0,1484 & | & \text{à } 10^h & 6' & z + 0,1414 \\
 3 & 55 & z - 0,518 & | & 15 & 40 & z - 0,360
 \end{array}$$

Die große Uebereinstimmung dieser Resultate
 läßt über die Realität der täglichen barometrischen
 Oscillationen keinen Zweifel übrig. Die Differenzen
 sind so unbedeutend, daß diese sehrfügig als Be-
 obachtungsfehler angesehen werden können; auch
 wäre es möglich, daß die von *Horner* auf dem *Ocean*
 erhaltenen Bestimmungen noch ungetrübter, die
 reinen Resultate der allgemein wirkenden Ursache
 sind, als die von *Humboldt* auf dem Continent von
 Amerika gemachten Beobachtungen. Der Umstand,
 daß diese Oscillationen überall zu derselben Stunde
 statt finden, ist einer schon früher von uns versuch-
 ten Erklärung dieses Phänomens (*M. C. Bd. XXI,*
S. 218) sehr günstig.

Um zu übersehen, in wiefern der Stand von
 Sonne und Mond einen Einfluß auf die Größe die-
 ser Oscillationen hat, hat *Horner* in ein paar kleinen
 Tafeln die größten und kleinsten Aenderungen, mit
 Bemerkung von Mond- und Sonnen-Ort zusammen-
 gestellt, die wir hier ebenfalls ausheben:

Größte

Größte Oscillationen des Barometers.

Zeit der Beobach- tung	Summe der Aender.*	⊘ Abweich.	⊘ Horiz., Parall	Breite des Schiefes
1804 Apr. 21	0,44	2,2 S.	54,4	21,0 S.
22	41	8,1 —	54,3	20,0 —
May 4	47	8,0 —	59,2	9,6 —
5	41	0,0 —	60,0	9,3 —
6	40	6,0 N.	60,7	8,9 —
19	40	7,2 S.	54,5	9,4 —
20	38	12,4 S.	54,2	7,3 —
31	42	7,6 —	57,6	6,1 N.
Juny 1	41	1,6 —	58,4	7,0 —
14	35	0,5 —	55,3	16,9 —

Kleinste Oscillationen des Barometers.

1804 Apr. 16	0,19	22,7 N.	57,4	23,7 S.
25	26	21,0 S.	53,9	16,3 —
27	27	26,0 —	54,2	14,5 —
29	23	26,4 —	54,9	13,3 —
May 8	26	19,0 N.	61,3	8,9 —
24	26	25,6 S.	54,1	0,9 —
28	26	21,9 —	55,6	3,0 N.
29	25	18,0 —	56,2	4,0 —
Juny 3	26	10,8 N.	59,9	10,0 —
9	23	24,3 —	59,6	19,0 —
19	26	23,3 S.	54,0	18,7 —
20	25	25,5 —	54,2	19,9 —
22	19	26,5 —	54,8	23,1 —

Die größten Oscillationen fanden immer nur dann statt, wenn der Mond in der Nähe des Aequators war und fallen auf den fünften Grad südlicher Abweichung. Die Entfernung des Mondes scheint keinen bedeutenden Einfluß zu haben. Die schwächsten Oscillationen traten dann ein, wenn der Mond über

*) Es sind diese Zahlen die Summen aller vier täglichen Oscillationen.

über 20° Abweichung hatte, und gewiß ist es, wie *Horner* bemerkt, sehr merkwürdig, daß der Unterschied zwischen den nördlichen und südlichen Abweichungen ($23,8^{\circ}$ S. — $19,2^{\circ}$ N.) den Aequator der Wirkung des Mondes auch auf $4,6^{\circ}$ südlicher Abweichung angibt. Der höchste Stand des Barometers ($29,2982$ im Mittel*) trat nicht anders ein als unter einer nördlichen Breite über 17° , oder einer südlichen über 22° und immer nur bey einer Declination des Mondes, die über 16° nördlich oder 26° südlich war.

Ueber den mittlern Barometerstand im Niveau des Meeres geben die vorliegenden Beobachtungen eine minder zuverlässige Anskunft. Die Einrichtung des Barometers ließ es nicht zu, die richtige Stellung der Scale zu untersuchen, und da dieses Instrument späterhin in einem Sturme an der Küste von Japan zerschlagen wurde, so wurde die Vergleichung mit einem regulirten Instrument unmöglich. Der Verfasser stellt zugleich die von *Cook* und *La Perouse* gemachten Beobachtungen zusammen, um dann aus allen ein mittleres Resultat herzuleiten, was die Barometerhöhe im Niveau des Meeres gibt $29^Z 996 = 28^Z 1,1786$ franz. Maafs. *Horners* Beobachtungen allein geben $29^Z 798$, wodurch ein etwas zu niedriger Stand des gebrauchten Barometers wahrscheinlich wird. Natürlich hat dies auf alle vorherige Resultate nicht den mindesten Einfluß, da es dabey nicht auf absolute Höhen, sondern nur auf Differenzen ankam.

VI. Nach-

*) $28^Z 1,158$ französif. Maafs.

VI. *Nachrichten über den Gesundheits-Zustand der Mannschaft auf der Nadeshda, während der Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806, von Dr. Carl Espenberg.*

Wenn auch der Gegenstand dieser Abhandlung hauptsächlich medicinisch ist, so glauben wir doch mit Bestimmtheit versichern zu können, daß dessen Inhalt für jeden, er sey nun Arzt oder Nichtarzt, ein lebendiges Interesse haben wird, da es eine gewisse merkwürdige Erscheinung ist, daß von den auf der Nadeshda befindlichen 85 Personen, von denen einige über 50 Jahre alt waren, während einer mehr als dreyjährigen Reise, wo die Verschiedenheit des ungewohnten Clima's, die Abwechslung der Temperatur und die Entbehrung gewohnter Nahrungsmittel, schon allein wichtige Krankheiten nach sich ziehen konnte, nicht ein einziger starb. *Krusensterns* Verdienste als Mensch, Marin und Schriftsteller sind zu anerkannt, als daß es passend seyn würde, ihm hier noch eine Lobrede halten zu wollen: allein wir sind überzeugt, daß gewiss jeder, der diesen Aufsatz liest, das Gefühl der lebhaftesten Achtung für diesen Mann mit uns theilen wird. Wir kennen keinen Seefahrer, der so viel Menschenfreundlichkeit, Sorgfalt, Aufopferung eigener Bequemlichkeit, mit einer umfassenden Kenntniß seines Metier vereinigt, und dem es so wie *Krusenstern* gelungen wäre, nach einer mehr als dreyjährigen, fast durch alle Zonen gemachten Reise um die Welt, seine ganze Mannschaft gesund und vollzäh.

ählig heimzuführen. Gewiss gebührt aber auch dem wackern Arzt kein kleiner Theil dieses Verdienstes, und allen denen je ähnliche Geschäfte obliegen, ist das besondere Studium der vorliegenden Abhandlung anzurathen, da der ausgezeichnet glückliche Erfolg der Behandlungsart des Verfaller wohl sehr zur Empfehlung dient.

VII. *Ueber die während der Reise beobachteten Strömungen. Von Krusenstern.*

Ein wichtiger Aufsatz für Seefahrer; hier jedoch keines Auszugs fähig. Merkwürdig ist das, was der Verf. über die große Schwierigkeit sagt, zuverlässige Beobachtungen über die Lage der Magnethadel auf dem Schiffe zu machen. Trotz aller angewandten Sorgfalt, gab es in den Resultaten oft Differenzen von zwey, drey, bis fünf Graden. Sicher hat kein früherer Seefahrer eine grössere Schärfe in diesen Bestimmungen erreicht, und man kann daraus sehen, wie schwankend alle zeitherige auf solche Beobachtungen gegründete Resultate über magnetische Pole und Meridiane sind. Um Naturforscher, die sich für Theorie der Strömungen besonders interessieren, wenigstens den Namen nach mit dem bekannt zu machen, was *Krusensterns* Abhandlung hierüber enthält, heben wir die Überschriften der einzelnen Abschnitte aus. Die ganze Untersuchung ist in fünf Perioden abgetheilt, so wie solche nach dem Verlauf der Reise am natürlichsten schienen.

I. *Von England bis zum Cap Horn. 6. Oct. 1803 bis 3. März 1804.*

a. *Von England bis zu den canarischen Inseln.*

b. *Von*

b. Von den canarischen Inseln bis zum Aequator und den Regionen des Südost-Passats.

c. Vom Aequator bis zur Insel St. Catherina.

d. Von St. Catherina bis Cap Horn.

II. *Von Cap Horn bis Kamtschatka. 3. März 1804 bis 15. Jul. 1804.*

a. Vom Cap Horn bis zu den Washingtons-Inseln.

b. Von den Washington - bis zu den Sandwich-Inseln.

c. Von den Sandwich-Inseln bis Kamtschatka.

III. *Von Kamtschatka bis Japan und China.*

a. Von Kamtschatka bis Japan. 7. Sept. bis 8. Oct. 1804.

b. Von Kamtschatka bis China. 9. Oct. bis 20. Nov. 1805.

IV. *Strömungen im japanischen, sachalinischen, ochotzkischen und chinesischen Meere.*

a. Strömungen im japanischen Meere, beobachtet während der Fahrt von Nangasaky bis zur Straße La Perouse. 16. Apr. bis 10. May 1805.

b. Strömungen im sachalinischen Meere. Mai, Jul. und August.

c. Strömungen im ochotzkischen Meere. August 1805.

d. Strömungen im chinesischen Meere.

V. *Strömungen von der Straße Sunda bis zu den Schettland-Inseln.*

a. Von der Straße Sunda bis zum Vorgebirge der

der guten Hoffnung. 6. März bis 17. Julius 1806.

b. Von dem Vorgebirge der guten Hoffnung bis zum Aequator.

c. Vom Aequator bis zur Nord-See.

Da auf der Nadeshda beständig die gewöhnliche Schiffsrechnung durch sorgfältige astronomische Beobachtungen controlirt wurden, so gehören unstreitig die hier mitgetheilten Strömungs-Beobachtungen zu den zuverlässigsten, die wir besitzen.

VIII. Ueber die Fluth-Beobachtungen im Hafen von Nangasaki. Von Krusenstern.

Der lange Aufenthalt der Nadeshda in dem Hafen von Nangasaki, machte es möglich, dort eine Reihe ziemlich vollständiger Fluth-Beobachtungen machen zu können. Die Lage des Hafens war hierzu sehr geneigt, indem die Fluthen-Wechsel daselbst sehr regelmäfsig sind, und das Wasser nur selten sehr bewegt wird. Die misstrauische japanische Polizey erschwerte zwar anfangs die Beobachtungen, so dafs diese erst nach Verlauf von einigen Monaten recht mit Zuverlässigkeit gemacht werden konnten. Die Reihe recht sicherer Beobachtungen umfaßt einen Zeitraum von sechs Wochen, vom 5. März bis 15. April 1805. In einer General-Tabelle hat Krusenstern die Resultate sämmtlicher Beobachtungen zusammen gestellt, die wir hier ausheben:

Zeit der Beobacht.	Stunde		Höchſtes Steigen der Fluth *)	in Merid.	Therm. im Mittag	Barom. im Mittag
	der hohen Fluth	der tiefen Ebbe				
1805	U	U	F. Z.	U		
Jan.	10	4 0 Ab.	9 15 M.	3 6	7 10 Ab.	9.0 30.04
	11	—	10 30 —	2 6	8 10 —	11.0 29.94
	12	—	11 30 —	2 6	9 13 —	10.2 29.91
	13	—	—	3 0	10 18 —	13.5 29.97
	14	7 30 M.	1 5 Ab.	5 7	11 20 —	7.5 29.95
	15	8 0 —	2 7 —	7 3	0 17 M.	6.0 29.90
	16	9 0 —	2 30 —	8 0	1 10 —	7.5 30.04
	17	8 53 —	—	8 3.5	2 0 —	9.0 30.07
	18	9 52 —	4 0 —	7 9	2 50 —	8.3 30.15
	19	10 30 —	—	7 3	3 35 —	8.5 30.15
	20	11 0 —	5 30 —	6 3	4 19 M.	10.0 30.08
	21	11 22 —	—	4 3	5 3 —	8.5 29.95
	22	11 39 —	—	3 0	5 44 —	10.0 29.95
	23	—	—	2 3	6 33 —	13.0 29.97
	24	1 45 Ab.	8 0 M.	1 6	7 22 —	13.0 29.84
	25	—	—	0 6	8 11 —	7.0 29.90
	28	—	0 30 Ab.	4 6	10 40 —	10.8 29.96
	29	—	1 37 —	5 0	11 29 —	5.0 29.98
Febr.	1	—	—	7 0	1 0 Ab.	9.0 30.10
	2	9 0 M.	3 0 —	7 9	1 45 —	8.0 29.79
	3	9 45 —	—	7 9	2 30 —	5.7 29.87
	4	10 30 —	5 0 —	6 9	3 15 —	5.0 30.15
	5	11 0 —	5 30 —	6 6	4 5 —	7.0 30.15
	6	11 0 —	5 0 —	6 3	4 58 —	6.0 30.06
	7	11 45 —	—	2 6	5 54 —	11.5 30.07
	8	—	—	2 9	6 54 —	10.0 29.99
	9	2 30 Ab.	—	1 9.75	7 57 —	9.5 30.08
	10	3 30 —	10 0 M.	2 3	8 59 —	11.5 30.11
	11	5 0 —	11 0 —	4 0	9 58 —	8.6 29.94
	12	5 30 —	12 0 —	5 6	10 54 —	— 29.89
	13	—	—	6 0	11 45 —	11.0 29.96
	14	—	2 0 Ab.	8 2	0 35 M.	12.0 29.91
	15	9 0 M.	3 0 —	8 3.75	1 21 —	12.7 29.74
	16	—	3 30 —	7 7	2 8 —	2.3 30.07
	17	9 30 —	4 0 —	8 1	2 52 —	7.0 30.01
	18	—	5 0 —	6 3	3 35 —	5.0 30.19
	20	—	—	5 3	5 9 —	13.0 30.03
	22	11 0 —	—	2 0	6 48 —	14.0 30.07
	23	12 0 —	—	1 1	7 38 —	10.7 30.15
	24	2 0 Ab.	—	0 9	8 28 —	15.0 30.22
März	6	10 16 M.	4 30 —	9 2	3 49 Ab.	14.0 30.09
	8	12 0 —	—	3 7	5 50 —	7.5 29.87
	10	1 45 Ab.	—	1 0	7 52 —	8.5 30.05
	11	—	—	2 7	8 50 —	— 29.89

*) Engliſch Maafs.

VI. Capit. Krusensterns Reise um die Welt. 81

Zeit der Beobacht.	Stunde		Höchstes Steigen der Fluth		D im Merid.	Therm. im Mittag	Barom. im Mittag
	der hohen Fluth	der tiefen Ebbe	F.	Z.			
1805	U	U	F.	Z.	U		
März 12	6 0 Ab	12 0 Ab	4 8		9 41 Ab.	11,1	30,07
16	8 15 M	2 0 —	9 4		0 47 M.	14,5	30,12
17	8 30 —	2 40 —	9 3,5		1 34 —	15,5	30,07
18	10 0 —	3 45 —	9 3		2 21 —	14,5	29,67
19	9 52 —	3 45 —	8 8		3 7 —	13,0	29,73
20	10 7 —	4 30 —	7 5		3 57 —	13,5	29,35
21	10 16 —	5 12 —	6 5		4 48 —	13,5	29,60
22	—	—	5 8		5 34 —	12,0	29,65
23	11 14 —	6 7 —	4 0		6 30 —	12,7	29,93
24	0 19 Ab.	—	2 1		7 19 —	14,0	29,86
25	2 0 —	—	1 2		8 6 —	—	29,90
26	5 10 —	11 19 M.	2 11		8 53 —	13,0	29,97
27	7 15 M.	1 52 Ab.	4 6		9 40 —	—	29,67
28	6 30 —	0 40 —	5 10		10 24 —	13,5	29,84
29	7 2 —	0 53 —	8 1,5		11 13 —	11,5	29,80
30	7 27 —	1 45 —	9 4		0 0 —	13,0	29,84
April 31	7 49 —	2 12,2 —	10 9		0 3 Ab.	17,3	29,94
1	8 15 —	2 38,5 —	10 7		0 50 —	12,0	29,71
2	8 41,3 —	3 10,4 —	11 4,75		1 51 —	14,8	29,45
3	9 25,3 —	3 55,6 —	10 10		2 53 —	14,5	29,61
4	10 16,2 —	4 58,5 —	9 7		3 55 —	14,5	29,70
5	10 44,5 —	—	6 0		4 57 —	20,0	29,73
6	11 52,5 —	5 58,0 —	6 9		5 57 —	15,0	29,57
7	0 49 Ab.	7 7,9 —	4 3		6 53 —	11,2	29,75
8	2 31 —	8 35 M.	2 5		7 41 —	8,0	29,89
9	4 53 —	11 15,3 —	3 10		8 29 —	12,0	29,88
10	5 45 —	11 39,2 —	5 2		9 17 —	10,8	29,92
11	—	0 15,0 A.	1 8		10 7 —	9,5	29,85
12	6 30 —	0 54,7 —	8 0		10 52 —	15,2	29,62
13	7 8,3 M.	1 38,7 —	9 8,5		11 36 —	14,0	29,75
14	7 32,3 —	1 50,7 —	9 1		0 22 M.	—	—
15	8 6,0 —	2 31,0 —	8 9		1 10 —	—	30,22
16	8 51,5 —	2 53,0 —	8 2		2 0 —	18,0	30,27

Krusenstern selbst leitet aus seinen in Nangasaki gemachten Fluth-Beobachtungen folgende Resultate her:

1. Die höchsten Fluthen stellen sich in Nangasaki beym dritten und vierten Fluth-Wechsel nach den Syzigien ein.

2. Auch

2. Auch die tiefsten Ebben treffen beym dritten und vierten Wechsel nach den Quadraturen ein.
3. Die Verspätung der Fluthen-Wechselzeiten beträgt in den Syzigien $37' 19''$, und in den Quadraturen $1^h 6' 50''$.
4. Die Hafenzeit in Nangasaki ist $7^u 52' 41''$.

Supplement.

Instruction des Commerz-Ministers, jetzigen Reichs-Kanzlers, Grafen v. Romanzoff, an den Capitain Krusenstern.

Es ist hier hauptsächlich von Auffuchung einer Insel die Rede, die von den Spaniern im Jahre 1610 entdeckt worden seyn soll, und ungefähr im Parallel von $37,^{\circ}5$ und 28° östlich von Japan liegt. Wahrscheinlich ist die Sage fabelhaft; *Vries* und *La Perouse* beschrifteten diesen Curs vergebens, und nicht glücklicher waren *Krusensterns* Versuche. (I. Bd. S. 228). Doch ist darum die Nicht-Existenz jener Insel noch bey weitem nicht für erwiesen anzusehen, da ungünstiges Wetter *Krusensterns* Auffuchen störte, und da überhaupt allen dortigen Entdeckungs-Versuchen die in jenen Gegenden fast beständig herrschenden Nebel sehr hinderlich sind.

Tabellarisches Journal der Nadeshda, mit den auf diesem Schiffe gemachten astronomischen und meteorologischen Beobachtungen.

Das Journal ist mit einem Fleiß und einer Vollständigkeit geführt, die nichts zu wünschen übrig läßt.

läßt. Für jeden Tag ist hier angegeben: Breite des Schiffes nach Beobachtung, nach Schätzung, Länge nach Seeuhren, nach Monds-Beobachtungen, nach Schätzungen, wahre Länge, Wirkungen der Strömungen, Abweichung der Magnetnadel, Thermo-Barometer-Stand am Mittag, Winde und Zustand der Atmosphäre. Ueber die in diesem Journal befindliche Rubrik "*wahre Länge*," sind am Schlusse noch Erläuterungen beygefügt. Der Verf. zeigt hier, auf welche Art die Correction der Uhren und daraus ferner, die der Längen hergeleitet worden ist. Es geschah dies auf eine doppelte Art, entweder durch Mondsbeobachtungen, oder durch Vergleichung mit Orten, deren Längen früher astronomisch bestimmt waren, und die im Vorbeysegeln gesehen oder wo geankert wurde. Schon öfters hatten wir im Verfolg dieser Anzeige Gelegenheit, die vorzügliche Sorgfalt zu bemerken, mit der auf der ganzen Reise täglich die Lage des Schiffes bestimmt wurde, und die vorliegenden Erläuterungen liefern wieder neue Belege hierüber. Dafs bey der Unmöglichkeit, im Laufe der Schiffahrt selbst, den Gang der Uhren genau zu prüfen, in dessen angenommenen Bestimmungen manchmal etwas willkührlich verfahren werden mußte, ist wohl unvermeidbar. Der Gang der auf der Nadeschda befindlichen Uhren war anfangs sehr schön, so dafs die Differenzen zwischen den chronometrischen Bestimmungen und denen durch Monds-Distanzen erhaltenen, immer sehr unbedeutend waren; eine Uebereinstimmung die natürlich für die Zuverlässigkeit der Resultate wesentlich beweist. Späterhin war dies minder der Fall, und auf dem letzten Theil

der Schifffahrt, wo der tägliche Gang der drey Uhren, von $+ 19.75$, — 12.13 , — 54.0 , in $+ 23.5$ — 6.5 , — 25.73 verändert werden mußte, können natürlich die *hierauf* beruhenden Längenbestimmungen, nur einen mindern Grad von Zuverlässigkeit haben.

VII.

Arbeiten der Brücken und Wegebau - Ingenieurs seit 1800, oder Ueberlicht der neuen Baue, die unter der Regierung *NAPOLEONS I.* an Straßsen, Brücken und Canälen gemacht, und der Arbeiten, die für die Flußschifffahrt, die Austrocknungen, die Handels - Hafen u. s. w. unternommen worden sind, von Hrn. *Courtin*, General-Secretair der General-Direction der Brücken und Wege. Aus dem Französischen übersetzt. Gotha, in der *Beckerschen* Buchhandlung 1813.

Unstreitig gehört das vorliegende Werk unter die interessantesten, die wir für Statistik besitzen, indem es uns auf eine ganz zuverlässige Art mit der ungeheuern Masse von Arbeiten bekannt macht, die seit dem Anfang dieses Jahrhunderts im französischen Reiche zur Sicherung der Marine, und zu Erleichterung innerer Communicationen ausgeführt worden

den sind. Diese Uebersicht ist ein sprechendes Document der innern Stärke dieses Reichs, und die Menge während eines zwölfjährigen Zeitraums begonnener und beendigter Straßensbau- und Canal-Arbeiten muß um so mehr Bewunderung erregen, da Frankreich in dieser Zeit nur wenig Jahre des Friedens hatte. Ungern gestehen wir es uns, daß ein ähnliches Werk für unser deutsches Vaterland ganz ungemein mager ausfallen würde, indem hier in neuern Zeiten, mit Ausnahme von *Baiern*, selten ausgedehnte vortreffliche Chaussees das rühmlichste Lob verdienen, für Verbesserung oder neuer Anlegung von Land- und Wasserverbindungen, wenig oder nichts geschah. Und doch ist dieser Gegenstand für politische und militärische Zwecke eben so wichtig als für den innern Wohlstand der Länder, so daß es uns leicht werden sollte, berühmte Beispiele hierüber in Menge bezubringen, wäre es nicht bestimmter Plan dieser Zeitschrift, alle politisch-statistische Discussionen gänzlich daraus zu verbannen.

Wir haben das schon im Jahr 1812 erschienene Original dieses Buchs unangezeigt gelassen, da wir bald nachher von der unternommenen Uebersetzung unterrichtet wurden, die doch wahrscheinlich in Deutschland ein größeres Publicum als die französische Urschrift erhalten wird, da vielleicht gerade ein großer Theil derer, denen die darinnen abgehandelten Gegenstände am wichtigsten sind, minder mit der französischen Sprache bekannt ist. Die Menge hier vorkommender technischer Ausdrücke, erforderten einen der Sache und Sprache gleich kundigen Uebersetzer,

setzer, und wir freuen uns, daß ein so classisches Werk einen solchen in der Person des Herrn *Regierungsraths Geissler* zu Gotha gefunden hat, der durch Treue und Praecision des Ausdrucks und durch einige am Schluß beygefügte interessante Zusätze, den Werth des Werks noch zu erhöhen gewußt, so daß diese Uebersetzung, für deren Aeufseres auch die Verlagshandlung durch schönen Druck und Papier passend gesorgt hat, unstreitig von allen deutschen Lesern dem Original vorgezogen werden muß.

Bey der Reichhaltigkeit der Materie, würde ein Auszug aus dem vorliegenden Werke die Gränzen dieser Blätter bey weitem überschreiten, und wir beschränken uns daher um so mehr, auf eine bloße Nennung der darinnen abgehandelten Gegenstände, da diese gewiß hinreichend ist, um alle, denen Statistik und namentlich *Chaussée-Canal- und Brückenbau*, Berufs- oder Lieblingsfache ist, zur Lesung des Buchs selbst zu veranlassen. Nur ein paar allgemeine Bemerkungen schicken wir der Inhalts-Anzeige selbst voraus. Die Darstellung neuerer Arbeiten, ist hier allemal von einer kurzen Uebersicht des früher geschehenen begleitet, so daß man zugleich das Geschichtliche des Gegenstandes mit kennen lernt; Statt gefundene Mißgriffe in unternommenen Bauten sind keinesweges verschwiegen, im Gegentheil es entwickelt, wie manchmal erst durch theure Erfahrungen, der zweckmässigste Weg gefunden wurde. Auch kann Recensent, der neuerlich Gelegenheit hatte, einen bedeutenden Theil der französischen *Canal- Hafen- und Chaussée-Arbeiten* aus eigener Ansicht kennen zu lernen, mit Bestimmtheit versichern,

uern, daß das vorliegende Werk in allen ihm bekannt gewordenen Gegenständen nicht die mindeste Uebertreibung enthält. Am *Helder*, in *Antwerpen*, in *Rochefort*, in *Bayonne* und *Marseille* sind höchst merkwürdige Hafen-Arbeiten theils schon ausgeführt, theils noch im lebhaften Betrieb; die Canäle *de St. Quentin* (schon im vorigen Jahre wurde er von mehr als 1000 Schiffen befahren) *de l'Ourque*, *d'Arles*, sind Riesenwerke, die nur in Frankreich selbst, an dem berühmten *Canal du Midi* ihres Gleichen finden, die Chaussees im ganzen Reiche sind vortrefflich, und von den Arbeiten an den Straßen von *Menton* nach *Savonna*, von *Spezzia* nach *Sarzane* von *Savonna* nach *Alexandrien*, von denen über den *Mont- Genevre* und *Lantarèt*, ist von *Courtin* viel weniger gesagt und gerühmt worden, als es die ungeheuern Schwierigkeiten dieser Straßenbaue wohl verdient hätten. Die einzelnen Capitel und Abschnitte dieser geschichtlichen Darstellung sind folgende:

Arbeiten seit 1800.

1. Capitel.

Rückblick auf die öffentlichen Bauwerke vor dem neunzehnten Jahrhundert.

2. Capitel.

Frankreichs Zustand seit dem Anfange dieses Jahrhunderts in Rücksicht der öffentlichen Baue, die von der General-Verwaltung der Brücken und Wege abhängen.

3. Capitel.

Von der Direction.

4. Ca-

4. Capitel.

Vorkehrungen zu Erhaltung der Wege.

5. Capitel.

*Von den Strassen.**Neu angelegte Strassen:*

1. Straſse über den Simplon.
2. Straſse über den Mont-Cenis.
3. Straſse von Grenoble nach Briancon über den Lautaret.
4. Straſse aus Spanien nach Italien, oder Straſse von St. Esprit nach Turin über den Mont-Genèvre.
5. Straſse von Wesel nach Hamburg.
6. Straſse von Antwerpen nach Amsterdam.
7. Straſse von Metz nach Mainz.
8. Straſse von Venloo nach Wesel.
9. Straſse von Paris nach Spanien, über Bordeaux, Mont-de-Marsan und Bayonne.
10. Straſse von Nizza nach Rom, oder die Littoral-Straſse.
11. Straſse von Genua nach Piazenza, über Bobbio.
12. Straſs von Spezzia nach Porto-Venere.
13. Straſse von Florenz nach Parma über Sarzana und Pontremoli.
14. Straſse von Savoná nach Alexandrien.
15. Straſse von Port-Maurice nach Ceva.
16. Straſse von Carcare nach Ceva.
17. Straſse von Genua nach Novi über den Sattel von Giovi.
18. Straſse vom Mittelmeere zum adriatischen.
19. Straſse von Cefana, nach Pignerol über Fenestrelles.

VII. Brücken- u. Wegebau im franz. Reiche etc. 89

6. Capitel.

Von den Brücken.

Vollendete Brücken 47; Brücken an welchen noch gebaut wird, 30.

7. Capitel.

Napoleons-Stadt.

8. Capitel.

Von den Telegraphen.

9. Capitel.

Von den Canälen.

1. Canal von St. Quentin.
2. Canal des Ourq.
3. Canal von Jemmapes.
4. Der grofse Nord-Canal.
5. Canal von Sedan.
6. Canal von Burgund.
7. Napoleons-Canal.
8. Canal der Salzwyerke.
9. Canal von Arles.
10. Canal von Beaucaire.
11. Canal von Carcassonne.
12. Canal des Landes.
13. Canäle in der vormaligen Bretagne.
14. Canal der Ille und Rance.
15. Canal des Blavet.
16. Canal von Nantes nach Brest.

10. Capitel.

Von der Verbesserung der Fluß-Schiffahrt.

11. Ca-

II. Capitel.

Austrocknungen.

Moräste von Rochefort.

Moräste des Cotentins.

Moräste von Bourgoin.

Pontinische Sümpfe.

12. Capitel.

Von den Poldern.

13. Capitel.

Handelshafen.

Hafen von Antwerpen, Ostende, Dünkirchen, Calais, Dieppe, Havre, Honfleur, Caen, Isigny, Cherbourg, Portrieux, Haliguen, Palais auf Celle, Isle sur Mer, L'Orient, Painboeuf, Sables, Noirmoutier, Rochelle, Bayonne, Agde, Cette, Aigues-mortes, Bouc, Marseille.

Im 16. und letzten Capitel stellt der Verfasser alle im Laufe dieses Jahrhunderts unternommenen Arbeiten unter einer Uebersicht zusammen, deren Resultate folgende sind:

Fast fünfhundert Stunden neue Strassen, die befahren werden können.

Achtzig Brücken, die über sechzig Fuss lang sind.

Dreissig grosse Canäle, von denen sieben geendigt sind.

Mehr als dreyhundert vollendete Schleusen.

Mehrere Flüsse, deren Schifffahrt vollkommener gemacht worden ist.

Fünf-

VII. Brücken- u. Wegebau im franz. Reiche. 91

Fünfzig oder sechzigtausend Morgen Sümpfe, die ausgetrocknet und dem Landbau zurück gegeben worden sind.

Unermessliche, dem Meere abgewonnene Landstriche.

*Fünf und zwanzig wieder hergestellte Handels-
häfen.*

Im Anhang gibt der Hr. Übersetzer eine Nachricht, über die von *Courtin* nicht erwähnte neue Strasse von Mainz nach Coblenz, dann eine Zusammenstellung des Aufwandes auf einige der beschriebenen Bauwerke (131,457,485 Fr.) und zuletzt einen das vorliegende Werk im eigentlichen Sinne vervollständigenden Auszug aus dem vom Minister des Innern, Grafen von *Montalivet*, über den Zustand des Reichs in den Jahren 1811 und 1812 erstatteten und am 23. Febr. 1813 der gesetzgebenden Versammlung, vorgelegten Bericht.

VIII.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Professor *Bessel*.

Königsberg, den 22. April 1813.

Die *v. Zach*'schen Beobachtungen des grossen Cometen, für welche ich dem trefflichen Beobachter meinen herzlichsten Dank sage, sind nach meiner Reduction so gut ausgefallen, als sich bey der Lichtschwäche und den übrigens nicht sehr günstigen Umständen, nur irgend erwarten liess. *) Auch gelang es mir, den grössten Theil der verglichenen Sterne in der *Hist. cél.* aufzufinden, und so auch diese genauer zu reduciren, als *Lalande* selbst es konnte; und folglich genauer als sie im *Bode*'schen Catalog stehen, dessen Position Herrn *v. Zach*'s eignen Reductionen zum Grunde liegen.

Das ausführliche Detail der Beobachtungen theile ich den Astronomen auf einem andern Wege mit; denn es verlohnt sich gewiss der Mühe, diesen Cometen zum Gegenstande eines eignen Werkchens zu machen, zu welchem ich mit Sorgfalt die Data zusammen zu bringen suche; dort werden Sie alles finden, was mir über den Cometen bekannt geworden ist und bekannt werden wird. Ich säume nur noch damit, weil mir einige auswärtige Reihen von Beobach-

*) Man vergl. die S. 27 dieses Heftes befindliche Bemerkung.

achtungen z. B. die aus England, und eine sehr wichtige, wovon ich Ihnen unten mehr schreiben werde, noch unbekannt sind. Doch glaube ich folgendes den Resultaten voranschicken zu müssen:

Die Positionen der *Flamsteed'schen* Sterne, sowohl der direct mit dem Cometen verglichenen, als derer, die zur Reduction der Beobachtungen der *Hifi. célest.* benutzt wurden, nahm ich aus dem *Piazzi'schen* Verzeichnisse, und bestimmte ihre eigenen Bewegungen aus der Vergleichung mit meinem Cataloge für 1755. Den Rectascensionen für 1800 fügte ich $+ 4,^{\circ}0$ hinzu, und den Declinationen eine Correction die dem grossen *Piazzi'schen* Cataloge allgemein zukömmt, mit der Zenith-Distanz veränderlich ist, und in der hier benutzten Zone von $- 4,^{\circ}2$ bis $- 3,^{\circ}6$ beträgt. Wie ich diese Correction erhielt, setze ich einandermal auseinander, und behalte mir vor, zu zeigen, dass sie wirklich rechtmässig ist, und nicht etwa angebracht wurde, um *einseitige* Vergleichen in Uebereinstimmung zu bringen. — Die Beobachtungen selbst wurden (da Herr v. Zach nirgends sagt, dass der Stundenfaden des Netzes den Declinationskreise parallel gestellt wurde, und da diese Voraussetzung auch nicht zu den Beobachtungen passen würde) mit Rücksicht auf *die Lage* des Netzes berechnet. Bey den Kreismikrometer-Beobachtungen nahm ich die Durchmesser

des äussern Kreises $= 28' 55,^{\circ}7$

innern . . . $= 21' 40, 1$

und mit diesen Elementen erhielt ich folgende scheinbare Örter des Cometen :

1811	Mittl. Zeit St. Peyre	AR.	Declinat.	Beob- acht.
Apr. 11	8 ^U 17' 15"	117° 18' 44,8	—19° 58' 27,7*	1
15	9 51 50	116 50 29,0	—17 49 ::	1
16	8 52 57	116 46 20,5	—17 9 12,1	3
17	8 26 30	116 41 44,2	—16 35 27,3:	6
19	8 55 21	116 33 9,7	—15 29 19,2	8
22	9 11 31	116 24 9,6:	—13 47 ::	5
24	8 38 18	116 19 43,2	—12 44 11,8	4
27	8 45 20	116 18 10,5	—11 7 18,4	2
28	9 26 11	116 17 53,6	—10 35 37,9	1
30	8 57 27	116 21 2,0	—9 33 31,0	3
May 3	9 6 57	116 25 13,3	—8 1 47,9	5
4	9 4 44	116 37 35,3	—7 32 47,8:	2
7	9 8 10	116 36 50,0	—6 3 21,5	1
9	8 28 1	116 45 31,0	—5 5 6,6	2
12	9 36 12	117 0 52,2	—3 38 8,3	5
14	8 51 29	117 12 52,1:	—2 44 58,9	5
22	9 16 52	118 9 26,7	+ 0 47 27,0	5
23	9 1 39	118 17 27,2	1 12 38,9	2
24	9 9 2	118 26 42,8	1 37 21,3	3
25	9 21 53	118 35 40,4	2 2 51,9	1
27	8 57 16	118 54 9,5	2 51 26,4	3
28	8 58 17	119 3 56,2:	3 13 26,9:	2
Jun. 2	9 8 48	119 57 20,3	5 13 29,0	1

*) Ohne Detail angegeben,

Außer dieſen Beobachtungen machte Hr. v. Zach noch zwey, die ich nicht reduciren kann, indem ich die verglichenen Sterne nicht kenne, nämlich:

May 8 8U 35' 16" Diff. von einem Sterne in etwa 117° 55' AR.
und — 5° 54' Decl. ... — 1° 15' 30" und + 21' 23,6 ...
1 Beob.

May 11 9U 41' 39" Differenzen von zwey Sternen in

117° 22' — 4° 27' — 0° 27' 27,5 + 18' 57,2 } 1 Beob.
123° 48' — 4° 7' — 6° 53' 4,1 — 0' 44,9 }

Indem die v. Zach'schen Beobachtungen ſo wichtig ſind, iſt eine genaue Beſtimmung dieſer Sterne wünſchenswerth; — dürfte ich ſie Ihnen, da Sie ſich

sich schon früher in dieser Hinsicht um den Cometen verdient machten, vorschlagen? — Auch noch einige andere Sterne hat Herr v. Zach verglichen, die, wenn ihre Oerter bekannt wären, genauere Reductionen einiger der angeführten Beobachtungen geben würden; es sind folgende fünf:

114°	45'	und	—	16°	20'
119	10		+	0	50
119	39		+	0	40
115	21		+	2	14
118	59		—	8	22

Der letzte dieser Sterne kommt in der *Hist. cél.* vor, doch halte ich seine Zenith-Distanz für verdruckt.

Ich habe nicht gesäumt, diese Beobachtungen mit meinen elliptischen Elementen zu vergleichen; die Resultate hiervon theile ich Ihnen hier mit:

		R	Decl.
Apr.	11	— 51, 0	— 226, 7
	15	— 45, 3	— 71, 7
	16	— 10, 0	— 106, 3:
	17	— 15, 8	— 5, 8
	19	— 3, 7	— 20, 5:
	22	— 77, 5	— 42, 9
	27	— 47, 0	— 70, 6
	28	— 73, 8	— 19, 9
	30	— 23, 5	— 33, 0
May	3	— 37, 8	— 9, 2
	4	— 44, 6:	— 55, 8:
	7	— 66, 6	— 24, 5
	9	— 26, 7	— 42, 5
	12	— 0, 0	— 84, 5
	14	— 47, 1:	— 4, 2
	22	— 17, 0	— 35, 3
	23	— 37, 0	— 43, 7
	24	— 9, 8	— 12, 7
	25	— 16, 8	— 38, 1
	27	— 24, 0	— 34, 0
	28	— 23, 3:	— 98, 9
Jun.	2	— 35, 6	— 19, 9

Diese Vergleichung zeigt mit Bestimmtheit, daß meine elliptischen Elemente die \mathcal{R} etwas zu groß, und die Declination zu südlich angeben. Allein es ist, wie ich schon oben sagte, noch nicht Zeit, Verbesserungen vorzunehmen, und die Störungen in Rechnung zu bringen.

Wir haben nämlich einen sehr wichtigen Beytrag zu den Beobachtungen dieses Cometen vom Herrn von *Wisniewsky* zu erwarten, der ihn nach der *Conjunction mit der Sonne vom 19. Jul. bis 5. Aug. 1812* in Neu-Tcherkasks beobachtete. Diese höchst wichtige und interessante Nachricht verdanke ich dem wirklichen Etatsrath Herrn von *Fuß* Exc.; und ich hoffe, nun bald die Observationen selbst zu erhalten. Hr. v. *Wisniewsky* erwirbt sich unendliche Verdienste um die Cometen; dieses ist schon der zweyte, den er bey der äußersten Lichtschwäche ausspähte. — Wer unter einem weniger schönen Himmel und mit minder scharfen Augen oder Fernröhren ausgerüstet, den Cometen fleißig aber vergebens suchte, wird mit Wärme das Glück preisen, das Herr von *W.* gerade um diese Zeit nach dem Kaukasus führte. Zwar habe ich den Cometen nicht gesehen, auch hatte ich bey den hiesigen hellen Nächten, und seinem Stande nahe am Herizonte, kaum Hoffnung dazu; allein die Aufmerksamkeit mit welcher ich in allen heitern Nächten des Julius und August die Stelle betrachtete, wo der Comet stand, verbunden mit der Kraft des dazu gebrauchten Reflectors, gaben mir eine Idee von seiner äußersten Lichtschwäche.

IX.

Auszug aus zwey Schreiben des Herrn Professors Ritter Gauss.

Göttingen, den 5, 12. Jul. 1813.

.... Mit Vergnügen theile ich Ihnen, bester Freund, das *Pondfche* durch Herrn Dr. Olbers erhaltene Verzeichniß von Stern-Declinationen hier mit:

Distanzen vom Nordpol für den Anfang von 1812.

Sterne	Polar - Distanz			Anzahl der Beob.	Größte Unge- wifsheit
γ Draconis	38°	29'	3,00	60	0,25
Capella . .	44	12	25,85	20	0,50
α Cygni . .	45	23	9,50	30	0,50
α Lyrae . .	51	23	3,50	60	0,25
Castor . .	57	42	39,35	20	1,00
Pollux . .	61	31	38,92	20	1,00
α Andromedae	61	56	49,60	30	0,50
α Coron. bor.	62	38	43,25	50	0,50
α Arietis . .	67	25	54,00	35	0,75
Arcturus . .	69	50	0,25	50	0,25
α Tauri . .	73	52	43,35	18	0,50
β Leonis . .	74	22	37,20	24	0,50
α Herculis . .	75	23	9,45	20	0,50
α Pegasi . .	75	48	11,20	20	0,50
γ Pegasi . .	75	51	41,00	28	0,50
α Leonis . .	77	7	5,75	30	0,50
α Ophiuchi	77	17	36,50	30	0,75
γ Aquilae . .	79	50	9,00	30	0,75
α Aquilae . .	81	37	7,80	40	0,50
α Canis min.	84	18	6,50	20	1,00
α Orionis . .	82	38	17,80	8	1,00
α Serpentis . .	82	58	27,85	30	0,75
α Aquarii . .	91	13	39,00	30	0,50
α Hydrae . .	97	50	56,20	10	0,75
α Virginis . .	100	10	32,50	20	—
1 α Capricorni	103	4	46,25	30	—
2 α Capricorni	103	7	3,13	30	—

*Distanzen vom Nordpol für den Anfang
von 1812.*

Sterne	Polar - Distanz	Anzahl der Beob.	Größte Unge- wifsheit
α Librae .	105° 15' 7,"50	12	—
Sirius . .	106 27 55, 75	24	—
α Scorpii .	116 0 8, 20	36	—
γ Urfae maj. .	39 44 39, 60	50	0,"25
α Urfae maj. .	27 14 12, 20	36	0, 50
δ Urfae min. .	15 4 34, 25	50	0, 25
α Cassiopej. .	34 29 42, 60	30	0, 50
α Persei . .	40 49 6, 25	12	0, 75
α Cephei . .	28 12 27, 25	20	0, 75
δ Cephei . .	20 5 46, 00	20	0, 75
γ Urfae maj. .	35 15 35, 10	10	0, 75
α Urf. min. {	1 41 41, 60	60	Sommer
	1 41 41, 00	60	Winter

Die Columnne, größte Ungewifsheit, bezieht sich auf das Mittel, nicht auf die einzelnen Bestimmungen. Noch war beygefügt: Resultat aus 60 Beobachtungen von α Lyrae, je 10 zusammen genommen.

Mittl. Monatstag

Julius 15	51° 23' 3,"12 + 0,"82 p	3,"33 + 0,"55 p
August 7	. . . 3, 51 + 0, 67 p	
Sept. 15	. . . 3, 36 + 0, 15 p	
Oct. 10	. . . 3,"30 — 0,"23 p	3,"61 — 0,"52 p
Nov. 1	. . . 3, 99 — 0, 50 p	
Decbr. 8	. . . 3, 54 — 0, 85 p	

Hieraus p (ifang thing) = 0,"26

Hier

IX. Auszug aus zwey Schreib. des Hrn. Prof. Gauß 99

Hier schicke ich Ihnen noch Dr. Olbers Beobachtungen des Cometen:

1813	M. Z. in Bremen				AR α			Südl. Abwei- chung		
April	14	13 ^h	31'	4"	266°	42'	51,2	0°	34'	22,8
—	15	12	14	29	265	48	47,9	1	46	4,5
—	19	11	38	0	260	40	39,1	8	15	23,7
—	21	12	0	35	256	51	59,3	12	42	54,3
—	24	11	58	38	248	43	57,7	21	25	9,8
—	25	11	41	30	245	8	18,0	24	49	2,4
—	25	12	5	38	245	4	3,0	24	54	16,4

Herr Enke hat aus meinen Beobachtungen folgende Elemente abgeleitet:

Zeit des Perihel. 1813 May 19,44658 M. Z. in Göttingen

Log. perih. Distanz 0,084969

Länge des Perihels 197° 43' 45,6

Ω 42 40 39,6

Neigung . . . 81 2 28,2

Bewegung rückläufig.



X.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Dr. Burchhardt.

Paris, den 21. Jun. 1813.

..... Hr. Daufsy hat den letzten Cometen berechnet und seine Elemente weit früher, als Herr Nicollet, dem Institute vorgelegt, er fand:

Zeit des Durchganges 1813, May 9, 51566 M. Z. Paris
Länge des Sonnen-Nähepuncts $6^{\text{S}} 17^{\circ} 37' 6''$

Ω 1 12 40 21

Neigung der Bahn 81 1 0

Kleinster Abstand 1,21532

Log. der tägl. Bewegung 9,8330905

Bewegung rückgängig

Auch hier war das Wetter sehr ungünstig; meine Beobachtungen des Cometen sind folgende:

1813	M. Z. Paris			AR.			Südl. Ab- weichung	
April	h	'	"	°	'	"	—	
19	17	27	44,4	261	56	6,0	—	durch
21	17	14	19,4	258	34	51,0		
22	17	6	9,1	256	32	16,5	13 5 30,0	Wolken
23	16	56	44,7	254	11	10,5	15 43 35,0	

Herr Bouvard hat den Cometen am 28. April aufser den Meridian beobachtet. Wolken haben die Meridian-Beobachtung sowohl für ihn als mich vereitelt; den folgenden Tag war er unterm Horizont.

... Der

. . . Der verdiente Herr Rath *Soldner* in München, hat mir die Ehre erzeigt, einen gehaltvollen Brief über meine Mondstafeln zu schicken. Ich hebe folgende Resultate daraus aus. Aus den Coefficienten, welche mir die Beobachtungen gegeben haben, nämlich $122,7 \sin (\odot - \odot)$; $7,0 \sin \Omega$, und $8,0 \sin \varpi$ findet *Soldner* die Sonnen-Parallaxe $8,61$, die Abplattung $\frac{1}{302,4}$, und $\frac{1}{305,6}$ *). Er hat bey diesen Rechnungen vorausgesetzt, die Horizontal-Parallaxe des Mondes unter der Polhöhe $35^{\circ} 16' 57''$, $7,8$, die Neigung der Bahn $5^{\circ} 8' 44''$ das Verhältniß der mittlern Bewegung des Mondes zu der des Knotens $248,824$; das Verhältniß der Schwungkraft zur Schwere unterm Aequator $0,0034676$. Ich benutze die Gelegenheit, eines Umstandes zu erwähnen, der, wenn ich nicht irre, noch nicht bemerkt worden ist; nämlich der Coefficient $122,7 \sin (\odot - \odot)$ hängt von dem Mond-Halbmesser ab. Man kann sich leicht davon versichern. Vom Neumond bis zum Vollmond beobachtet man den ersten Rand des Mondes und während dieser Zeit ist der Sinus des Arguments positiv; in der zweyten Hälfte des Mond-Monats beobachtet man den zweyten Rand, und der Sinus ist negativ. Der Monds-Halbmesser und die Gleichung ändern also zugleich ihr Zeichen, und man kann daher die Fehler, die in beyden sich befinden, nicht von einander sondern; ist der Monds-

Halb-

*) Schon im April 1812 benutzte Graf *La Place* diese Gleichungen zu Herleitung der Sonnen-Parallaxe und Erd-Abplattung

Halbmesser um 1" fehlerhaft, so wird auch das Maximum der Gleichung um so viel oder gar um etwas mehr falsch bestimmt werden. Durch diese Bemerkung kann man den beträchtlichen Unterschied der Mayer'schen Bestimmung dieses Coefficienten erklären; sie veranlaßte mich, Herrn *Daussy* zu bitten, den Monds-Durchmesser aus den zu Greenwich beobachteten Durchgängen zu bestimmen; wodurch wahrscheinlich aller Fehler vermieden worden ist, wenn auch der erhaltene Durchmesser nicht ganz fehlerfrey seyn sollte; denn es ist gewiss, daß man bey Berechnung der Greenwicher Durchgänge den Halbmesser zum Grunde legen muß, den das Passagen-Instrument selbst gegeben hat.

XI.

Sternbedeckungen.

*Sternwarte à la Capellette den 17. April
1813.*

γ in der Waage	Eintritt	10 ^U	43'	47."73	M. Z.
	Austritt	12	3	46, 93	—

*Bedeckung des Aldebaran vom Monde,
den 8. März 1813, auf der Sternwarte de St. Giovannini
in Florenz, von P. P. Del Ricca u. Inghirami.*

Eintritt	7 U	23'	28."3	Mittl. Zeit
Austritt	8	31	51, 7	— —

Verbeſſerung. S. 57 muß die Columnen - Ueberschrift
heissen:

IV. *Attraction homogen, ellipt. Sphäroiden.*

INHALT.

I N H A L T.

	Seite
I. Untersuchung über die Elemente der Mercursbahn	3
II. Rectificirte Beobachtungen des ersten großen Cometen vom Jahr 1811, im ersten Zweig seiner Bahn, vor seinem Durchgange durch die Sonnen-Nähe. Angestellt auf der Sternwarte des Freyherrn v. Zach in St. Peyre bey Marseille	24
III. Verzeichniß einiger sehr schlecht, oder noch nie bestimmter Sterne im Einhorn, und in der Buchdrucker-Werkstatt, beobachtet auf der Sternwarte à la Capelle bey Marseille	31
IV. Die Attraction homogener elliptischer Sphäroiden nach einer neuen Methode entwickelt von Herrn Prof. Ritter Gauß	37
V. Ueber die Gleichung von langer Periode in der Theorie des Mondes, vom Grafen La Place	58
VI. Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806, auf Befehl Sr. kais. Maj. Alexander des Ersten auf den Schiffen Nadeslida und Newa, unter dem Commando des Capit. von der kais. Marine, A. J. v. Krusenstern. III. Theil. St. Petersburg 1812.	60
VII. Arbeiten der Brücken- und Wegebau-Ingenieurs seit 1800, oder Uebersicht der neuen Baue, die unter der Regierung Napoleons I. an Strafsen, Brücken und Canälen gemacht, und der Arbeiten, die für die Flussschifffahrt, die Austrocknungen, die Handelshafen u. s. w. unternommen worden sind, von Hrn. Courtin, General-Secretär der General-Direction der Brücken und Wege. Aus dem Französ. übersetzt. Gotha, in der Beckerfchen Buchhandlung 1813.	84
VIII. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Bessel	92
IX. Auszug aus zwey Schreiben des Hrn. Professors Ritter Gauß	97
X. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Dr. Burckhardt	100
XI. Sternbedeckungen	103



Hierbey eine Tafel mit Horners Barometer-Beobachtungen.

tungen

Des Schiffes													
3	3	me	Th	0	10	0	50	59	9	10	0	150	
4	3	38	20, 6	16	8		21	49	60	3	11	8	151
5	4	38	20, 2	21	5		22	48	60	9	13	3	152
6	3	32	20, 1	25	0		23	54	61	0	15	2	152
7	5	38	19, 7	26	7		0	0	60	7	17	3	153
8	4	29	19, 5	26	3		0	56	60	3	19	2	154
9	4	23	19, 5	24	3		2	2	59	6	19	0	155
10	4	29	20, 0	20	7		2	58	58	7	19	0	156
11	5	27	20, 1	16	0		3	51	57	7	18	0	158
12	4	31	20, 0	10	7		4	38	56	9	17	4	161
13	3	33	20, 0	5	2 N		5	24	56	0	16	9	163
14	3	35	20, 2	0	5 S.		6	5	55	3	16	9	166
15	3	29	20, 4	5	9		6	47	54	7	17	0	169
16	4	36	20, 7	11	0		7	28	54	3	16	8	171
17	3	28	20, 5	15	9		8	10	54	1	16	9	174
18	2	31	20, 8	20	0		8	55	54	0	17	5	176
19	5	26	20, 8	23	3		9	52	54	0	18	7	178
20	5	25	20, 9	25	5		10	32	54	2	19	9	180
21	4	28	21, 0	26	7		11	25	54	4	21	7	181
22	4	19	21, 1	26	5		12	15	54	8	23	1	181
23	4	27	21, 2	25	0		13	6	55	2	23	5	182
24	4	27	20, 9	22	3		13	57	55	6	24	0	182
25	5	17	21, 1	18	4		14	46	56	1	24	6	183
Suma	61	23											
Mittel	3												

Sechs Monatsstücke, jedes von sechs bis acht Bogen, machen einen Band aus, der mit einem Sachen- und Namen-Register geschlossen wird; zwey Bände einen Jahrgang. Der Preis eines Jahrgangs ist 6 Thaler Conv. Geld, und man kann zu jeder Zeit in das Abonnement eintreten, muß aber den ganzen laufenden Jahrgang nehmen. Einzelne Monatsstücke kosten 14 ggr.

Man macht die Bestellungen bey den Post-Expeditionen und Buchhandlungen jedes Orts, welche die Exemplare von unterzeichneter Buchhandlung auf dem gewöhnlichen Wege beziehen.

Auch sind bey uns zu haben:

de *Lindenau* Tables barométr. pour faciliter le Calcul des Nivellements et des mesures des hauteurs par le Baromètre. 4°.

2 Thlr. 12 gl.

Ejusdem Tabulae Veneris novae et correctae. Fol. min. 2 Thlr.

de *Zach* Tabulae Motuum Solis novae et corr. quibus acced.

Fixar. praecip. Catal. nov. ex observat. astr. ann. 1787-90

in spec. astr. Goth. habitis. 1792 Fol. min. 6 Thlr.

Ejusdem Fixarum praecip. Catal. nov. etc. (besonders gedruckt)

3 Thlr.

— Tabulae mot. sol. etc. Supplement 1804. 1 Thlr. 12 gl.

— Astronom. Tafeln der mittl. geraden Aufsteig. der Sonne etc. zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc. (beym Observiren zu brauchen). Gebund. 6 gl.

— Nachrichten von der k. preuss. trigonom. und astronom. Aufnahme von Thüringen etc. und von der Gotha'schen Gradmessung I. Th. 2 Thlr.

— Tabulae spec. Aberr. et Nutat. una cum insignior. 494 stell. zod. Catalogo novo etc. Vol. I. II. 4° broch. 20 Thlr.

— Tables abrégées et port. du soleil. 1 Thlr. 12 gl.

— Tables abr. et port. de la lune. 2 Thlr. (Beyde inkl. 4. broch.)

— Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour 1404 étoiles etc. 8° broch. 3 Thlr. 12 gl.

Beckersche Buchhandlung in Gotha.

na.

179.



MONATLICHE
CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

Leib Regiment

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

vom

Freyherrn F. von ZACH,

Herzoglichen Sachsen-Gothaischen
Oberhofmeister.

AUGUST 1813.

G O T H A,

in der Beckerschen Buchhandlung.

Der Zweck dieser *Monatlichen Correspondenz* ist: Die Freunde der *Erd- und Himmels-Kunde* und der dahin einschlagenden Wissenschaften und Künste von den Fortschritten, welche von Zeit zu Zeit in diesen Fächern der Gelehrsamkeit geschehen, frühzeitig zu benachrichtigen. Sie beruhet auf einer von dem Herrn Herausgeber mit vielen gründlichen Gelehrten im Fache der Astronomie und Geographie (beydes im weitesten Sinne,) in den verschiedenen europäischen Staaten getroffenen Uebereinkunft, ihm die Resultate ihrer Forschungen, Beobachtungen und Lectüre mitzutheilen, um solche mittelst dieser Zeitschrift sowohl gegenseitig auszuwechseln, als auch durch öffentliche Bekanntmachung gemeinnützig zu machen.

Sie enthält also:

- I. Neue eigene Aufsätze der Herren Correspondenten über Gegenstände der Astronomie, der mathematischen, physischen und politischen Geographie, und der zu diesen Fächern gehörigen Hilfswissenschaften und Fertigkeiten, welchen, wo es zur Erläuterung nothwendig ist, Zeichnungen, Pläne und Landkarten beygefügt werden.
- II. Einzelne eigene Beobachtungen, Erfahrungen, Entdeckungen und Erfindungen in diesen Wissenschaften.
- III. Urtheile und Nachrichten von neuen in diese Wissenschaften einschlagenden Schriften, wodurch die Wissenschaft erweitert oder berichtigt wird.
- IV. Beurtheilende Nachrichten von neuen Landkarten, Plänen, astronomischen und mathematischen Werkzeugen u. s. w.
- V. Biographische Nachrichten von Männern, die in diesen Fächern viel geleistet haben, mit ihren Bildnissen.
- VI. Berichte von Reisenden, die auf die Länder- und Völkerkunde Bezug haben.

MONATLICHE
CORRESPONDENZ
ZUR BEFÖRDERUNG
DER
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

AUGUST 1813.

XII.

Untersuchung
über die

Elemente der Merkurs-Bahn.

(Fortsetz. und Beschluß zu S. 23.)

III. *Bestimmung der eigentlich elliptischen Elemente der Merkurs-Bahn, Epoche, Aphelium, Excentricität, mittlere Bewegung und Corrections-Factor, der für Berechnung der Störungen gebrauchten Venus-Masse.*

Nach den vorherigen, zum Theil genäherten, zum Theil genauen Bestimmungen des Knotens und dessen jährlicher Aenderung, der Neigung, der mittlern
Mon. Corr. XXVIII. B. 1313. H: Bewe-

Bewegung und der jährlichen Aenderung des Apheliums, wurde auf die der andern elliptischen Elemente übergegangen. Es wurden hierzu theils die oben aus den Durchgängen hergeleiteten sieben heliocentrischen Längen, theils hundert geocentrische Beobachtungen von *Maskelyne* und *Piazzi* benutzt und daraus die Bedingungs-Gleichungen construirt, die fünf unbekannte Größen enthielten. Davon Knoten und Neigung, schon sehr genäherte Werthe vorhanden waren, so war es völlig erlaubt, Correctionen dieser Elemente, in Hinsicht der dadurch gegebenen Reduction der berechneten Länge in der Bahn, auf die in der Ecliptik, bey den aus den Längen entwickelten Bedingungs-Gleichungen unberücksichtigt und bis zu dem letzten Abschnitt dieser Untersuchung ausgesetzt seyn zu lassen. Für die heliocentrischen Längen ist die Form der Gleichung sehr einfach; sey λ die berechnete, λ' die beobachtete Länge in der Ecliptik, dN , dnt , $d\gamma$, dP , μ' , Correction der Epoche, der mittlern Bewegung, der Excentricität, des Apheliums und Factor für die Venus-Masse, so ist mit einer hier völlig hinreichenden Schärfe

$$\begin{aligned}
 (\lambda - \lambda') + dN & \left\{ 1 - (2e - \frac{1}{4}e^3) \cos p + (\frac{5}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^4) \cos 2p - \right. \\
 & \quad \left. - \frac{1}{4}e^3 \cos 3p + \frac{1}{24}e^4 \cos 4p \right\} \\
 + T dnt & \left\{ 1 - (2e - \frac{1}{4}e^3) \cos p + (\frac{5}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^4) \cos 2p - \right. \\
 & \quad \left. - \frac{1}{4}e^3 \cos 3p + \frac{1}{24}e^4 \cos 4p \right\} \\
 - de & \left\{ (2 - \frac{1}{2}e^2) \sin p - (\frac{5}{2}e - \frac{1}{8}e^3) \sin 2p + \right. \\
 & \quad \left. + \frac{1}{4}e^2 \sin 3p - \frac{1}{24}e^3 \sin 4p \right\} \\
 + dP & \left\{ (2e - \frac{1}{4}e^3) \cos p - (\frac{5}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^4) \cos 2p + \right. \\
 & \quad \left. + \frac{1}{4}e^3 \cos 3p - \frac{1}{24}e^4 \cos 4p \right\} \\
 + (p) \mu' & = 0 \quad (E)
 \end{aligned}$$

Etwas zusammengesetzter wird diese Gleichung, wenn beobachtete geocentrische Orte, mit den aus den Elementen berechneten verglichen werden, wo also die Correctionen der elliptischen Elemente durch eine Function der geocentrischen Länge ausgedrückt werden müssen. Schon früher haben *Euler* und *Oriani* (*Comment. Petrop. T. XVII Theor. Merc.* p. 93) die hierher gehörigen Entwicklungen gegeben; neuerlich *Gauss* in seiner *Theor. mot. corp. coel.* p. 75; da dessen Formeln ungemein geschmeidig und zugleich streng genau sind, so würde ich ohne Frage diese benutzt haben, wäre die Anzahl der zu entwickelnden geocentrischen Bedingungs-Gleichungen minder groß gewesen. Allein da die Theorie der Mercursbahn es gestattet, die Excentricität für den ganzen Zeitraum, den die hier in Anwendung kommenden geocentrischen Beobachtungen umfassen, als constant anzunehmen, so schien es mir, als könne eine hundertmal wiederholte Berechnung, durch Anwendung von Formeln erleichtert werden, die wenn gleich an sich merklich weitläufiger, als die von *Gauss* dafür entwickelten, dadurch bequem werden, daß sie den Gebrauch von Hülftafeln gestatten. Dem gemäß, war das hierbey angewandte Verfahren folgendes: Sey l geocentrische Länge des Planeten, r, Δ , curtirte Abstände von Sonne und Erde, L, R , heliocentrische Länge der Erde und Abstand von der Sonne, so ist

$$r \sin (l - \lambda) = R \sin (l - L)$$

$$\text{tg. } l = \frac{r \sin \lambda - R \sin L}{r \cos \lambda - R \cos L}$$

H z

hieraus

hieraus

$$dl = d\lambda \frac{r}{\Delta} \cos(\lambda - l) + dr \frac{\sin(\lambda - l)}{\Delta}; \quad (F)$$

Um also dl in einer Function der elliptischen Elemente ausgedrückt zu erhalten, müssen in der vorstehenden Gleichung $d\lambda$, dr , durch dN , dnt .. gegeben werden.

$d\lambda = \lambda' - \lambda$, ist aus der Gleichung (E) bekannt und für dr findet sich,

$$\begin{aligned} dr = & -dNa \left\{ (e - \frac{3}{8}e^3) \sin p - (e^2 - \frac{2}{3}e^4) \sin 2p + \right. \\ & \left. + \frac{9}{8}e^3 \sin 3p - \frac{4}{3}e^4 \sin 4p \right\} \\ & - Tdnt a \left\{ (e - \frac{3}{8}e^3) \sin p - (e^2 - \frac{2}{3}e^4) \sin 2p + \right. \\ & \left. + \frac{9}{8}e^3 \sin 3p - \frac{4}{3}e^4 \sin 4p \right\} \quad (G) \\ & + de a \left\{ e + (1 - \frac{9}{8}e^2) \cos p - (e - \frac{4}{3}e^3) \cos 2p + \right. \\ & \left. + \frac{9}{8}e^2 \cos 3p - \frac{4}{3}e^3 \cos 4p \right\} \\ & + dP a \left\{ (e - \frac{3}{8}e^3) \sin p - (e^2 - \frac{2}{3}e^4) \sin 2p + \right. \\ & \left. + \frac{9}{8}e^3 \sin 3p - \frac{4}{3}e^4 \sin 4p \right\} \end{aligned}$$

Eigentlich kömmt in dem Ausdruck für dr , auch noch ein von dem Differential der halben großen Axe $= a$, abhängendes Glied vor, was jedoch bekanntlich ebenfalls Function der mittlern Bewegung ist; es ist

$$\frac{dr}{da} = 1 + \frac{e^2}{2} + (e - \frac{3}{8}e^3) \cos p - (\frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{3}e^4) \cos 2p + \frac{3}{2}e^3 \cos 3p - \dots$$

$$da = -\frac{2}{3} \frac{a}{nt} \cdot dnt;$$

für die Mercursbahn, ist

$$\frac{2}{3} \frac{a}{nt} = 0,00000004796$$

und

und da vermöge des vorherigen dnt , nicht zwey Secunden, hiernach da nicht 0,0000001 betragen kann, so könnte auch dieses Glied im Differential-Ausdruck für dr unbedenklich vernachlässiget werden.

Nun sey

$$\frac{r}{\Delta} \cdot \cos (\lambda - l) = \alpha; \frac{\sin (\lambda - l)}{\Delta} \beta;$$

so wird nach Substitution der Werthe von $d\lambda$, und dr , aus (E) und (G) in der Gleichung (F), für den Ausdruck, der ein gegebenes dl in einer Function von dN , dnt ... gibt, folgende Form erhalten:

$$\begin{aligned} -dl + dN & \left\{ \begin{aligned} & + \alpha \left\{ 1 - (2e - \frac{1}{2}e^3) \cos p + (\frac{5}{2}e^2 - \frac{1}{2}\frac{1}{2}e^4) \cos 2p - \right. \\ & \quad \left. - \frac{1}{2}e^3 \cos 3p + \frac{1}{2}\frac{3}{4}e^4 \cos 4p \right\} \\ & - a\beta \left\{ (e - \frac{3}{2}e^3) \sin p - (e^2 - \frac{3}{2}e^4) \sin 2p + \right. \\ & \quad \left. + \frac{3}{2}e^3 \sin 3p - \frac{1}{2}e^4 \sin 4p \right\} \end{aligned} \right\} \\ + Tdnt & \left\{ \begin{aligned} & + \alpha \left\{ 1 - (2e - \frac{1}{2}e^3) \cos p + (\frac{5}{2}e^2 - \frac{1}{2}\frac{1}{2}e^4) \cos 2p - \right. \\ & \quad \left. - \frac{1}{2}e^3 \cos 3p + \frac{1}{2}\frac{3}{4}e^4 \cos 4p \right\} \\ & - a\beta \left\{ (e - \frac{3}{2}e^3) \sin p - (e^2 - \frac{3}{2}e^4) \sin 2p + \right. \\ & \quad \left. + \frac{3}{2}e^3 \sin 3p - \frac{1}{2}e^4 \sin 4p \right\} \end{aligned} \right\} \\ - de & \left\{ \begin{aligned} & + \alpha \left\{ (2 - \frac{3}{2}e^2) \sin p - (\frac{5}{2}e - \frac{1}{2}e^3) \sin 2p + \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{2}e^3 \sin 3p - \frac{1}{2}\frac{3}{4}e^4 \sin 4p \right\} \\ & - a\beta \left\{ e + (1 - \frac{3}{2}e^2) \cos p - (e - \frac{3}{2}e^3) \cos 2p + \right. \\ & \quad \left. + \frac{3}{2}e^2 \cos 3p - \frac{1}{2}e^3 \cos 4p \right\} \end{aligned} \right\} \\ + dP & \left\{ \begin{aligned} & + \alpha \left\{ (2e - \frac{1}{2}e^3) \cos p - (\frac{5}{2}e^2 - \frac{1}{2}\frac{1}{2}e^4) \cos 2p + \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{2}e^3 \cos 3p - \frac{1}{2}\frac{3}{4}e^4 \cos 4p \right\} \\ & + a\beta \left\{ (e - \frac{3}{2}e^3) \sin p - (e^2 - \frac{3}{2}e^4) \sin 2p + \right. \\ & \quad \left. + \frac{3}{2}e^3 \sin 3p - \frac{1}{2}e^4 \sin 4p \right\} \end{aligned} \right\} \\ + \alpha (p) \mu' & = e \quad (H) \end{aligned}$$

So weitläufig diese Form von Bedingungs-Gleichung auf den ersten Anblick ausieht, so ist doch deren Berechnung, wie ich aus einer hundertmaligen Erfahrung behaupten kann, mit Beyhülfe der dazu construirten Hülftafeln, ungemein leicht und sicher.

Es seyen

$$A = (2e - \frac{1}{4}e^3) \cos p - (\frac{3}{2}e^2 - \frac{11}{12}e^4) \cos 2p + \\ + \frac{1}{4}e^3 \cos 3p - \frac{1}{24}e^4 \cos 4p$$

$$B = a \left\{ (e - \frac{3}{8}e^3) \sin p - (e^2 - \frac{3}{8}e^4) \sin 2p + \right. \\ \left. + \frac{5}{8}e^3 \sin 3p - \frac{4}{3}e^4 \sin 4p \right\}$$

$$C = (2 - \frac{3}{4}e^2) \sin p - (\frac{1}{2}e - \frac{1}{8}e^3) \sin 2p + \\ + \frac{1}{4}e^3 \sin 3p - \frac{1}{24}e^4 \sin 4p$$

$$D = a \left\{ e + (1 - \frac{3}{8}e^2) \cos p - (e - \frac{4}{3}e^3) \cos 2p + \right. \\ \left. + \frac{5}{8}e^2 \cos 3p - \frac{4}{3}e^3 \cos 4p \right\}$$

Mit Substitution dieser Werthe, verwandelt sich die Gleichung (H) in folgende:

$$-dl + dN [\alpha - (\alpha A + \beta C)] + Tdnt [\alpha - (\alpha A + \beta C)] \\ - d\phi [\alpha B - \beta D] + dP [\alpha A + \beta C] + \alpha(p)\mu' = 0; \quad (J)$$

Die Gröfsen, α und β werden bey Verwandlung der heliocentrischen Länge in geocentrische, durch ein einmaliges Aufschlagen der Logarithmen-Tafeln erhalten; die vorher erwähnten Hülftafeln geben mit dem Argument der *mittlern Anomalie* die Werthe A, B, C, D , ohne alle Rechnung, und sind die Gröfsen $\alpha, \beta, A, B, C, D$, gegeben, so be ruht die Berechnung der ganzen Bedingungs-Gleichung, blos auf Formation der beyden Glieder

$$\alpha A + \beta C, \alpha B - \beta D$$

[e

so daß deren numerische Entwicklung ohne alle Mühe in dem Zeitraum weniger Minuten vollendet ist.

Da durch den Factor $\alpha = \frac{r}{\Delta} (\cos \lambda - l)$, der heliocentrische Fehler meistentheils bedeutend vermindert, und eben dadurch die Coefficienten von dN , $dnt \dots$ klein werden, so daß auch ein kleiner Fehler in der Differenz der beobachteten und berechneten geocentrischen Länge ($= dl$) einen sehr starken Einfluß auf die gesuchten Correctionen der elliptischen Elemente hat, so mußte diese Vergleichung der Beobachtung und Elemente mit besonderer Sorgfalt und Schärfe geschehen. Den Einfluß von Beobachtungsfehlern, hoffe ich durch die Anzahl der in Rechnung genommenen Beobachtungen eliminirt zu haben, und die Reduction der berechneten heliocentrischen Länge auf geocentrische, habe ich durch Correction der correspondirenden Orte der Sonnen-Tafeln aus gleichzeitigen Sonnen-Beobachtungen, möglichst fehlerfrey zu erhalten gesucht.

Die Vergleichung der beobachteten hundert geocentrischen Längen, mit den für dieselben Epochen berechneten, gab nach gehöriger Substitution der numerischen Werthe in der Gleichung (J) hundert Bedingungs-Gleichungen für die Bestimmung der Werth von dN , dnt , de , dP , μ' . Zu Abkürzung der Rechnung wurden diese hundert Gleichungen durch Addition zu fünf und fünf in zwanzig vereinigt, aus denen, verbunden mit den durch siebzehn heliocentrische Längen gegebenen Gleichungen, die Correctionen der vorläufig angenommenen elliptischen Elemente hergeleitet wurden; dieses Final-System von 37 Bedingungs-Gleichungen lasse ich hier folgen; sämtliche 117 nebst den sie begründenden Beobachtungen, sind in der oben erwähnten Schrift mitgetheilt.

1631+12,8+1,4935 ^{dN}	-176,461 ^{dnt}	-1,0247 ^{de}	-0,4935 ^{dP}	+7,6 ^μ	=0;
1661+33,3+0,7228	-64,082	+0,9170	+0,2772	-14,1	=0;
1677+10,0+1,4947	-107,835	-1,0231	-0,4947	-13,3	=0;
1690+16,5+1,5028	-88,864	-0,9309	-0,5028	-4,1	=0;
1697+3,0+1,4768	-77,015	-1,1714	-0,4768	+6,7	=0;
1723+14,2+1,4958	-39,115	-1,0051	-0,4958	-10,5	=0;
1736+13,0+1,5054	-19,776	-0,9257	-0,5054	-5,1	=0;
1740+5,6+0,7295	-7,047	+0,9803	+0,2705	-9,7	=0;
1743-9,5+1,4783	-9,076	-1,1609	-0,4783	+14,6	=0;
1753+13,3+0,7143	+2,389	+0,8854	+0,2857	-5,5	=0;
1756-10,8+1,4879	+10,192	-1,0791	-0,4879	+7,8	=0;
1769-5,5+1,4969	+29,728	-0,9939	-0,4969	-12,1	=0;
1782-10,8+1,5066	+49,515	-0,9137	-0,5066	+13,0	=0;
1786+7,0+0,7219	+26,234	+0,9608	+0,2781	-7,7	=0;
1789-4,5+1,4781	+58,898	-1,1545	-0,4781	+6,7	=0;
1799+10,6+0,7185	+35,458	+0,8809	+0,2815	+5,6	=0;
1802-4,6+1,4834	+78,398	-1,1175	-0,4834	-0,4	=0;
+13,7+0,5720	+15,650	+1,2530	-0,0030	-2,3	=0;
+7,5-0,2730	-8,070	-0,1810	+0,2110	-1,1	=0;
+8,5-0,4240	-15,112	+0,3780	+0,0390	+0,6	=0;
+3,6-0,3840	-15,774	+1,5820	-0,1260	+0,1	=0;
+1,9+0,0360	-4,237	+0,3170	-0,2110	+0,3	=0;
-13,9-0,3540	-14,951	-0,7080	-0,2470	+0,2	=0;
+7,8-0,3070	-14,137	+1,4121	-0,0280	+0,3	=0;
+13,2+0,8100	+24,040	+0,7094	+0,0470	+0,3	=0;
+23,3+0,3010	+9,581	+1,7043	-0,1920	-0,6	=0;
+1,9+0,2380	+8,508	+0,7365	-0,2180	-1,1	=0;
-6,4+0,3430	+14,469	-0,5521	-0,0910	-0,9	=0;
-6,1+0,0860	+4,454	+0,5176	+0,0910	-1,3	=0;
-8,3+0,1800	+7,711	-0,1798	+0,0850	-1,4	=0;
-2,8+0,2670	+12,610	-0,0800	+0,0630	-1,4	=0;
+23,4+0,2050	+8,941	+2,1504	+0,0720	-1,9	=0;
+16,5+0,3660	+15,602	+1,9723	+0,1150	-4,8	=0;
+2,0+0,3180	+13,753	+0,6340	+0,1360	+0,3	=0;
+10,1+0,2000	+8,831	+1,9065	-0,1350	+1,5	=0;
+7,7-0,1840	-7,716	+1,4011	-0,2790	-3,1	=0;
+11,5-0,2290	-9,854	+2,2832	-0,0170	+1,1	=0;

Werden diese sieben und dreyßig Gleichungen durch die Methode der kleinsten Quadrate behandelt, so folgt:

$$\begin{aligned}
 &-144,86 + 1280,19 \mu' = 0; \\
 &+10,20 + 1,550 \delta P - 14,743 \mu' = 0; \\
 &+315,97 + 40,548 \delta e + 3,241 \delta p - 53,840 \mu' = 0; \\
 &-6697,16 + 76915,65 \delta nt + 184,34 \delta e + 66,24 \delta p \\
 &\quad + 1783,30 \mu' = 0; \\
 &+143,56 + 31,689 \delta N - 356,48 \delta nt - 13,48 \delta e - \\
 &\quad - 7,64 \delta p - 9,08 \mu' = 0;
 \end{aligned}$$

hieraus

$$\begin{aligned}
 \mu' &= + 0,11315 \\
 \delta p &= - 5, 5 \\
 \delta e &= - 7, 2 \\
 \delta nt &= + 0,106403 \\
 \delta N &= - 7,7.
 \end{aligned}$$

Werden diese Werthe in den vorherigen Gleichungen substituirt, so sind die übrig bleibenden Fehler folgende:

Nro.	Fehler	Nro.	Fehler	Nro.	Fehler
1	- 4,04	14	- 5, 85	27	- 3,78
2	+10, 70	15	+ 2, 78	28	- 3, 48
3	- 6, 78	16	+ 3, 57	29	-12, 81
4	+ 3, 89	17	- 2, 07	30	- 9, 94
5	- 3, 15	18	+ 3, 03	31	- 3, 57
6	+ 5, 16	19	+ 8, 84	32	+10, 93
7	+ 6, 90	20	+ 7, 69	33	- 0, 50
8	+12, 50	21	- 5, 95	34	- 3, 77
9	- 6, 37	22	- 0, 19	35	- 3, 10
10	- 0, 62	23	- 6, 32	36	+ 0, 29
11	+12, 14	24	- 1, 21	37	- 3, 42
12	- 4, 95	25	+ 4, 69		
13	+ 4, 22	26	+10, 50		

Ohne

Ohne Correction war die Summe der Quadrate der Fehler 6135", mit Correction 2238".

Wie durch diese verbesserten Elemente alle hundert beobachtete Längen dargestellt werden, werde ich am Schluß beybringen.

Für die Bestimmung der Venusmasse folgt aus dem obigen

$$0,11315 - \mu' = 0; \quad \text{III.}$$

Die Knotenbewegung gab $+ 0,0419 - 4,054 \mu' = 0;$

die des Apheliums . . . $+ 0,6180 - 3,023 \mu' = 0;$

$$\text{hieraus } 2,0379 - 25,574 \mu' = 0;$$

$$\mu' = 0,07970$$

aus Nro. III. folgt

$$\mu' = 0,11315$$

hiernach im Mittel

$$\mu' = 0,09643;$$

Ist nun die *La Place'sche* Venus-Masse $= 1$, so wird die corrigirte $= 1,09643$, oder durch die Sonnenmasse ausgedrückt

$$= \frac{1}{383137} \cdot 1,09643 = \frac{1}{349440};$$

und mit dieser Masse sind in meinen neuen Mercur-Tafeln, alle periodische und Säcular-Aenderungen berechnet worden.

Was nach Anbringung der für *dN ent* . . gefundenen Größen, für verbesserte Werthe der Elemente sich ergeben, wird am Schluß nach Bestimmung von Neigung und Knoten beygebracht werden.

IV. Bestimmung von Neigung und Knoten aus den beobachteten geocentrischen Breiten.

Mit den im vorigen Abschnitt gefundenen verbesserten Elementen und den unverbesserten für Neigung und Knoten, wurden für die Beobachtungszeiten die heliocentrischen Breiten berechnet, dann die beobachteten geocentrischen, mit den durch die Elemente gegebenen Mercur-Abständen von Sonne und Erde auf heliocentrische reducirt, und so aus der Vergleichung beyder hundert Bedingungs-Gleichungen mit den beyden unbekannten Gröſſen $\delta\Omega$, δi erhalten. Wir setzen die einzelnen Gleichungen nicht her, sondern begnügen uns, die daraus durch die Methode der kleinsten Quadrate erhaltenen Endausdrücke beyzubringen:

$$+ 154,440 + 76,020 \delta i - 6,6043 \delta \Omega = 0;$$

$$- 122,140 - 6,6043 \delta i + 1,7588 \delta \Omega = 0;$$

$$\delta i = + 5,9; \delta \Omega = + 91,74$$

Aus den vorher discutirten Durchgängen folgte

$$\delta i = - 10,3; \delta \Omega = + 64,17.$$

Für die Neigung scheint mir das aus hundert geocentrischen Breiten hergeleitete Resultat bey weitem den Vorzug zu verdienen, und ich behalte daher $\delta i = + 5,9$ unverändert bey.

Die für $\delta\Omega$ gefundenen Werthe halte ich beyde für gleich zuverlässig, und nehme daher

$$\delta \Omega = \frac{91,74 + 64,17}{2} = + 77,96$$

Ohne Correction beträgt die Summe der Quadrate der Fehler in diesen hundert Bedingungs-Gleichungen

chungen 7706, mit Einführung der Werthe von di , $d\Omega$, 3466.

Auch für $d.nt$ sind zwey Bestimmungen gefunden worden:

aus den Durchgängen $dnt = + 0."0369$

aus den 117 Bedingungs Gl. $= + 0, 106403.$

Die Differenz beyder Bestimmungen, die in der hundertjährigen Bewegung nur 7" ausmacht, ist sehr unbedeutend; allein da der letztere Werth sowohl auf den Elementen der erstern Bestimmung, als noch außerdem auf hundert geocentrischen Längen beruht, so habe ich mich dadurch veranlaßt gefunden, diesem den Vorzug zu geben.

Werden nun die in dem vorhergehenden successive gefundenen Werthe von dN , dnt , de , dP , $d\Omega$, di , an den vorläufig angenommenen Elementen angebracht, so sind die verbesserten Elemente der vom Mercur um die Sonne beschriebenen elliptischen Bahn folgende:

Epoche 1750 Seeberger Merid.	8^S	13°	$5'$	$17."1$
Aphelium 1750	8	13	33	24, 3
Knoten 1750	1	15	22	1, 0
Neigung 1800	7	0	5, 9	
Excentricität 1800	0, 2056163			
halbe grofse Axe	0, 3870938			
mittlere jährliche Bewegung .	1^S	23°	$43'$	$3."613$
Bewegung in 100 Jul. Jahren .	2	14	4	35, 64
100jährige Aenderung des Aphel.	$= 1^\circ$	$33'$	$22, 9$	
- - - - Knoten	$= 1$	10	15, 1	
- - - der Excentric.	$= + 0, 791$			
- - - Neigung	$= + 18,$	380		

Hieraus

Hieraus ferner

Mittelpuncts - Gleichung für 1800; t = Zahl der seit 1800 verfloßenen Jahre:

$$\begin{aligned}
 = & - (84379,23 + 0,0157 t) \sin (\lambda - P) \\
 & + (10733,16 + 0,0036 t) \sin 2(\lambda - P) \\
 & - (1892,19 + 0,0008 t) \sin 3(\lambda - P) \\
 & + (381,17 + 0,0002 t) \sin 4(\lambda - P) \\
 & - 82,57 \sin 5(\lambda - P) \\
 & + 18,72 \sin 6(\lambda - P) \\
 & - 4,39 \sin 7(\lambda - P) \\
 & + 1,04 \sin 8(\lambda - P) \\
 & - 0,25 \sin 9(\lambda - P)
 \end{aligned}$$

Radius Vector

$$\begin{aligned}
 = & + (0,3952818 + 0,000000003 t) \\
 & + (0,0783361 + 0,000000025 t) \cos (\lambda - P) \\
 & - (0,0079541 + 0,000000004 t) \cos 2(\lambda - P) \\
 & + (0,0012126 + 0,000000001 t) \cos 3(\lambda - P) \\
 & - (0,0002191 + 0 -) \cos 4(\lambda + P) \\
 & + 0,0000435 \cos 5(\lambda - P) \\
 & - 0,0000092 \cos 6(\lambda - P) \\
 & + 0,0000021 \cos 7(\lambda - P) \\
 & - 0,0000005 \cos 8(\lambda - P)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sin \text{ lat. hel. } = & \sin 7^{\circ} 0' 5,9 \sin (\lambda' - \Omega) \\
 & + t 0,184 \cos 7^{\circ} 0' 5,9 \sin (\lambda' - \Omega)
 \end{aligned}$$

Reduction auf die Ecliptik

$$= - 771,93 \sin 2(\lambda' - \Omega) + 1,43 \sin 4(\lambda' - \Omega)$$

λ, λ' bedeutet hier mittlere und wahre heliocentrische Länge in der Bahn.

Durch diese Ausdrücke wird der elliptische Ort des Planeten vollkommen bestimmt, und es müssen
nur

nur noch die planetarischen Störungen angebracht werden, um dessen wahren Ort am Himmel zu bekommen.

Wird in den von *La Place* gegebenen Störungsgleichungen meine verbesserte Venusmasse substituirt, und dann die vorherigen Ausdrücke für den elliptischen Ort mit den Störungen verbunden, so folgt wahre Mercurslänge in der Bahn

$= \lambda$ — Aequatio centri

$$\text{Arg. II} \quad + \begin{cases} -0,72 \sin (\varphi - \varphi) \\ +1,58 \sin 2(\varphi - \varphi) \\ +0,14 \sin 3(\varphi - \varphi) \end{cases}$$

$$\text{Arg. III} \quad + \begin{cases} -0,57 \sin (\varphi - \varphi) \\ +0,12 \sin 2(\varphi - \varphi) \end{cases}$$

$$\text{Arg. IV.} \quad + 1,17 \sin (\varphi - 2\varphi) + 4,19 \cos (\varphi - 2\varphi)$$

$$\text{Arg. V.} \quad + 0,55 \sin (2\varphi - 3\varphi) + 1,67 \cos (2\varphi - 3\varphi)$$

$$\text{Arg. VI.} \quad - 0,50 \sin \varphi - 0,12 \cos \varphi$$

$$\text{Arg. VII.} \quad - 0,88 \sin (\varphi - 2\varphi) + 3,16 \cos (\varphi - 2\varphi)$$

$$\text{Arg. VIII.} \quad + 1,33 \sin (3\varphi - 5\varphi) - 1,25 \cos (3\varphi - 5\varphi)$$

$$\text{Arg. IX.} \quad + 0,49 \sin (3\varphi - \varphi) + 0,42 \cos (3\varphi - \varphi)$$

$$\text{Arg. X.} \quad - 8,05 \sin (2\varphi - 5\varphi) - 4,69 \cos (2\varphi - 5\varphi)$$

$$\text{Arg. XI.} \quad - 0,65 \sin (\varphi - 4\delta) - 0,24 \cos (\varphi - 4\delta)$$

Folgende kleinere, durch die Theorie mit gegebene Gleichungen, sind in meine Tafeln nicht mit aufgenommen worden, da dadurch ihr Volumen und die Mühe der Rechnung nur unnöthig vermehrt worden wäre

$$+ 0,21 \sin (\delta - \varphi) - 0,16 \sin 2 (\delta - \varphi)$$

$$+ 0,09 \sin \varphi - 0,31 \cos \varphi$$

$$- 0,09 \sin (3\varphi - 4\varphi) - 0,31 \cos (3\varphi - 4\varphi)$$

$$- 0,05 \sin (2\varphi - \varphi) + 0,09 \cos (2\varphi - \varphi)$$

$$+ 0,12$$

$$\begin{aligned}
 &+ 0,12 \sin(3\varphi - 2\varphi) - 0,41 \cos(3\varphi - 2\varphi) \\
 &+ 0,03 \sin \delta - 0,09 \cos \delta \\
 &+ 0,12 \sin(\varphi - 2\delta) + 0,44 \cos(\varphi - 2\delta) \\
 &- 0,06 \sin(2\varphi - 3\delta) - 0,23 \cos(2\varphi - 3\delta) \\
 &- 0,08 \cos h \\
 &- 0,11 \sin(\varphi - 2h) - 0,38 \cos(\varphi - 2h) \\
 &- 0,19 \sin(2\varphi - 4\delta) + 0,18 \cos(2\varphi - 4\delta)
 \end{aligned}$$

Störungen des Radius Vector =

$$\begin{aligned}
 \text{Arg. II.} &+ \begin{cases} + 0,0000000405 \\ - 0,0000004415 \cos.(\varphi - \varphi) \\ + 0,000001677 \cos.2(\varphi - \varphi) \\ + 0,0000001835 \cos.3(\varphi - \varphi) \end{cases} \\
 \text{Arg. V.} &+ \begin{cases} - 0,0000003926 \cos(2\varphi - 3\varphi) \\ + 0,000001400 \sin(2\varphi - 3\varphi) \end{cases} \\
 \text{Arg. VII.} &+ \begin{cases} - 0,0000008000 \cos(\varphi - 2\varphi) \\ + 0,0000028520 \sin(\varphi - 2\varphi) \end{cases} \\
 \text{Arg. VIII.} &+ \begin{cases} + 0,000001267 \cos(3\varphi - 5\varphi) \\ + 0,000001180 \sin(3\varphi - 5\varphi) \end{cases}
 \end{aligned}$$

Störungen der Breite können als ganz unbedeutend vernachlässigt werden.

Auf diesen Formeln beruhen meine neuen Mercur - Tafeln, von denen ich mit Grund hoffen kann, daß sie für einige der nächsten Jahrzehende gewiß immer sehr befriedigend mit dem Himmel übereinstimmen werden.

Die Vergleichung der zu den Bedingungs - Gleichungen gebrauchten hundert geocentrischen Orten mit meinen neuen Elementen gibt folgendes Resultat:

Jahr u. Tag	Mittl. Zeit auf Seeberg	Wahr. geoc. beob. Länge ♀	Corr. d.Ele- ment.	Wahr. geoc. beob. Breite ♀	Corr. d.Ele- ment.
	U A	° "	— "	+ ° "	— "
1775 Feb. 27	1 51 43,1	353 56 24,7	—4,2	+0 8 29,3	—1,3
— Dec. 11	23 12 40,9	240 10 4,2	—3,0	+1 45 23,6	—1,7
1776 Aug. 1	23 28 26,1	111 26 39,3	—0,5	—1 15 56,1	—2,0
— — 6	23 37 20,4	118 2 28,9	+1,3	—1 3 3,8	+0,4
1777 Mai 25	2 18 25,4	87 35 27,7	—1,9	+1 59 43,6	+5,1
— Nov. 5	23 19 29,6	206 12 44,4	+5,1	+2 12 4,4	+2,0
1778 Aug 18	2 6 58,1	166 53 0,8	+2,3	+0 10 37,3	+4,9
— — 20	2 9 41,5	169 52 24,0	+1,0	—0 5 39,1	—0,8
— — 24	2 13 54,3	175 33 17,1	+2,6	—0 39 49,0	—2,0
1779 Feb. 5	23 10 43,9	191 45 11,4	+4,4	+0 54 5,8	+0,7
1779 Dec. 3	1 49 51,3	269 2 53,1	—1,6	—2 21 24,1	—1,8
1780 Mai 28	23 9 18,6	45 46 51,1	+1,6	—2 46 59,7	+0,6
— Jul. 11	2 10 42,7	129 8 10,0	+2,2	+1 30 57,4	—1,0
— — 25	2 33 41,6	149 33 16,0	+6,0	—0 19 22,8	+0,9
— — 29	2 34 8,0	154 5 39,0	+7,5	—1 1 53,0	—1,1
1782 Jun. 14	2 21 13,0	105 56 54,6	+5,2	+1 49 20,3	+1,4
— — 22	2 34 6,2	116 27 6,4	+3,5	+0 52 5,1	+0,6
— — 23	2 34 39,4	117 33 1,8	—0,5	+0 42 13,5	+1,2
— — 24	2 34 57,4	118 35 53,9	+4,0	+0 31 49,3	—1,3
— Oct. 24	1 58 40,0	235 6 44,5	+5,9	—2 57 50,6	—1,3
1783 Jul. 26	23 26 7,7	104 42 14,5	+5,6	—1 20 15,1	—2,4
1784 Mai 18	2 13 38,9	80 32 34,2	+5,2	+2 11 24,0	+3,8
— — 19	2 14 0,1	81 30 37,7	+6,2	+2 6 0,8	+1,7
— Sept 19	2 7 36,0	203 9 3,0	+3,1	—3 6 41,0	—4,6
1785 Jan. 10	2 9 45,2	309 38 5,9	—2,5	—0 15 32,9	—3,0
— Jun. 21	23 11 12,1	69 17 40,9	+0,2	—2 47 49,8	—0,3
— Aug 28	2 20 25,8	182 38 18,0	+1,5	—2 13 52,2	—2,2
— Dec. 29	2 0 18,4	295 44 2,8	—3,3	+0 1 21,1	+3,6
1786 Apr. 12	1 55 35,1	42 21 35,6	—0,1	+2 41 12,0	—1,4
— Sept 20	23 31 58,4	161 2 34,3	—4,4	+0 32 16,1	—1,1
— — 26	23 33 35,8	167 24 25,0	+1,0	+1 34 59,6	—2,0
1787 Mrz 21	1 51 26,1	18 3 38,2	+2,2	+1 28 27,1	+6,8
— Mai 18	23 4 57,4	33 40 14,3	+1,1	—3 7 13,8	+3,1
— Aug. 1	2 24 26,0	154 33 37,4	+3,0	—2 40 25,2	—4,5
1788 Mrz 11	1 54 59,3	9 37 14,2	—1,2	—2 28 6,4	+3,0

XII. Ueber die Elemente der Mercursbahn. 121

Jahr u. Tag	Mittl. Zeit auf Seeberg	Wahr. beob. geocentr. Länge ♀	Corr. d Ele- ment.	Wahr. beob. geocentr. Breite ♀	Corr. d Ele- ment.
	U				
1788 Jul. 4	2 37 14,3	129 21 16,9	—0,7	+0° 0 18,8	+1,2
1789 Feb. 20	2 2 24,4	350 29 24,0	—0,7	+1 17 8,6	+1,0
— Aug. 5	23 30 30,7	115 28 42,2	—5,5	—0 51 3,7	—1,5
1791 Jun. 26	22 21 19,7	74 17 57,0	—6,6	—3 31 9,9	+4,2
— — 27	22 20 40,3	75 5 59,9	+3,6	—3 21 15,4	—3,4
— — 28	22 20 20,2	75 58 55,9	—3,6	—3 10 51,6	—3,0
— — 28	23 13 48,1	76 0 50,0	—3,4	—3 10 35,2	+0,4
— — 29	22 20 21,0	76 55 48,2	+8,3	—3 0 10,4	+2,1
— — 30	22 20 41,8	77 57 24,8	—4,0	—2 48 40,4	—5,4
— Sept. 4	1 22 23,3	88 13 48,3	+2,8	—1 55 12,8	—2,2
— — 5	1 22 20,0	89 20 49,0	+2,2	—2 3 55,0	—1,1
1792 Aug 13	1 31 20,0	167 25 40,0	+0,5	—0 50 7,5	—3,3
— — 14	1 31 44,3	168 39 58,2	+1,7	—0 59 53,0	+2,9
— — 16	1 32 5,5	171 2 32,2	—1,2	—1 19 22,5	—2,6
— — 17	1 32 4,1	172 10 32,5	+2,6	—1 29 21,1	+2,1
— — 18	1 31 53,0	173 16 16,7	+6,6	—1 39 14,0	+0,5
— — 20	1 31 5,7	175 20 44,7	+3,0	—1 59 10,1	+3,0
— — 21	1 30 27,5	176 19 16,3	—7,3	—2 9 46,3	+4,2
— — 23	1 29 1,0	178 7 15,2	+0,8	—2 28 40,0	—1,3
— — 24	1 27 31,0	178 56 59,7	+3,0	—2 38 17,0	—3,6
— — 25	1 26 9,9	179 43 20,2	+3,3	—2 47 53,8	+1,1
— — 26	1 24 35,7	180 26 11,6	+2,6	—2 57 7,4	—3,8
— Dec 11	1 9 38,1	279 53 46,4	—0,9	—2 6 59,1	—7,9
— — 15	1 14 1,9	284 32 24,5	—4,5	—1 42 33,1	—1,5
1793 Apr. 7	1 53 19,3	37 10 46,7	+1,3	+2 52 27,1	+4,0
— Jul. 19	1 28 2,0	139 56 9,0	—5,5	+0 54 57,0	+1,2
— — 23	1 35 15,9	145 55 55,1	—4,8	+0 22 11,7	—1,0
— — 28	1 39 32,9	152 17 4,7	—0,3	—0 25 26,2	+1,2
— Aug. 2	1 32 49,3	157 54 4,4	—4,2	—1 19 13,7	+1,0
— — 2	1 39 22,3	157 51 43,8	—7,3	—1 18 41,1	—4,7
— — 3	1 39 50,4	158 50 51,0	—2,1	—1 29 44,8	—3,3
— — 4	1 38 8,0	159 47 11,3	—1,4	—1 41 5,6	—0,5
— — 5	1 37 13,0	160 40 32,0	—7,0	—1 52 14,6	—3,4
— — 6	1 36 7,0	161 30 53,2	—0,7	—2 3 37,9	—0,5
1794 Mrz 19	1 55 23,5	17 40 32,4	—1,1	+2 18 24,1	+0,1

Jahr u. Tag	Mittl. Zeit auf Seeberg	Wahr beob. geocentr. Länge φ	Corr. dEle- ment.	Wahr. beob. geocentr. Breite φ	Corr. dEle- ment.
	U				
1794 Jul. 22	2 30 26,8	145 48 0,8	-1,6	-1 56 12,7	-3,4
- Aug. 27	23 34 35,2	137 34 30,7	-4,5	-0 46 57,7	+0,7
- Nov. 9	1 58 26,2	249 52 51,8	+5,2	-2 41 1,3	-1,4
1795 Aug. 12	23 31 23,2	121 58 41,1	-4,1	-1 13 27,7	+8,0
- Oct. 22	1 58 8,1	232 53 47,7	+0,9	-2 46 16,0	+0,6
- - 23	1 58 34,0	233 57 53,1	+4,2	-2 49 16,2	+1,2
1796 Jul. 29	23 28 32,4	108 47 38,8	+3,6	-1 5 51,7	+0,2
- Oct. 10	1 59 55,8	222 34 10,9	+0,2	-3 9 4,6	-0,4
1797 Mai 23	2 16 3,8	85 24 22,7	+6,3	+1 52 59,6	+4,0
- Jul. 13	23 22 25,0	92 27 36,2	+2,5	-1 40 46,8	+0,1
- Sept. 21	2 7 27,8	205 0 16,0	-0,3	-3 1 46,7	+1,3
1798 Feb. 19	23 11 14,5	305 20 54,7	-7,3	+0 9 27,4	-2,1
- - 24	23 14 3,6	310 40 3,0	-5,2	-0 38 24,8	-4,6
- Aug. 30	2 19 26,5	184 19 4,6	+2,4	-2 8 46,4	-1,5
- - 31	2 18 57,2	185 19 22,1	+7,5	-2 17 51,9	-1,3
1801 Apr. 27	23 3 27,6	10 48 13,0	-6,7	-2 50 21,4	-3,9
- Aug. 22	23 33 7,6	131 33 47,4	-0,3	-0 47 1,0	-2,6
- - 24	23 33 22,3	133 26 10,6	-0,3	-0 15 10,4	-3,2
1802 Apr. 12	23 6 42,5	355 30 12,0	-3,9	-2 24 45,8	+4,8
- Jun. 21	2 33 16,8	114 34 58,9	+4,3	+0 37 35,8	-0,2
- Aug. 7	23 29 40,6	116 8 45,6	-1,3	-1 12 35,3	-3,0
- Oct. 15	1 59 23,9	225 46 55,0	-2,4	-2 44 19,7	-0,8
- - 16	1 59 42,5	226 51 5,5	-2,4	-2 48 27,8	+0,1
1803 Feb. 7	1 6 33,8	336 1 58,7	-5,4	+0 32 23,2	+2,0
- Jun. 4	1 23 25,4	96 30 15,7	+2,9	-1 23 38,0	+1,0
1804 Sept. 12	2 12 48,4	196 7 31,1	-2,1	-2 40 36,0	-3,1
1805 Oct. 3	23 28 39,3	170 5 39,2	+0,2	+1 7 17,3	-4,2
- - 4	23 27 52,4	173 52 24,5	-1,3	+1 18 23,2	-1,6
- - 5	23 27 32,8	174 47 16,0	-2,4	+1 28 3,2	-2,7
1806 Mai 27	23 3 39,3	41 48 23,3	-0,1	-3 27 34,0	-2,1

Um die Zahl von hundert Beobachtungen voll-
 zählig zu erhalten, war ich genöthigt, deren 103 in
 Rechnung zu nehmen, indem drey als fehlerhaft ver-
 worfen werden mußten. Mit einigen Schwierig-
 kei-

keiten war die genaue Reduction der in diesem Jahrhundert zu Greenwich beobachteten Zenith-Distanzen verbunden, da für die ganze Epoche der Maskelynschen Beobachtungen eine constante Annahme des Collimationsfehlers für den ganzen Bogen des Quadranten keinesweges zulässig war. Wir haben einige Resultate über diesen interessanten Gegenstand gesammelt, die wir zu einer andern Zeit in diesen Blättern mitzutheilen gedenken.

Da das Verfahren, die Güte meiner neuen Mercur-Elemente aus der Uebereinstimmung mit Beobachtungen beweisen zu wollen, die erst zu deren Bestimmung gedient hatten, in gewisser Hinsicht als logischer Kreis gelten könnte, so füge ich noch die Vergleichung einer andern Reihe von Beobachtungen bey, die zu Paris, Mailand und von mir selbst auf der hiesigen Sternwarte gemacht wurden.

Jahr u. Tag	Mittl. Seeberger Zeit	Beob. geoc. Mercur- Länge *)	Verb. der Elem.	Beob. geoc. Mercur- Breite	Verb. der Elem.
	U	° ' "	"	° ' "	"
1804 Sept. 9	2 4 43,4	193 6 51,0	-5,7	-2 16 26,8	-1,3
- - 13	2 2 42,4	197 1 53,6	+3,7	-2 48 18,1	+1,7
- - 14	2 1 48,1	197 53 42,2	+3,8	-2 55 44,2	+4,2
1805 Apr. 9	1 10 36,8	28 46 34,3	+5,3	+0 27 44,9	-1,4
- - 10	1 14 10,1	30 48 35,5	+6,5	+0 38 59,3	-1,7
- - 12	1 21 4,9	34 47 7,9	-1,6	+1 1 19,2	-0,3
- - 13	1 24 24,8	36 43 10,3	+0,7	+1 12 7,7	-3,3
- Aug. 2	1 53 41,1	148 8 53,6	+1,5	+1 6 42,0	+3,4
- - 3	1 55 58,2	149 48 31,0	-0,2	+1 0 20,9	+3,9
- - 11	2 9 19,6	162 7 1,3	-3,1	-0 1 16,6	-3,1
- - 26	2 12 16,9	179 58 32,1	+2,8	-2 23 20,8	-1,2
- Oct. 12	23 24 52,0	183 54 4,0	+5,5	+1 59 57,0	+2,2
- - 18	23 36 45,9	193 38 41,6	+5,0	+1 50 41,8	+2,2
1807 Mrz 22	1 45 50,6	19 3 52,9	-0,1	+2 12 49,0	-0,7
- - 24	1 44 50,7	21 30 21,7	+5,9	+2 33 54,2	+2,8

*) Alle Längen sind wahre vom mittl. Aequinoctio gerechnet;

Jahr u. Tag	Mittl. Seeberger Zeit	Beob. geoc. Mercurs- Länge	Verb. der Elem.	Beob. geoc. Mercurs- Breite	Verf. der Elem.
	U				
1807 Mrz 26	1 42 13,2	23 1 0,7	+3,0	+2 51 42,0	+0,1
- Mai 21	23 5 9,5	38 33 37,2	+4,7	-2 34 41,0	-5,0
- - 22	23 7 12,5	40 8 36,4	+2,6	-2 27 57,8	-4,6
- - 23	23 9 26,2	41 46 2,4	+4,9	-2 20 43,3	-5,1
- - 25	23 14 26,3	45 8 1,4	-1,0	-2 4 52,5	-3,3
- Jun. 24	1 32 1,7	104 51 59,9	-4,1	+1 54 39,2	-2,8
- - 29	1 52 54,9	114 16 21,6	-5,3	+1 51 50,7	-1,4
Jul. 9	2 19 56,8	130 25 13,7	-6,1	+1 0 15,0	+3,4
- - 10	2 21 34,7	131 50 8,2	-5,4	+0 52 18,6	+6,6
- - 11	2 23 1,3	133 12 51,6	-1,0	+0 43 50,6	+4,0
- - 12	2 24 16,1	134 33 12,0	-3,3	+0 34 57,9	+2,1
- - 13	2 25 19,1	135 51 8,3	+4,3	+0 25 39,0	-0,6
- - 17	2 27 37,1	140 38 54,9	-2,3	-0 14 55,5	-5,7
1808 Mai 1	22 30 26,7	18 5 7,7	+4,7	-2 47 36,6	+4,3
- - 2	22 32 0,5	19 35 19,1	-0,6
- - 3	22 33 43,1	21 7 52,2	+3,5
- - 4	22 35 31,8	22 42 1,3	-3,4	-2 37 56,9	+0,9
- - 5	22 37 28,6	24 18 40,0	+3,5	-2 32 37,3	-0,1
- - 6	22 39 34,3	25 56 48,4	+2,9	-2 28 42,8	-5,1
- - 7	22 41 47,3	27 37 1,5	+3,7	-2 23 28,1	+0,9
1808 Mai 9	22 47 39,7	31 3 59,2	+5,8	-2 11 9,4	-4,3
1809 Oct. 4	1 17 16,5	215 13 14,7	+4,7	-2 22 53,4	-3,8
1812 Aug. 3	1 38 27,2	154 36 10,3	-3,3	+0 17 8,5	+1,6
- - 19	1 41 47,3	173 33 45,7	-0,8
- - 24	1 33 59,9	177 9 45,6	-0,7

Die Uebereinstimmung ist durchgängig so schön, daß für die nächsten Jahrzehende eine wesentliche Verbesserung meiner neuen Mercurs-Elemente wohl nicht wahrscheinlich ist.

XIII.

Die Attraction
homogener elliptischer Sphäroiden
nach einer neuen Methode
entwickelt

von

Herrn Professor Ritter *Gauß*.

(Fortsetz. und Beschluß zu S. 57.)

I I.

Von den vorausgeschickten generellen Untersuchungen gehen wir nun auf die Betrachtung elliptischer Sphäroiden über, die jene veranlaßt haben. Werden die Abscissen vom Mittelpunkt des Körpers aus gerechnet, und die Halb-Axen mit A , B , C , bezeichnet, so ist die Gleichung der Oberfläche

$$\frac{xx}{AA} + \frac{yy}{BB} + \frac{zz}{CC} = 1$$

Nun sey, $W = \frac{xx}{AA} + \frac{yy}{BB} + \frac{zz}{CC} - 1$,

so folgt, daß W für alle innerhalb des Körpers gelegene Punkte negative, für alle äußere Punkte, positive Werthe erhält. Es ist ferner

$$T = \frac{2x}{AA}, U = \frac{2y}{BB}, V = \frac{2z}{CC}$$

und

und sey

$$r \left(\frac{xx}{A^2} + \frac{yy}{B^2} + \frac{zz}{C^2} \right) = \psi$$

so ist

$$\cos QX = \frac{x}{\psi AA}; \cos QY = \frac{y}{\psi BB}; \cos QZ = \frac{z}{\psi CC};$$

$$\cos QM = \frac{1}{\psi r} \left(\frac{(a-x)x}{AA} + \frac{(b-y)y}{BB} + \frac{(c-z)z}{CC} \right)$$

12.

Wir führen nun zwey unbestimmte Größen, p, q , ein, mittelst deren folgende Relationen statt finden;

$$x = A \cos p$$

$$y = B \sin p \cos q$$

$$z = C \sin p \sin q$$

man sieht leicht, daß die ganze sphäroidische Oberfläche umfaßt wird, wenn p von $0-180^\circ$ und q von $0-360^\circ$ ausgedehnt wird. Ferner ist

$$\lambda = -A \sin p, \lambda' = 0;$$

$$\mu = B \cos p \cos q, \mu' = -B \sin p \sin q,$$

$$\gamma = C \cos p \sin q, \gamma' = C \sin p \cos q$$

$$\mu\nu' - \nu\mu' = BC \cos p \sin p = ABC \sin p. \frac{x}{AA}$$

$$\nu\lambda' - \lambda\nu' = AC \sin p^2 \cos q = ABC \sin p. \frac{y}{BB};$$

$$\lambda\mu' - \mu\lambda' = AB \sin p^2 \sin q = ABC \sin p. \frac{z}{CC}$$

Da $\sin p$ in den hier bestimmten Gränzen durchgängig einen positiven Werth hat, so muß angenommen werden,

$$ds = dp dq ABC \psi \sin p,$$

Wer-

Werden diese Formeln auf das zweyte Theorem angewandt, so folgt das Volumen des Körpers oder (Densität = 1) dessen Masse

$$= \iint dp dq. A B C \cos p^2 \sin p$$

oder zuerst nach q integrirt

$$= 2\pi \int dp. ABC \cos p^2 \sin p = \frac{1}{2}\pi ABC \int dp (\sin p + \sin 3p)$$

ein Integral, was von $p = 0$, bis $p = 180^\circ$ auszu-
dehnen ist, und dann bekanntlich $\frac{4}{3}\pi. ABC$ gibt.

13.

Um die Attraction des Sphäroids auf irgend einen Punct für den Fall zu bestimmen, daß die jedes Elementes dem Quadrat des Abstandes vom angezogenen Punct proportional ist, hat man $fr = \frac{1}{rr}$;

$Fr = -\frac{1}{r}$; $\phi r = r$. Sey die Attraction des ganzen Sphäroids in einer der Coordinaten-Axe x parallelen und entgegengesetzten Richtung = X , und $X = ABC\xi$, so wird vermöge des dritten Theorems seyn,

$$X = \iint dp dq \frac{BC \propto \sin p}{rA} = \iint dp dq \frac{BC \cos p \sin p}{r}$$

folglich

$$[1] \quad \xi = \iint \frac{dp dq \cos p \sin p}{Ar}$$

ferner vermöge des sechsten Theorems

$$[2] \quad \xi = -\iint \frac{dp dq \sin p}{r^3} (a-x) \left(\frac{(a-x)x}{AA} + \frac{(b-y)y}{BB} + \frac{(c-z)z}{CC} \right)$$

und

und aus dem vierten Theorem

$$[3] \iint \frac{dp \cdot dq \cdot \sin p}{r^3} \left(\frac{(a-x)x}{AA} + \frac{(b-y)y}{BB} + \frac{(c-z)z}{CC} \right) = 0;$$

$$\text{oder} = -\frac{4\pi}{ABC};$$

je nachdem M entweder inner- oder auſſerhalb des Körpers liegt.

Die Gröſſen A, B, C , ſollen nun als die beſondern Werthe dreier veränderlichen Gröſſen α, β, γ angeſehen werden, deren Natur ſo beſchaffen iſt, daſs $\alpha\alpha - \beta\beta$, $\alpha\alpha - \gamma\gamma$ conſtant ſind; ξ kann nun als eine Function der variabeln α, β, γ , oder vielmehr einer von ihnen angeſehen werden, wovon wir die gleichzeitigen Aenderungen von $\xi, \alpha, \beta, \gamma$ mit der Charakteriſtik δ bezeichnen wollen. Aus der Gleichung [1] ergibt ſich leicht, daſs bey unendlich anwachſenden $\alpha, \beta, \gamma, \xi$ über alle Gränzen abnimmt, indem dann offenbar der kleinſte Werth von r unendlich groſs wird. Für $\alpha = \infty$ wird daher $\xi = 0$. Wird die Gleichung [1] ſo dargeſtellt

$$\alpha \xi = \iint \frac{dp \cdot dq \cdot \cos p \sin p}{r}$$

und nach der Charakteriſtik δ differentiirt, ſo folgt

$$\alpha \delta \xi + \xi \delta \alpha = - \iint \frac{dp \cdot dq \cdot \cos p \sin p \delta r}{r r}$$

allein es iſt

$$\begin{aligned} r \delta r &= - (a-x) \delta x - (b-y) \delta y - (c-z) \delta z \\ &= - (a-x) \cos p \delta \alpha - (b-y) \sin p \cos q \delta \beta - (c-z) \sin p \sin q \delta \gamma \\ &= - (a-x) \cdot x \frac{\delta \alpha}{\alpha} - (b-y) y \frac{\delta \beta}{\beta} - (c-z) z \frac{\delta \gamma}{\gamma}; \\ &= - \alpha \delta \alpha \left(\frac{(a-x)x}{\alpha \alpha} + \frac{(b-y)y}{\beta \beta} + \frac{(c-z)z}{\gamma \gamma} \right) \\ & \quad (\text{weil } \alpha \delta \alpha - \beta \delta \beta = 0, \alpha \delta \alpha - \gamma \delta \gamma = 0;); \end{aligned}$$

hier.

hiernach

$$\alpha \delta \xi + \xi \delta \alpha = \delta \alpha \iint \frac{dp dq x \sin p}{r^3} \left(\frac{(a-x)x}{\alpha \alpha} + \frac{(b-y)y}{\beta \beta} + \frac{(c-z)z}{\gamma \gamma} \right)$$

Wird hiervon, nach Verwandlung von A, B, C , in α, β, γ die mit $\delta \alpha$ multiplicirte Gleichung [2] abgezogen, so wird

$$\alpha \delta \xi = \delta \alpha \iint \frac{dp dq a \sin p}{r^3} \left(\frac{(a-x)x}{\alpha \alpha} + \frac{(b-y)y}{\beta \beta} + \frac{(c-z)z}{\gamma \gamma} \right)$$

Der zur rechten befindliche Theil dieser Gleichung wird vermöge [3] entweder $= 0$ oder $= -\frac{4\pi\alpha\delta\alpha}{\alpha\beta\gamma}$, je nachdem M auſſer oder innerhalb

dem Körper liegt; im erſten Fall wird

[4] $\delta \xi = 0$; im letztern aber

$$[5] \delta \xi = -\frac{4\pi\alpha\delta\alpha}{\alpha\beta\gamma};$$

Die Gleichung [4] zeigt ſogleich, daſs ξ conſtant, oder daſs die Attraction X in allen Ellipſoiden, wo $\alpha\alpha - \beta\beta$, $\alpha\alpha - \gamma\gamma$, conſtant ſind, der Maſſe proportional iſt, d. h. in ſolchen, deren drey Haupt-Durchſchnitte, ſo lange der angezogene Punct auſſerhalb des Sphäroids liegt, aus denſelben Brennpuncten beſchriebene Ellipſen ſind. Da dieſes Reſultat auch für die kleinſte Entfernung der ſphäroidiſchen Oberfläche vom angezogenen Punct, ſtreng richtig iſt, ſo läſſet es ſich auch offenbar auf das Sphäroid ausdehnen, deſſen Oberfläche den angezogenen Punct berührt.

Hiernach wird die Aufgabe über Beſtimmung der Attraction eines Sphäroids auf einen äufſern Punct auf zwey andere reducirt; erſtens Beſtimmung der

der Dimensionen eines andern den angezogenen Punct berührenden und aus denselben Brennpuncten wie das gegebene, beschriebenen Sphäroids; zwey- tens, Bestimmung der Attraction des Sphäroids auf einen in seiner Oberfläche gelegenen Punct. Die erste Aufgabe hängt von der Auflösung einer cubischen Gleichung ab, die, wie leicht zu erweisen ist, allemal eine einzige reelle Wurzel hat, und bey der es überflüssig seyn würde, sich länger aufhalten zu wollen. Um aber zu Auflösung der andern Aufgabe zu gelangen, wollen wir den Fall untersuchen, wo der angezogene Punct innerhalb des Körpers liegt.

Es ist

$$\xi\xi = \alpha\alpha + BB - AA; \gamma\gamma = \alpha\alpha + CC - AA;$$

und sey $\frac{A}{\alpha} = t$; werden diese Werthe in der Gleichung [5] substituirt, so folgt,

$$\delta\xi = \frac{4\alpha\pi tt\delta t}{A^3 \sqrt{\left(1 - \left(1 - \frac{BB}{AA}\right)tt\right)\left(1 - \left(1 - \frac{CC}{AA}\right)tt\right)}}$$

oder wenn die Charakteristik d wieder hergestellt und integrirt wird

$$\xi = \frac{4\alpha\pi}{A^3} \int \frac{tt\,dt}{\sqrt{\left(1 - \left(1 - \frac{BB}{AA}\right)tt\right)\left(1 - \left(1 - \frac{CC}{AA}\right)tt\right)}}$$

dies Integral ist so zu nehmen, daß es für $t = 0$ verschwindet; für ein bestimmtes Sphäroid, dessen Halb-Axen A, B, C , muß es bis $t = 1$, ausgedehnt werden. Hiernach erhalten wir

$$[6] X = \frac{4a\pi BC}{AA} \int \frac{tt \, dt}{\sqrt{\left(1 - \left(1 - \frac{BB}{AA}\right)tt\right) \left(1 - \left(1 - \frac{CC}{AA}\right)tt\right)}}$$

wo von $t = 0$, bis $t = 1$ zu integrieren ist. Daraus werden die den Coordinaten-Axen y, z , parallelen Attractionen leicht erhalten, indem dazu nur a, A , mit b, B , oder c, C , vertauscht zu werden braucht.

Aus diesem Ausdruck folgt also die Attraction aller innerhalb des Sphäroids gelegener Punkte, und da der Ausdruck für jede der Oberfläche auch noch so nahe Punkte streng genau ist, so gilt er auch für die in der Oberfläche selbst gelegenen; das Problem ist daher dadurch vollständig aufgelöst; da die Attraction äußerer Punkte auf die in der Oberfläche reducirt worden ist.

Außerdem ergibt sich noch aus Gleichung [6] daß für innere Punkte, die Attraction aller ähnlichen und ähnlich gelegener Sphäroiden ganz dieselbe ist. Denkt man sich ein solches Sphäroid in mehrere Schalen zerlegt, deren Oberflächen, der innern und äußern sphäroidischen Oberfläche ähnlich und ähnlich gelegen sind, so folgt offenbar, daß alle den angezogenen Punkt äußerlich umgebenden Lagen, keinen Einfluß auf diesen haben, und daß bloß die Attraction des innern Kerns, in dessen Oberfläche der Punkt gelegen ist, wirksam bleibt.

14.

Die Art selbst, wie die Integration der Gleichung [6] zu erhalten ist, braucht hier nicht weitläufig abgehandelt zu werden. Wenn alle drey Axen A, B, C ,

B , C , ungleich sind, so hängt diese bekanntlich von transcendenten Gröſſen ab, und kann nur durch Reihen erhalten werden, die deſto ſchneller convergiren, je weniger das Sphäroid von der Kugel abweicht. Sind aber zwey der Gröſſen A , B , C einander gleich, z. B. $A = B$, in welchem Falle das Sphäroid durch Revolution um die Axe $= 2C$ entſtanden iſt, ſo wird

$$X = \frac{4\pi a C}{A} \int \frac{tt \cdot dt}{r \left(1 - \left(1 - \frac{CC}{AA} \right) tt \right)}$$

$$= \frac{2\pi a \cos \varphi}{\sin \varphi^3} \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right)$$

es iſt hier

$$\frac{C}{A} = \cos \varphi, \text{ oder } \sqrt{1 - \frac{CC}{AA}} = \sin \varphi, \text{ wenn } C < A$$

oder

$$X = \frac{2\pi a CC}{CC - AA} - \frac{2\pi a AAC}{(CC - AA)^{\frac{3}{2}}} \log \frac{C + \sqrt{(CC - AA)}}{A}$$

wenn $C > A$.

Die Attraction in der den Coordinaten y parallelen und entgegen geſetzten Richtung, wird aus dieſen Formeln durch Verwandlung von a in b erhalten; es folgt daraus, daſſ dieſe beyden Kräfte der einen gleichgeltend ſind, deren Direction der Axe $2C$ normal iſt, und deren Intensität gefunden wird, wenn in der vorherigen Formel für a , der Abſtand des angezogenen Punctes von dieſer Axe ſubſtituirt wird.

Die

Die Attraction endlich, in einer den Coordinaten z parallelen und entgegen gesetzten, das heist, dem Aequator normalen Richtung, wird in dem Falle wo $B=A$,

$$= \frac{4\pi c A A}{C C} \int \frac{t t . d t}{1 - \left(1 - \frac{A A}{C C}\right) t t}$$

ist $C < A$ und wie oben $\frac{C}{A} = \cos \phi$. so folgt

$$= \frac{4\pi c \cos \phi}{\sin \phi^3} (\tan \phi - \phi)$$

und wenn $C > A$

$$= \frac{4\pi c A A C}{(C C - A A)^{\frac{3}{2}}} \log. \frac{C + \sqrt{(C C - A A)}}{A} - \frac{4\pi c A A}{C C - A A};$$

Sind endlich alle drey A , B , C einander gleich, wo der Körper eine Kugel ist, so sind die Attractionen nach den drey Hauptrichtungen

$$\frac{4}{3} \pi a, \quad \frac{4}{3} \pi b, \quad \frac{4}{3} \pi c,$$

d. h., identisch mit den Attractionen, die statt finden würden, wenn die Masse des sphärischen Kerns, in dessen Oberfläche der angezogene Punkt liegt, ganz im Mittelpunkte vereinigt wäre; daraus folgt ferner, daß äufsere Punkte, wie *Newton* zuerst lehrte, von einer Kugel eben so angezogen werden, als wenn deren ganze Masse im Mittelpunkte läge.

Z u f a t z.

Die vorstehende Abhandlung war schon geschrieben, als der Verfasser durch *La Place* auf eine vor-
treff-

treffliche Abhandlung von *Ivory*, in den *Philosoph. Transact.* von 1809 aufmerksam gemacht wurde, wo der vorliegende Gegenstand auf eine Art behandelt wird, die von dem Verfahren, welches *La Place* und *Le Gendre* hierzu brauchten, ganz verschieden ist. Mit grosser Eleganz zeigt jener Geometer, wie die Attraction auf einen äussern Punct, auf die eines im Innern gelegenen zu reduciren ist, und erhält hierdurch die Reduction des schwerern Theils der Aufgabe auf den leichtern. Allein die Art und Weise, wie dieser Theil behandelt wird, ist weit verwickelter, und gründet sich zum Theil eben auch wie die von *La Place* auf die Attraction äusserer Puncte in Anwendung gebrachte Methode, auf die Betrachtung unendlicher, nicht immer convergirender Reihen, die hier ganz zu vermeiden gewesen wären. Uebrigens beruht *Ivory's* Auflösung, die bey einer oberflächlichen Ansicht, einige Aehnlichkeit mit der unsrigen zu haben scheint, auf ganz verschiedenen Grundätzen, so dass beyde Auflösungen nichts mit einander gemein haben, als den Gebrauch der hier mit p und q bezeichneten unbestimmten Grössen.

XIV.

Über die Vortrefflichkeit der k. k. österreichischen und der k. bayerischen Landes-Vermessung, und ihrer genauen Übereinstimmung.

Seitdem man weiß, wie schwer es hält, eine geographische Breite bis auf wenige Secunden genau zu bestimmen, seitdem man weiß, welche Anomalien sich bey den besten Repetitions-Kreisen, selbst nach tausenden von Beobachtungen zeigen, seitdem kann man astronomische Bestimmungen als keine sichere Probersteine geodätischer Messungen gelten lassen.

Bey Barcelona und Montjoui zeigten sich mit Repetitions-Kreisen, bey dem gewiß sehr geschickten und sehr geübten *Méchain*, nach tausend Beobachtungen noch Unterschiede von 3 Secunden zwischen der astronomischen und geodätischen Breite. Es sey, daß diese Differenz dem Instrumente, dem Beobachter, den Gebirgsmassen, oder diesen drey Ursachen zugleich zu Schulden komme, so genügt für unsere gegenwärtige Ansicht zu wissen, daß diese und wohl noch größere Anomalien, die sich bis auf Viertel-Minuten versteigen, wirklich statt finden können, dagegen man eben so gewiß weiß, daß man heut zu Tage bey geodätischen Messungen, keine

keine 50, 200 bis 300 Klafter (welche obigen astronomischen Differenzen entsprechen würden) fehlen könne.

Nicht nur die Erfahrung bey der französischen Gradmessung, sondern auch die bey der englischen, bey welcher sich zwischen den astronomischen und geodätischen Resultaten Unterschiede von 10" zeigten, sollte dergleichen Prüfungsmittel von allen trigonometrischen Messungen auf immer verbannen und ausschliessen, und doch sehen wir, daß man noch hie und da auf dieses trügliche Verfahren baut, und die vortrefflichsten geodätischen Messungen durch diese unsichere, schwankende astronomische Mittel zu prüfen und zu beurtheilen gedenkt. Um zu zeigen, *wie weit* man sich hierinn noch verirren könne, so wollen wir ein paar Thatfachen, die auch schon hie und da in gegenwärtiger Zeitschrift zur Anzeige gekommen sind, hier in eine Uebersicht zusammen stellen.

1) Als mein Bruder nach der österreichischen Besitznehmung der venetianischen Staaten i. J. 1798. von seinem Hofe den Befehl erhielt, diesen Theil von Italien trigonometrisch aufzunehmen, so wählte er bey diesem Geschäfte, als ersten astronomischen geographischen Standpunct, die berühmte Sternwarte von Padua, als einen durch viele Jahre mit den größten und besten Instrumenten ganz genau bestimmten Fixpunct, auf dessen Meridian und Perpendikel er alle andere Punkte seiner Messung beziehen wollte. Der damalige Astronom dieser Sternwarte, Herr Abbate *Vicencio Chiminello*, theilte ihm zu diesem Behufe die Breite, die Länge, und einen

einen Punct des Meridians im Horizonte mit, um sein Dreyecksnetz hiernach orientiren zu können. Alle drey Elemente waren aber falsch.

Seit 1778 ist diese Sternwarte im Besitz eines der schönsten und prächtigsten achtfüßigen Mauer-Quadranten von *Ramsden*. Zwey Astronomen, Abbate *Toaldo* und Abbate *Chiminello*, bestimmten damit, nachdem sie Theilungsfehler von 1, 2, bis 3 Secunden an diesem Instrumente entdeckt hatten, die Breite der Sternwarte auf $45^{\circ} 23' 40''$. Während der Messung bestimmte *Chiminello* diese Breite von neuem, durch mehrere an einem Gnomon angestellte Beobachtungen, und fand ganz genau dieselbe obige Breite. (*M. C.* VII Bd. S. 442). Wer hätte hiernach nicht glauben sollen, daß dieses erste und vorzüglichste Element einer Sternwarte, nicht auf das allerhöchste bestimmt sey? Hieran nur zweifeln zu wollen, wäre für Beleidigung, ja für Unvernunft gehalten worden, und wenn vollends der Soldat dem Abbate ins Handwerk hätte greifen wollen, so würde dies als eine gar zu arge Beschimpfung angesehen worden seyn. Mein Bruder zweifelte auch keinesweges an der Richtigkeit dieser Angaben, und baute ganz getrost und unbefangen seine ganze Arbeit darauf. Als ich im Sept. 1807 mit einem *Reichenbach*'schen Repetitionskreis nach *Padua* kam, so bestimmte ich damit aus 90 Sonnen-Beobachtungen die Breite der Sternwarte, und fand zu meiner (und auch der Paduaner Astronomen) nicht geringen Verwunderung, daß solche $45^{\circ} 24' 2'' 40$ war, folglich von der bisher dafür angegebenen um $22'' 4$ verschieden. So war es mit der Länge, so mit dem Meridianpunct,

denn da der Mauer-Quadrant (ungeachtet der Versicherung des Gegentheils) nicht genau in der Mittagsfläche stand, so konnte es auch das auf dem *Palazzo Obizi* eingerichtete Meridianzeichen nicht seyn, wornach das ganze Dreyecknetz orientirt worden ist; wie wir dieses künftig in einem besondern Aufsatz umständlicher aus einander setzen, und die sonst vortreffliche geodätische Messung nach unsern in Padua, Verona, Venedig und Arqua angestellten astronomischen Beobachtungen gehörig rectificiren werden.

2) Unsere Leser wissen, welche Schicksale die Breite der k. k. Sternwarte in Wien erfahren hat. *Liesganig* bestimmte sie auf $48^{\circ} 12' 36''$. Im Jahr 1808 beobachtete solche Herr Hauptmann *Augustin* mit einem *Reichenbach'schen* 122zolligen Repetitionskreis, und fand aus 472 Beobachtungen $48^{\circ} 12' 40''$, folglich $4''$ größer als *Liesganig*. In demselben Jahr, mit demselben Instrumente, nur einen Monat später, findet derselbe Beobachter die alte *Liesganig'sche* Breite wieder. Welche ist nun die wahre definitive Breite der Wiener Sternwarte? (*M. C.* XVIII Bd. S. 112 XXVII Bd. S. 289).

3) Im October 1807 bestimmte Herr Prof. *Pasquich* mit einem 182zolligen *Reichenbach'schen* Repetitionskreis mit stehender Säule aus 130 Beobachtungen des Polarsterns die Breite von Raab $= 47^{\circ} 41' 26''$ (*M. C.* XVIII Bd. S. 104, XXVII Bd. S. 382). Herr Hauptm. *Augustin* findet mit einem *Reichenbach'schen* Repetitionskreis mit zwey Fernröhren und der beweglichen Libelle diese Breite $= 47^{\circ} 41' 12''$, folglich eine Differenz mit *Pasquich* von $13''$. 6.

Die

XIV. Oesterreich. u. bayerf. Landes-Vermeßf. 139

Die trigonometrischen Punkte geben für diese Breite $47^{\circ} 41' 14, "9$. Wo ist nun hier der wahre Probiereisen?

4) Herr Ritter *Bürg* beobachtet die Breite des Andreas-Thurms in Commorn $= 47^{\circ} 48' 17, "0$. Die Dreyecke geben $47^{\circ} 48' 30, "029$. Der Fehler ist irgend $13, "0$. Sollte der Geodäte um 200 Klafter gefehlt haben? Unmöglich!

5) Herr Hauptmann *Augustin* bestimmt mit seinem Kreise die astronomische Breite der Rosalien-Capelle $= 47^{\circ} 41' 50, "8$. Die Dreyecke hingegen geben $47^{\circ} 41' 54, "975$. Der Unterschied ist $4, "175$.

6) Der Director der Erlauer Sternwarte, Herr *Madaraffy*, beobachtete in den Jahren 1780 und 1781 die Breite seiner Sternwarte mit einem vortrefflichen dritthalb schuhigen Quadranten von *Sisson*, und fand solche $47^{\circ} 53' 54, "0$. Im Sept. 1807 beobachtete solche Hr. Prof. *Pasquich* mit seinem 18zölligen Kreis $47^{\circ} 53' 56, "3$. Die Dreyecke geben $47^{\circ} 54' 5, "985$, welches 10 bis 12 Sec. von den astronomischen Bestimmungen abweicht.

7) Die Herrn Directoren und Astronomen der k. Sternwarte zu Ofen bestimmten ihre Breite $47^{\circ} 29' 44, "0$. Die aus den Dreyecken hergeleitete ward hingegen gefunden $47^{\circ} 29' 51, "915$. Der Unterschied ist $7, "915$.

8) Herr Ritter *Bürg* beobachtete die Breite der Stadtkirche von Wels $48^{\circ} 9' 13, "4$. Die Dreyecke gaben dafür $48^{\circ} 9' 31, "6$; bleibt demnach der ziemlich große Unterschied von $18, "2$.

9) Derselbe Herr Ritter *Bürg* beobachtete die Breite von Salzburg, und fand aus Sonnen-Beobachtungen $47^{\circ} 48' 24, "4$. Aus Beobachtungen des Po-

lar-Sterns $47^{\circ} 48' 35,0$. Die Dreyecke geben $47^{\circ} 48' 23,8$. Das sonderbarste ist die Differenz von $10,6$ zwischen Sonne und Stern.

Noch schlechter geht es mit den Längen Bestimmungen, sie mögen durch Stern-Bedeckungen oder durch Pulver-Signale ausgemittelt worden seyn, wie folgende Darstellung zeigt:

	Beobach- ter	Beobach- teter . . .	Berechneter Längen- Unterschied mit Wien	Differenzen
Feuerthurm in Raab	Pasquich	$1^{\circ} 16' 12,0$	$1^{\circ} 15' 40,0$	
	Augutin	$1 15 19,3$		
Andr. Thurm in Comorn	Bürg	$1 44 37,1$	$1 45 17,1$	
K. Sternwarte in Ofen	Weiss	$2 37 44,5$	$2 40 6,8$	
K. Sternwarte in Erlau	Madaraßy	$3 59 43,5$	$4 0 18,6$	Differenzen
— — —	Pasquich	$3 57 51,8$	$4 0 18,0$	

Bey Längen gehen hiernach die Unterschiede zwischen den astronomischen und geodätischen Bestimmungen bis auf dritthalb Minuten. Wie mag es vollends mit der so schwierigen Azimuthal-Beobachtung aussehen? Man weiß, daß die berühmtesten Astronomen und Gradmesser, wie z. B. *Boscovich*, *Beccaria* in Minuten darinn gefehlt haben. Wollte man demnach nach solchen astronomischen Angaben die geodätischen prüfen und beurtheilen, in welche Ungerechtigkeiten würde man nicht gegen fleißige und geschickte Geodäten verfallen? Ganz das Gegentheil! der Geodäte wird des Astronomen Zuchtmeister; der Erdmesser weist den Himmels-Beobachter zu rechte, wenn dieser sich gar zu grob verirrt.

Der Geodäte hat andere, und viel bessere und sichere Mittel, als den astronomischen Probierstein, seine Arbeit zu prüfen. Er kann seine Messung von Zeit zu Zeit durch Verifications-Basen untersuchen. Er kann dieselbe Seiten durch verschiedene Dreyecks-Reihen

Reihen erhalten, und daraus auf die Richtigkeit seiner Operationen schliessen. So z. B. sind bey der österreichischen Messung zwey Trianguleurs mit zwey ganz verschiedenen Dreyecks-Reihen, der eine von Wienerisch-Neustadt über Königgrätz, und der andere über Linz nach Prag gekommen; sie flossen mit fünf Seiten zusammen, deren Länge zwischen 18000 und 15000 Klaftern betrugen, und die größte Differenz in den verschiedenen Angaben war nicht mehr als 1,4 Klafter. Eine solche Controls beweist meines Erachtens, mehr für die bewunderungswürdige Güte und Richtigkeit einer Messung, als alle astronomische Längen- und Breiten-Bestimmungen. Wir wollen sie daher auch zum Unterschiede die *geodätische Prüfung* nennen.

Man pflegt ein trigonometrisches Dreyecks-Netz gemeinlich auf den Meridian eines Orts zu beziehen. Erstens, um bey einer Länder-Aufnahme und Karten-Entwurf alle Stationen und Dreyeckspuncte, unabhängig von einander auf das Papier bringen zu können. Dies geschieht, indem man die Abscissen und Ordinaten dieser Puncte von einem angenommenen Meridian und dessen Perpendikel berechnet, und so diese Puncte viel bequemer und genauer, senkrecht von diesen beyden Linien nach einem Mafstab auf die Papier-Sectionen bringt, als wenn man die nach verschiedenen Winkeln geneigten Dreyecks-Seiten selbst auftrüge. Hierzu wird gerade keine Meridian-Linie unbedingt erfordert, jede willkürliche Linie und ihre senkrechte würden dieselben Dienste leisten, sobald man nur einen Winkel kennt, oder voraussetzt, den eine Seite des Dreyeck-Netzes mit

mit

mit dieser willkührlichen Linie macht. Allein man will bey geographischen und topographischen Karten nicht nur allein die richtige respective Lage aller Ortschaften, die genaue Situation aller Flüsse, Gebirge, Wege, Wälder, Moräste u. s. w. haben, sondern man fordert, daß diese Karten auch genau nach den vier Weltgegenden orientirt seyn sollen. Die Vertical-Linien der Karte sollen Meridiane, die Horizontal-Linien die Parallele vorstellen, man will die geographische Länge und Breite aller Punkte kennen, dazu wird nun eine richtige und genaue Orientirung des ganzen Dreyecks-Netzes nach dem wahren Meridian erfordert. Man bewirkt dieses durch die Beobachtung des Azimuths einer Dreyecks-Seite, das heist, man bestimmt den Winkel, den eine dieser Seiten mit dem Meridian eines Orts macht, und wenn man diesen hat, so hat man auch die Richtungswinkel mit dem Meridian aller übrigen zusammenhängenden Seiten eines Dreyecks-Netzes. Damit berechnet man die Abcissen und Ordinaten, das ist, die senkrechten Abstände vom Perpendikel und vom Meridian aller Punkte, und daraus ferner ihre Längen- und Breiten-Unterschiede mit dem Haupt-Orte, durch welchen man, so zu sagen, den ersten Meridian gelegt hat. Ist daher die absolute Länge und Breite dieses Hauptorts gut bestimmt, so sind es auch alle übrigen.

Um sich zu versichern, daß ein Dreyecks Netz, besonders wenn es von einer grossen Ausdehnung ist, am äußersten Ende der Messung keine falsche Richtung gegen den Meridian genommen hat, so pflegt man an den beyden äußersten Enden einer
langen

langen Dreyecks-Reihe den Richtungs-Winkel einer Seite mit dem Meridian zu bestimmen. Ist der durch die Dreyecks-Winkel und vom *ersten* Richtungs-Winkel abgeleitete *letzte* Richtungs-Winkel, dem unmittelbar astronomisch beobachteten gleich, so ist dies eine Probe, daß das Netz keine Schwenkung gelitten, das ist, keine falsche Richtung gegen den Meridian angenommen hat. Allein diese Probe prüft keinesweges des Geodäten Arbeit, sondern bloß die des Astronomen, und beweist nur, ob dieser in seinen Beobachtungen der beyden Richtungs-Winkel nicht gefehlt hat. Denn wenn einmal die *geodätische Prüfung* die Richtigkeit aller Dreyecks-Seiten und Winkel bewährt und außer allen Zweifel gesetzt hat, so ist eine Abweichung in dem *letzten* Richtungs-Winkel, wenn eine statt findet, nur dem Astronomen nicht dem Geodäten beyzumessen. So z. B. nehme ich keinen Anstand, nachdem ich mich von der Vortrefflichkeit der geodätischen Messungen innigst überzeugt hatte, den in der *M. C. XXVII B. S. 382* angezeigten Fehler von $1' 20''$ in dem Azimuth des *letzten* Richtungswinkels in Raab, nicht der geodätischen, wohl aber der astronomischen Arbeit beymessen, und zwar größtentheils dem zu Wien beobachteten *ersten* Richtungs-Winkel, wie wir dieses sogleich beweisen werden.

Das große zusammenhängende trigonometrische Dreyecks Netz, welches alle Erbland der k. k. österreichischen Monarchie überzieht, breitet sich auch ununterbrochen über das Salzburgerische aus, von welchem Lande bereits, wie bekannt, eine vortreffliche Karte in 15 Blätter erschienen ist. Die k. bayerische Messung breitete sich auch ihrerseits in das angrenzende Salzburg aus, wodurch also mehrere beyden Messungen gemeinschaftliche Punkte entstanden sind. Wir haben die Mittheilung vierzehn solcher Punkte erhalten, die wir zuerst hier im Original folgen lassen.

Abstände

Abstände nachbenannter trigonometrischer Punkte im Salzburgerischen vom Münchner und Wiener Meridian.

Namen der Punkte	In Beziehung auf dem nördl. L. Frauen-Thurm in München		In Beziehung auf d. St. Stephans-Thurm in Wien.	
	Abcissen	Ordinaten	Abcissen	Ordinaten
1 Rachelberg	+ 32540,32 Nörd.	— 45544,96 Oestl.	+ 47423,92 Nörd.	+ 15146,61 Welt.
2 Hausruck	+ 1512,96 —	— 51939,22 —	— 886,46 Südl.	+ 108326,18 —
2 Frauenfischereck	— 916,30 Südl.	— 44354,53 —	— 3892,63 —	+ 120208,02 —
4 Affen	— 1307,03 —	— 29391,86 —	— 3065,68 —	+ 143227,19 —
5 Haungsberg	— 8186,86 —	— 36458,30 —	— 14395,09 —	+ 133030,25 —
6 Traunfleiu	— 9258,56 —	— 58092,73 —	— 18014,11 —	+ 99902,31 —
7 Schatberg	— 13218,37 —	— 47776,60 —	— 23111,06 —	+ 116124,63 —
8 Vordere-Stauffen	— 14347,50 —	— 32772,66 —	— 23414,82 —	+ 139276,62 —
9 Wazmann	— 21801,20 —	— 34832,56 —	— 35058,22 —	+ 136824,41 —
10 Raucheck	— 23907,84 —	— 42681,25 —	— 39041,37 —	+ 124969,77 —
11 Rötthenein	— 25295,98 —	— 51194,93 —	— 41983,97 —	+ 112024,57 —
12 Seekohrpitz	— 32331,04 —	— 51082,64 —	— 52778,15 —	+ 11286,95 —
13 Hirsch-Kogel	— 34193,70 —	— 35532,88 —	— 54156,66 —	+ 136928,52 —
14 Weisack	— 36634,38 —	— 47299,34 —	— 59027,45 —	+ 119089,64 —

Um Bayerl. Ruth. in Wien Klaff. zu verwandeln, addire man zu dem Log. Bayerl. Ruth. den Log = 0,1871944
 in Pariser Toisen — — — — — Log. Bayerl. Ruth. den Log = 0,1753534
 Wien. Klaffern in Pariser Toisen — — — — — Log. Wien. Klaff. den Log = 9,9881590

Sind diese Messungen gut gerathen, und die geographische Positionen von München und Wien gut bestimmt, so müssen die vom Münchner Meridian berechnete Längen und Breiten dieser 14 Punkte genau mit jenen übereinstimmen, welche vom Wiener Meridian abgeleitet werden. Die Breite des nördl. L. Frauenthürms in München ist $48^{\circ} 8' 20''$. Jene des Stephansthurms zu Wien $48^{\circ} 12' 34''$. Damit findet man folgende gedoppelte geographische Bestimmungen dieser 14 gemeinschaftlicher Punkte

Uebereinstimmung der geograph. Positionen der k. k. Oesterreichsf. und der k. Bayerischen Landes-Triangulirung.

Namen der Punkte	Berechnete Breite durch		Diff.	Berechneter Längen- Unterschied		Längen- Unterschied zwischen Wien u. München
	Wien	München		von Wien	von München	
1 Rachelberg	$48^{\circ} 58' 47,00''$	$48^{\circ} 58' 43,34''$	$-3,66''$	$2^{\circ} 59' 6,51''$	$1^{\circ} 48' 59,91''$	$4^{\circ} 48' 6,42''$
2 Hausruck	$48^{\circ} 9' 40,00''$	$48^{\circ} 9' 37,88''$	$-2,12''$	$2^{\circ} 45' 47,62''$	$2^{\circ} 18' 8,85''$	$6,47''$
3 Frauentfch.	$48^{\circ} 6' 7,99''$	$48^{\circ} 6' 6,09''$	$-1,90''$	$3^{\circ} 46' 66''$	$1^{\circ} 44' 19,80''$	$6,46''$
4 Affen	$48^{\circ} 5' 56,98''$	$48^{\circ} 5' 55,66''$	$-1,32''$	$3^{\circ} 38' 58,89''$	$1^{\circ} 9' 7,67''$	$6,56''$
5 Haunzberg	$47^{\circ} 54' 56,62''$	$47^{\circ} 54' 54,52''$	$-2,10''$	$3^{\circ} 22' 39,59''$	$1^{\circ} 25' 26,73''$	$6,32''$
6 Traunftein	$47^{\circ} 52' 27,10''$	$47^{\circ} 52' 24,47''$	$-2,63''$	$2^{\circ} 32' 29,62''$	$1^{\circ} 16' 3,09''$	$6,05''$
7 Schaffberg	$47^{\circ} 46' 39,19''$	$47^{\circ} 46' 36,58''$	$-2,61''$	$2^{\circ} 56' 25,33''$	$1^{\circ} 51' 40,71''$	$6,04''$
8 Vord. Stauf.	$47^{\circ} 45' 21,13''$	$47^{\circ} 45' 18,57''$	$-2,56''$	$3^{\circ} 31' 31,82''$	$1^{\circ} 16' 34,25''$	$6,07''$
9 Wazman	$47^{\circ} 33' 34,06''$	$47^{\circ} 33' 31,05''$	$-3,01''$	$3^{\circ} 27' 1,47''$	$1^{\circ} 21' 4,76''$	$6,23''$
10 Rauehek	$47^{\circ} 30' 0,88''$	$47^{\circ} 30' 57,67''$	$-3,21''$	$3^{\circ} 8' 51,46''$	$1^{\circ} 39' 14,35''$	$6,81''$
11 Röhrenftein	$47^{\circ} 27' 30,90''$	$47^{\circ} 27' 27,69''$	$-3,21''$	$2^{\circ} 49' 9,45''$	$1^{\circ} 58' 56,66''$	$6,11''$
12 Seekohrpfiz	$47^{\circ} 16' 26,84''$	$47^{\circ} 16' 23,50''$	$-3,34''$	$2^{\circ} 49' 50,09''$	$1^{\circ} 58' 16,20''$	$6,29''$
13 Hirschkogel	$47^{\circ} 14' 3,03''$	$47^{\circ} 14' 58,98''$	$-4,05''$	$2^{\circ} 25' 54,54''$	$1^{\circ} 22' 12,09''$	$6,63''$
14 Weisseck	$47^{\circ} 9' 49,31''$	$47^{\circ} 9' 45,67''$	$-3,64''$	$2^{\circ} 58' 49,93''$	$1^{\circ} 49' 16,89''$	$6,82''$

Aus dieser Darstellung sieht man, auf welche genaue und bewunderungswürdige Weise der Längen-Unterschied zwischen Wien und München auf einer Entfernung von mehr als 187300 Klaftern aus diesen 14 Puncten bestimmt worden ist. Nicht so genau harmoniren die Breiten, aber selbst die ziemlich gleichförmige Differenz in einem Sinn, beweist die Vortrefflichkeit der Messung, und deutet auf sonst irgend einen constanten Radicalfehler. Wir wollen versuchen, ob wir diesen nicht auffinden, und obige Breitenfehler zur Verschwindung bringen können.

Der Fehler kann 1) in einer fehlerhaften Breiten-Bestimmung, oder

2) in einem fehlerhaften Richtungswinkel liegen.

Die Breite von München ist nach so vielen harmonirenden Beobachtungen mit verschiedenen Werkzeugen von drey verschiedenen Beobachtern so genau bestimmt, daß ihre Richtigkeit nicht wohl bezweifelt werden kann (*M. C.* XXV. Bd. S. 334). Desgleichen ist der daselbst angezeigte, von denselben drey Beobachtern bestimmte Richtungswinkel von Aufkirchen außer allen Zweifel. Dagegen kann man nicht in Abrede stellen, daß über die Breite des Wiener Stephans-Thurms noch einiger Zweifel herrsche, sie schwebt nämlich zwischen $48^{\circ} 12' 34''$ und $38''$. Um aber obige Breiten-Fehler zur Verschwindung zu bringen, so müßte man die *Liesganig'sche* Breite statt zu vermehren, vielmehr um $3''$ vermindern, welches sogar einen Breitenfehler von $7''$ hervorbringen würde. Setzt man also die Wiener Breite

auf

auf $48^{\circ} 12' 31''$, so würden obige Breitenfehler also stehen :

1	Bey Rachelberg	—	0,66
2	Hausruck	+	0,88
3	Frauenschereck	+	1,10
4	Asten	+	1,68
5	Haungsberg	+	0,90
6	Traunstein	+	0,37
7	Schafberg	+	0,39
8	Vordere Stauffen	+	0,44
9	Wazmann	—	0,01
10	Rauckeck	—	0,21
11	Röthenstein	—	0,21
12	Seekohrsitz	—	0,34
13	Hirschkogel	—	1,05
14	Weifseck	—	0,64

Die auf dem Wiener Stephansturm angestellte Azimuthal-Beobachtungen zur Bestimmung des ersten Richtungs-Winkels, sind uns bis jetzt nicht bekannt geworden, wir können daher ihren Werth nicht beurtheilen. Indessen haben wir unsern Verdacht gegen dieses Wiener Azimuth oben schon geäußert und den Grund hierzu angegeben. Man fand nämlich in Raab den letzten Richtungs-Winkel um $1' 20''$ zu groß. Wir wollen die Hypothese annehmen, dieser Fehler komme dem Wiener Azimuth allein zu Schulden, und alle vom Wiener Stephansturm aus berechnete Richtungs-Winkel wären um $1' 20''$ zu vermindern. Um dieses bewerkstelligen zu können, so müssen wir diese Richtungs-Winkel aus den Datis, die wir besitzen, erst durch Rechnung finden, und mit diesen verbesserten Winkeln ferner die neuen Abstände vom Meridian und Perpendikel, und endlich die neuen Breiten berechnen. Zuerst geben uns unsere Rechnungen folgende Data:

Abstän-

*Abstände nach der Verbesserung 1' 20" des Wiener Azimuths
oder Richtungs - Winkel.*

Namen der Punkte	Gerade Ent- fernung	Alter Richtungs Winkel			Verbesselter Rechnungs- Winkel	In Beziehung auf dem Meridian und Perpendikel des Stephans- Thurms in Wien, in Wie- ner Klaftern	
	Wiener Klaffern	67°	36'	54", 7	67° 38' 15"	Neue Abthei- len	Neue Ordina- ten
1 Rachelberg	124530,30	67	36	54, 7	67 38 15	+ 47379,43	+ 115165,00
2 Hausruck	108329,05	89	31	52, 1	89 30 32	+ 928,53	+ 108325,05
3 Frauenschereck	120270,76	88	8	43, 0	88 7 23	+ 3939,23	+ 120206,20
4 Alten	143260,00	88	46	25, 8	88 45 6	+ 3121,03	+ 143226,07
5 Haungsberg	133797,06	83	51	44, 7	83 50 25	+ 14356,49	+ 133025,34
6 Fraumstein	101516,21	79	46	43, 3	79 45 23	+ 18053,01	+ 99898,10
7 Schaffberg	118492,00	78	44	38, 8	78 43 19	+ 23155,95	+ 116115,60
8 Vorderer Stauffen	141231,09	80	27	24, 6	80 26 5	+ 23468,54	+ 139267,58
9 Wagnmann	141244,20	75	37	42, 3	75 36 22	+ 35111,41	+ 136810,50
10 Raucheck	130926,00	72	39	3, 0	72 37 43	+ 39088,89	+ 124954,40
11 Röhrenfein	119633,43	69	27	18, 9	69 25 59	+ 42027,41	+ 112008,29
12 Seekohrsfritz	124596,60	64	56	17, 1	64 54 57	+ 52822,64	+ 112845,35
13 Hirschkogel	147249,33	68	25	14, 5	68 23 55	+ 54209,43	+ 136907,66
14 Welfeck	132915,73	63	38	4, 0	63 36 44	+ 59073,62	+ 119066,80

XIV. Oesterreich. u. bayerf. Landes- Vermess. 149

Berechnet man nun ferner aus diesen neuen Meridian- Abständen die Breiten dieser 14 Punkte, so verschwinden obige Breiten- Fehler ganz, und es bleiben nur noch geringe, unvermeidliche, und sich wechselseitig aufhebende Unterschiede, so, daß der mittlere Breiten- Fehler ganz Null wird, wie folgende Tabelle zeigt:

Geographische Breiten, in der Voraussetzung, daß das Wiener Azimuth 1° 20' falsch ist.

Namen der Punkte	Berechnete Breite		Differenzen
	durch Wien	durch Münch.	
1 Rachelberg	48° 58' 44,61	48° 58' 43,84	+0,77
2 Hausruck	48 9 37,55	48 9 37,91	-0,36
3 Frauenschereck	48 6 5,18	48 6 6,10	0,92
4 Asten	48 5 53,53	48 5 55,64	-2,11
5 Haungsberg	47 54 53,38	47 54 54,42	1,04
6 Frauenstein	47 52 24,50	47 52 24,33	+0,17
7 Schafberg	47 46 36,25	47 46 36,32	-0,07
8 Vordere Stauffen	47 45 17,64	47 45 18,42	-0,78
9 Wazmann	47 33 30,63	47 33 30,91	-0,28
10 Rauchek	47 29 57,50	47 29 57,35	+0,15
11 Rörhenstein	47 27 27,90	47 27 27,40	+0,50
12 Seekohrspitz	47 16 23,48	47 16 22,11	+1,37
13 Hirschkogel	47 13 59,22	47 13 58,55	+0,67
14 Weißseck	47 9 46,21	47 9 45,42	+0,79

Mittlere Breiten- Fehler — 0,08

Man sieht hiernach, daß unser Verdacht gegen das Wiener Azimuth nicht ganz ungegründet war, und es lohnte sich daher wohl der Mühe, diese Beobachtung nochmals sorgfältig zu wiederholen, und den Grund dieses Irrthums zu bestätigen, oder zu vernichten. Indessen beweist die gegenwärtige Zahlen-

sammenstellung auf alle Fälle die Vortrefflichkeit und die schöne Uebereinstimmung der österreichischen Messung mit der bayerischen ohne aller Dazwischenkunft astronomischer Längen- und Breiten-Bestimmungen, welche nichts *für* noch *gegen* die Güte dieser Messungen würden bewiesen haben, wohl aber umgekehrt kann diese bewunderungswürdige Messung zum Probierstein astronomischer Bestimmungen dienen. Man kann hieraus ferner die heilsame Lehre ziehen, daß man bey einem *solchen* Zustand der practischen Sternkunde an keine Gradmessungen denken sondern sich wohlweislich an die nützlichen trigonometrischen Aufnahmen halten müsse, dergleichen die österreichische und bayerische als ein Muster von Vollkommenheit angesehen werden kann, und selbst in Frankreich und England nicht übertroffen worden ist.

XV.

Ueber eine neue Art, Sonnenfinsternisse zu beobachten, auf jene vom 31. Januar 1813 angewandt. Auf der Sternwarte *à la Caspelle* bey Marseille.

Der Zweck, zu welchen man heut zu Tage Sonnenfinsternisse beobachtet, ist zweyfach. Der eine ist astronomisch, der andere geographisch.

Der astronomische Nutzen, welcher aus Beobachtungen dieser Finsternisse erwächst, ist, daß man aus denselben den wahren Ort des Mondes erhält, welcher mit jenem aus den Monds-Tafeln berechnet und verglichen, die Fehler oder die Verbesserungen dieser Tafeln anzeigt. Man hat jetzt freylich bessere und genauere Mittel, die Mondsorter mit Meridian-Instrumenten zu bestimmen, allein je näher der Mond an seine Zusammenkunft mit der Sonne rückt, desto schwerer und unsicherer werden diese Beobachtungen, und in der Conjunction selbst, vollends unmöglich. Ist aber die Zusammenkunft ecliptisch, so wird es möglich, den Mondsort sogar im Augenblick der Conjunction zu bestimmen, und da diese Möglichkeit seltner vorkommt, so muß man es nicht unterlassen, diese Beobachtung mit der gehörigen Sorgfalt zu unternehmen, sobald sich die Gelegenheit dazu darbietet.

Den geographischen Nutzen, welchen Beobachtungen der Sonnenfinsternisse gewähren, ist jener der Längenbestimmung derjenigen Orte, an welchen diese Beobachtungen gemacht werden. Sonst, das heisst, seit *Ptolemäus* Zeiten, 125 Jahre nach C. G. bis 1610, Zeit der Entdeckung der Jupiters-Trabanten, waren Mondfinsternisse das einzige Mittel, geographische Längen zu bestimmen; hierauf folgten die Verfinsterungen dieser Trabanten durch den Schattenkegel ihres Planeten, welche zu diesem Behufe gebraucht wurden, bis im J. 1700 *Dominic Cassini* die Beobachtungen der Sonnenfinsternisse zu demselben Zwecke anzuwenden lehrte, und durch die Beobachtungen der Sonnenfinsternis am 23. Sept. 1699, die geographische Länge drey deutscher Städte *Nürnberg*, *Kiel* und *Greifswalde* zuerst auf diese Art bestimmte.*) (*Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Paris*, An,

*) *Dominic Cassini* verfiel schon i. J. 1661 auf diese Methode, bey Gelegenheit einer Sonnenfinsternis, welche er in diesem Jahr in Gegenwart eines Herzogs von Modena beobachtet hatte. Allein er machte sie erst im J. 1700 in den Pariser Memoiren bekannt. Sein Sohn beschrieb sie nachher noch umständlicher in der Einleitung zu seinen astronomischen Tafeln (Paris 1740) *Weidler* in seiner Geschichte der Astronomie pag. 522, und nach ihm *La Lande* in seiner *Bibliographie astronom.* p. 254 führen ein Werk von *Dom. Cassini* unter dem Titel an: *Nova Eclipsium Methodus*, Bononiae 1663 4to (italice) worinn er diese neue Methode, Sonnenfinsternisse zu Längenbestimmungen zu benutzen, beschrieben haben sollte. Allein niemanden ist dieses Werk je zu Gesicht gekommen, und man zweifelte an der wirklichen Existenz dessel-

An 1700 p. 103) Sein Sohn *Jacob Cassini* gab im J. 1705 dieser Methode seines Vaters eine noch größere Ausdehnung, und wandte solche auf die Bedeckung der Fixsterne und der Planeten vom Monde an.

desselben. Man sehe *La Lande Astron. art. 1808*. Dieser Zweifel ist jetzt zur Gewissheit geworden, und dieses Werk ist in der That nie in Druck gekommen, da die Inquisition dessen Erscheinung verhindert hat, wie man dies aus den *Memoires pour servir à l'histoire des sciences et à celle de l'observ. Royal de Paris suivis de la vie de J. D. Cassini écrite par lui-même etc.* . . . erfährt, und welche der noch lebende *Cassini IV* im Jahr 1810 herausgegeben hat, worinn das Leben seines Urgroßvaters, von ihm selbst aufgesetzt, vorkommt, und wo er diesen Vorfall mit folgenden Worten erzählt: "J'avais imaginé précédemment cette methode lors d'une éclipse de soleil, que j'observai en la présence du Duc François du Modène; mais l'Inquisiteur de cette ville, alarmé de cette nouveauté, ne me permit pas de la faire imprimer comme je me l'étais proposé." In dem angehängten *Tableau chronologique de la vie et des ouvrages de J. D. Cassini* kommt p. 327 noch folgende Stelle vor. "1661 — il observe devant le Duc de Modène l'éclipse de Soleil de cette année, et à cette occasion il imagine la méthode de déterminer les longitudes terrestres par l'observation des éclipses de Soleil, et celle de tracer sur une carte géographique les apparences d'une éclipse de Soleil pour tous les divers lieux de la terre. Mais l'Inquisiteur de Modène ne permit pas de publier celle-ci lorsque par la suite il voulut l'exposer dans un ouvrage intitulé: *Nova eclipticum methodus*." Man sieht hieraus, daß dieses Werk unstreitig nie im Druck existirt hat, und daß wir es der heiligen Inquisition zu verdanken haben, daß diese sichere und einzig bewährte Methode der geographischen Längenbestimmung 40 Jahre später bekannt ge-

Mon. Corr. XXVIII. B. 1813. L. wot.

an. (*Hist. An. 1705 p. 122. Mém. p. 194*). Seit dieser Zeit ist diese Methode allgemein befolgt, und verschiedentlich verbessert worden.

Fixstern-Bedeckungen vom Monde räumt man in dieser Hinsicht den Vorzug vor Sonnenfinsternissen ein, denn den wahren Anfang oder das Ende einer Sonnen-Bedeckung vom Monde, darf sich wohl niemand schmeicheln, auf die Secunde genau beobachten zu können. Den Anfang, den wahren Eintritt des Mondes, das heißt, die wirkliche Ränder-Berührung dieser beyden Himmelskörper, kann man nur alsdann wahrnehmen, wenn solche in der That schon erfolgt ist, und man wird diese Erscheinung desto früher oder später bemerken, je besser oder je schlechter das Fernrohr seyn wird, womit man diesen Eindruck beobachtet. Dasselbe geschieht bey dem Ende der Finsterniß oder bey dem gänzlichen Austritt des Mond-Randes. Nicht so bey Fixsternen, deren Annäherung zum Mondrande lang vorher gesehen und verfolgt, und deren Verschwinden hinter diesem Rande augenblicklich, und auf die Secunde genau bemerkt werden kann. So auch bey dem Austritte; besonders wenn der Stern sehr helle, erster oder zweyter GröÙe ist, und am dunkeln Mondrande plötzlich hervorspringt. Sonnenfinsternisse haben daher in diesem Anbetracht einen geringern Werth, und die heutigen Astronomen trauen den Längenbestimmungen, welche sie auf diesem Wege erhalten, nur die Hälfte der Genauigkeit zu, welche sie jenen aus Stern-Bedeckungen ein-

worden ist, und vielleicht nie ans Tageslicht gekommen wäre, wenn *Cassini* nicht den Ruf nach Paris erhalten und angenommen hätte.

einräumen. Wo man geographische Längen aus mehreren Sternbedeckungen herleiten kann, welche auch häufiger als Sonnenfinsternisse vorkommen, wird man sogar wohl daran thun, die letztern ganz davon auszuschiessen.

Die Beobachtungen der Sonnenfinsternisse behalten demnach heut zu Tage nur noch den Werth, daß solche Gelegenheit geben, die seltenere Beobachtung der wahren Länge und Breite des Mondes, zur Zeit seiner Zusammenkunft mit der Sonne zu machen, aber auch diese Bestimmungen, sobald als sie aus den so zweifelhaften und unzuverlässigen Augenblicken des beobachteten Anfanges und des Endes der Finsternisse hergeleitet werden, wie dies gewöhnlich zu geschehen pflegt, werden von dieser unvermeidlichen Unzuverlässigkeit behaftet werden, und folglich der auf diese Art ausgemittelte Mondsort mehr oder weniger fehlerhaft ausfallen.

Diese Betrachtungen, welche wir bey Gelegenheit der Vorbereitungen zu den Beobachtungen der Sonnenfinsternisse vom 31. Jan. 1813 anstellten, leiteten uns daher auf folgende Gedanken, wie man diese Finsternisse mit mehr Nutzen beobachten könnte.

Die successive Deckung der beyden Scheiben bilden bekanntlich während der Dauer der Finsternisse, in ihren Intersections-Puncten die sogenannten Hörner. Die Spitzen dieser Hörner sind Puncte, welche sowohl der Sonnen- als der Monds-Peripherie angehören. Kann man für eine bestimmte Zeit den wahren Ort dieser Puncte bestimmen, so hat man so zu sagen, so viele gemeinschaftliche Sonnen- und Mond-Randpuncte, als man solche Horn-

spitzen bestimmt hat, welche auf dem Mittelpunct des Mondes reducirt, so viele beobachtete Monds-Örter geben, welche sich alsdann mit den Mondstafeln vergleichen lassen. Alles kommt darauf an, auf welche Art und mit welcher Genauigkeit man diese Randpuncte bestimmen kann.

Nachdem wir die Bestimmungsart eines Gestirns durch die Beobachtung seiner Höhe und seines Azimuths, und welche wir im XXIV. Bande der *M. C.* S. 528 umständlich beschrieben haben, so bewährt gefunden, und seitdem bey allen unsern Cometen-Beobachtungen mit dem besten Erfolge angewendet haben, so dachten wir dieselbe Beobachtungs-Methode bey der Sonnenfinsternis zu versuchen, und auf diese Art die geraden Aufsteigungen und Abweichungen, folglich die Längen und Breiten dieser Hornspitzen zu bestimmen und daraus einige Mondsorter abzuleiten und mit den Tafeln zu vergleichen. Das ganze sollte nur ein vorläufiger Versuch seyn, da dieser aber über alle Erwartung gut ausgefallen ist, so theilen wir solchen unsern Lesern zwar immer nur als Versuch mit, mehr um unser Verfahren bey der Beobachtung und Berechnung zu beschreiben, als um des Werthes willen, welchen wir auf das dadurch erhaltene Resultat legen. Erstlich waren die Umstände, welche diese Himmels Erscheinung begleiteten, für die Beobachtungen nicht die günstigsten. Die Sonne ging, wie man weiß, verfinstert auf; an unsern, auf dieser Seite mit hohen und nahen Bergen umgebenen Horizonte erschien sie erst um halb 8 Uhr. Obgleich der Himmel helle und unbewölkt war, so waren doch so viele Dünste
in

in der Luft, welche durch die Sonnenstrahlen erwärmt, in so heftige Bewegung geriethen, daß man keine deutlichen Bilder sehen konnte, und die Sonnen - sowohl als die Monds - Ränder sehr unbestimmt und ausgezackt erschienen. Erst nach 9 Uhr konnten wir es wagen, einige Beobachtungen anzustellen, obgleich die Gegenstände immerfort und während der ganzen Beobachtungszeit in beständiger Wallung blieben. Zweytens ist zu bemerken, daß weder die Höhen noch die Azimuthe durch Repetition beobachtet wurden, sondern nur einfache Beobachtungs - Resultate sind. Der 12zollige Kreis, womit wir die Höhen beobachteten, gibt unmittelbar 4" an. Der 8zollige Theodolite, an welchem *Werner* zu gleicher Zeit die Azimuthe nahm, gibt 10". Allein gegenwärtiger Versuch wird dennoch zeigen, was man von dieser Methode zu erwarten hat, wenn man die Beobachtungen unter günstigern Umständen und mit größern Werkzeugen bewerkstelligen wird.

Da die Sonne unser Vergleichungs - Gestirn ist, so war unsere erste Sorge die Fehler unserer Sonnen - Tafeln zu bestimmen; und da wir solche täglich am Mittags - Fernrohr beobachten, so war es leicht, diese Verbesserung vorzunehmen. Wir verglichen daher die Sonnen - Beobachtungen vom 30. Januar bis zum 2. Februar mit unsern Sonnen - Tafeln, und fanden ihren mittlern Fehler, wie hier zu sehen ist.

1813	Mittl. Z.	Beobachtete Länge der ☉	Berechnete Länge der ☉	Fehler der Tafeln	Beobachte gerade Auf- steigung der ☉
	U	Z	Z		Z
Jan. 30	13 41,2	10 10 17 22,13	10 10 17 19,64	+ 2,49	10 12 44 33,30
31	13 50,48	10 11 18 20,28	10 11 18 14,34	+ 5,94	10 13 45 4,20
Febr. 1	13 58,84	10 12 19 10,59	10 12 19 7,83	+ 2,76	10 14 47 16,05
2	14 6,50	10 13 20 4,45	10 13 20 2,05	+ 4,38	10 15 48 20,25
Mittlere Fehler				+ 3,90	

Zu den folgenden Beobachtungen haben wir demnach die durch diesen mittlern Fehler verbesserten Sonnen-Örter der Tafeln gebraucht, und mit Zuziehung der scheinbaren Schiefe der Ecliptik $= 23^{\circ} 27' 42,44''$ die Polar-Distanzen der Sonne für den wahren Mittag nachstehender Tage berechnet.

Den 31 Januar . .	107° 24' 9,37
1 Febr. . .	107 7 13,81
2 — . . .	106 50 0,46

Unser zweytes Geschäft war, die Collimations-Fehler unserer beyden Werkzeuge zu bestimmen, dies thaten wir vermittelst der Sonne, und im Laufe der Beobachtungen mehrmalen, wie aus folgender Tafel zu ersehen ist.

Wir haben aus allen diesen gefundenen Collimationsfehlern kein arithmetisches Mittel genommen, sondern jeden einzeln an die diesen Bestimmungen zunächst liegenden Beobachtungen angebracht, aus der Ursache, weil bey jeder neu angehenden Reihe von Beobachtungen die Stellungen der Instrumente von neuem untersucht und verbessert worden sind, aufser wenn beyde Sonnen Ränder beobachtet worden sind, wie dies bey den letzten beyden Höhen-Beobachtungen geschehen ist, wo das Instrument alsdann unberührt stehen blieb, daher auch nur bey diesen beyden Beobachtungen das Mittel aus diesen Collimationsfehlern genommen worden ist, welche aber nie, wie man sieht, über 4" von einander verschieden waren.

Hier folgen nun die wirklichen Höhen- und Azimuth-Beobachtungen der Hörn-Spitzen, welche wir als

Anzahl der Beobacht.	Wahre Sonnenzeit 31. Januar 1813.	Beobachtete und durch Refract. und Fernallaxeverbesserte Höhen der Ränder	Berechnete wahre Sonnen-Ränder	Collimat. Fehler des Kreises	Beobachtetes Azimuth der von Süd nach Osten gezählt	Berechn. Azimuth der Sonnen-Ränder	Collimat. Fehler des Theodoliten
1	21 8' 24" 35	18' 13" 12, 2 ob. \odot R.	18' 10" 22, 3	-2' 49, 9	49° 17' 0" W. \odot R.	42° 50' 3, 1	-6' 26' 56, 9
2	21 11 54, 77	18 39 16, 6	18, 36 24, 3	-2 52, 3	48 31 30	42 4 45, 6	-6 26 44, 4
3	21 15 18, 02	19 3 48, 5	19 1 11, 3	-2 37, 2	47 47 30	41 20 41, 0	-6 26 49, 9
4	21 23 22, 39	20 1 29, 10	19 58 48, 3	-2 40, 7	46 1 15	39 34 17, 1	-6 26 57, 9
5	21 25 13, 39	19 41 48, 5 untr. \odot R.	19 39 12, 7	-2 35, 8	.	.	.
	21 27 24, 73	20 29 32, 9 ob. \odot R.	20 26 52, 3	-2 40, 6	45 42 0 öst. \odot R.	39 15 2, 1	-6 26 57, 9
	21 29 49, 83	20 13 28, 9 untr. \odot R.	20 10 52, 7	-2 36, 2	.	.	.

Der Barometer-Stand 28 Zoll 0, 10 Pariser Maass. Thermometer + 8, 0 Réaumur.

als so viele Punkte an der Peripherie der Mondscheibe angesehen, und auch so berechnet haben, wie folgende Darstellung zeigt;

	Wahre Sternzeit	Mittlere Sonnen-Zeit	Beobacht. und durch den Collim. Fehler verbesserte Azimuthe	Beobacht. und durch Collimat. Fehler ver- besserte Ze- nith-Diff.	Strahlen- brechung nach Carlini	Höhen- Parallaxe d. Mondes in 1 ^{er} Erd- Abplat- tung	Wahre Zenith- Distanz	C Horn
1	18 ^U 8' 17, 45 21 ^U 23' 35, 37 42° 52' 8, 1	18 9 22, 65 21 24 40, 39 42 54 18, 1	72° 10' 17, 9	+3' 0, 0	-54° 56, 2	71° 18' 21, 7	I	I
2	18 11 40, 66 21 27 58, 03 42 10 20, 6	71 47 19, 9	+2 56, 1	-54 49, 0	70 55 27, 0	II	I	
3	18 12 43, 87 21 29 1, 06 42 11 30, 6	71 23 22, 3	+2 52, 0	-54 41, 6	70 31 32, 7	II	I	
4	18 15 3, 48 21 30 20, 29 41 27 46, 0	71 20 19, 2	+2 51, 5	-54 40, 7	70 28 30, 0	I	I	
5	18 15 54, 69 21 31 11, 36 41 30 11, 0	71 0 41, 2	+2 48, 5	-54 34, 3	70 8 55, 4	II	I	
6	18 22 56, 74 21 38 12, 26 39 47 32, 1	70 23 24, 2	+2 42, 9	-54 22, 1	69 31 45, 0	I	I	
7	18 23 39, 74 21 38 55, 14 39 47 2, 1	70 8 2, 2	+2 40, 7	-54 16, 9	69 16 26, 0	II	I	
8	18 27 17, 26 21 42 33, 07 38 52 2, 1	69 52 16, 4	+2 38, 3	-54 11, 6	69 0 43, 1	I	I	
9	18 28 4, 26 21 43 18, 94 38 47 37, 1	69 39 32, 4	+2 36, 5	-54 7, 1	68 48 1, 8	II	I	

Aus

XV. Neue Art Sonnenfinsternisse zu beobachten. 161

Aus diesen wahren Höhen oder Zenith-Distanzen und Azimuthen, lassen sich nunmehr die wahren geraden Aufsteigungen und Abweichungen, und daraus ferner die wahren Längen und Breiten dieser Mondrands-Puncte berechnen; es bleibt uns nur noch übrig zu zeigen, wie man von diesen Randpuncten auf den Mittelpunct des Mondes gelangt, welches auf folgende Art geschehen kann. Alle weitläufige sphäroidische Parallaxen-Rechnungen fallen hier ganz weg, weil diese schon in der Hypothese der Erd-Abplattung von $\frac{1}{316}$ ganz einfach, so wie die wahre Refraction an die beobachteten Höhen angebracht worden sind, wodurch man alsdann die wahren Längen und Breiten des Mondes erhält.

Es sey $TEAIBCD$ die Projection der Ecliptik, $FGHE$ die des Breitenkreises. λ' ein Randpunct des Mondes bey der ersten, und λ'' ein solcher Punct bey der zweyten Beobachtung. C, C' , der jeder Beobachtung angehörige Ort des Mittelpuncts des Mondes. Um den Punct λ' der ersten Beobachtung auf die Zeit der zweyten Beobachtung, das ist auf λ'' zu bringen, so muß man erstlich an die beobachtete Längen-Differenz $\tau B - \tau A = BA$, die Bewegung des Mondes in der Länge für die Zeit anbringen, welche zwischen den beyden Beobachtungen verfloßen ist $= AI = DC$, so erhält man die Seite $BI = i\lambda''$, welche, wenn man sehr streng seyn will, mit dem Cosinus der halben Summe der beyden Breiten multiplicirt werden muß, um sie auf die Ecliptik zu reduciren. Im Grunde kann man diese Reduction ganz vernachlässigen, da die Monds-Breiten bey Sonnenfinsternissen immer sehr klein sind.

sind, und man in diesen Fall die scheinbaren Breiten für die wahren, und λ' für λ'' gelten lassen kann. Desgleichen muß man an die beobachtete Breiten-Differenz $EF - EG = FG$ die Bewegung des Mondes in der Breite $GH - gh$, für dieselbe Zwischenzeit anbringen, so erhält man $FH = i\lambda''$.

Diese beyden also erhaltenen Seiten $i\lambda''$ und $i\lambda'''$ bilden ein in i rechtwinkliches Dreyeck, in welchen man den Winkel x und die Hypothenuse $\lambda'' \lambda'''$ findet, welche die Basis eines gleichschenkligen Dreyecks $\lambda'' C' \lambda'''$ wird, davon die beyden Schenkel die wahren Halbmesser des Mondes sind. Zieht man aus dem Mittelpuncte C' eine senkrechte Linie $C'n$ auf diese Basis, so zerfällt dies Dreyeck in zwey andere gleiche und rechtwinklichte. Im Dreyecke $C'n\lambda''$ kennt man die Seite $C'\lambda'' =$ dem wahren Mond-Halbmesser, und die halbe Basis $\lambda''n$, damit findet man den Winkel $C'\lambda''n = z$, von welchem der vorhin gefundene Winkel x abgezogen, den Winkel y übrig läßt, womit man im rechtwinklichten Dreyecke $\lambda' C' m$, und mit der bekannten Seite $C'\lambda''$, die Seite $C'm$, Reduction der Länge des Randpunctes λ'' auf den Mittelpunct C' des Mondes; und die Seite $\lambda''m$, Reduction der Breite dieses Punctes auf denselben Mittelpunct findet.

Die bequemsten Formeln, womit man diese kleinen Reductionen am kürzesten berechnen kann, sind folgende; wir setzen zugleich ein Beyspiel der Anwendung auf unsere erste Beobachtung her. Der Berechner wird übrigens wohl daran thun, sich jederzeit eine Figur zu entwerfen, um die verschiedenen Fälle zu unterscheiden, welche bey nördlichen oder südli-

XV. Neue Art Sonnenfinsternisse zu beobachten. 163

füdlichen, bey zunehmenden oder abnehmenden Mondsbreiten vorkommen können, und bald die Summe, bald die Differenz der Winkel und Gröſſen erheiſchen.

Es ſey λ' , λ'' , λ''' die Breiten der beobachteten Punkte, r der wahre Halbmefſſer des Mondes, ſo iſt

$$1) \frac{d \text{ long. cos. } \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'')}{d \text{ Lat.}} = \text{Tang. } x$$

$$2) \frac{d \text{ long. cos. } \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'')}{2r \sin. x} = \cos z$$

$$3) z - x = y$$

$$4) C'm = \frac{r \sin. y}{\cos \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'')} = \text{Reduct. d. Länge}$$

$$5) m\lambda'' = r \cos. y = \text{Reduct. der Breite.}$$

Die Rechnung dieſer Reductionen des erſten Paares Beobachtungen ſtehet alſo:

Beobachtete Länge;

Des erſten Horns . .	=	312° 2' 39,"1	=	T A
des zweyten	=	312 13 44, 7	=	T B
Differ. = . . .		11 5, 6	=	A B
Beweg. d. Länge d. ☾ für 1' 5"	=	57, 4	=	A I = C D
		10' 28,"2	=	B I = i\lambda'''
		628, 2		

Beobachtete Breite;

Des erſten Horns	=	0° 37' 18,"7	=	GE = \lambda' A
des zweyten	=	0 55 37, 6	=	FE = \lambda'' B
Diff.		18 18, 9	=	FG
Beweg. d. Breite für 65"	=	3, 4	=	GH = gh
		18' 22,"3	=	FH = i\lambda''
		1102,"3		

Log.

$$\text{Log. } d \text{ long} = i \lambda''' = 628, "2 \quad 2.79810$$

$$\text{log cos } \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'') = 0080^{\circ} 46' \quad 9.99996$$

$$2.79806 \quad 2.79806$$

$$\text{log } d \text{ lat.} = i \lambda'' = 1102, "3 \quad . . \quad 3.04230 \quad \text{l.c. } A. 2 \quad . . \quad 9.69897$$

$$\text{Log tang } \alpha = 9.75576 \quad \text{l.c. } Ar = 944, "7 = 7.0471$$

$$\alpha = 29^{\circ} 41' \quad \text{l.c. } A. \sin \alpha \quad 0.30521$$

$$\text{log cos } z \quad 9.82695$$

$$z = 47^{\circ} 50'$$

$$\alpha = 29 \quad 41$$

$$y = 18^{\circ} 9'$$

$$\text{l. } r = 944, "7 \quad 2.97529$$

$$\text{log } r \quad 2.97529$$

$$\text{l. sin } y \quad 9.49347$$

$$\text{l. cos } y \quad 9.97784$$

$$\text{l.c. } A. \cos \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'') \quad 0.00004$$

$$\text{l. } m \lambda'' \quad 2.95313 = 897, "7$$

$$\text{l. } C'm \quad 2.46880 = 294, "4$$

$$C'm = + 4 \quad 54, "4$$

$$m \lambda'' = - 14' 57, "7$$

Beob. Länge des II. Horns $312^{\circ} 13' 41, "7$ Breite II. Horn $= 0^{\circ} 55' 37, "6$ nörd.

Beob. Länge d. Mittelp \mathcal{C} $312 \quad 18 \quad 39, "1$ Breite \mathcal{C} $. 0 \quad 40 \quad 39, "9$ —

Berechnete Länge des \mathcal{C} $312 \quad 18 \quad 32, "0$ berechn. Breite $0 \quad 40 \quad 50, "1$ —

Fehler der Tafeln in der Länge $+ 7, "1$ $. . .$ in der Breite $- 10, "2$ —

Diese Berechnungen bey allen Beobachtungen ausgeführt, geben folgende Resultate:

Monds- Hörner	Beob. wahre gerade Aufsteigung	Beobacht. wahre Ab- weichung südl.	Beobachtete wahre Länge	Beobacht. wahre Breite	Wahrer Halb- messer des C	Reduct. auf C Centr. der Länge der Breite
I	314° 19' 47,8"	16° 36' 1,3"	312° 2' 39,1"	10° 37' 18,7"	• • •	• • •
II	314° 25' 35,2"	16° 15' 20,7"	312° 13' 44,7"	10° 55' 37,6"	15° 44,7"	+ 4' 54,4"
I	314° 21' 54,4"	16° 35' 2,2"	312° 4' 52,1"	10° 37' 41,8"	• • •	• • •
II	314° 27' 0,0"	16° 15' 3,1"	312° 11' 59,7"	10° 55' 3,9"	15° 44,7"	+ 5' 57,2"
I	314° 23' 13,3"	16° 33' 46,7"	312° 6' 25,8"	10° 38' 33,3"	• • •	• • •
II	314° 27' 50,4"	16° 15' 4,6"	312° 15' 41,7"	10° 54' 39,9"	15° 44,8"	+ 6' 49,4"
I	314° 26' 51,9"	16° 31' 1,7"	312° 10' 33,1"	10° 40' 13,3"	• • •	• • •
II	314° 29' 26,1"	16° 17' 52,1"	312° 16' 35,3"	10° 52' 10,3"	15° 44,8"	+ 10' 4,6"
I	314° 23' 57,9"	16° 23' 48,3"	312° 13' 6,3"	10° 41' 47,7"	• • •	• • •
II	314° 30' 38,7"	16° 19' 36,4"	312° 17' 13,1"	10° 50' 10,7"	15° 44,9"	+ 11' 58,3"
						- 10' 13,9"

Diese Reductionen auf den Mittelpunct des Mondes an die beobachteten Längen und Breiten der Randpuncte angebracht, und mit jenen verglichen, welche aus den neuesten vom Pariser Bureau der Longitudes 1812 herausgegebenen, und von Burckhardt redigirten Monds-Tafeln, berechnet worden, geben folgende Fehler dieser Tafeln:

Mittel.

Mittl. Sonnen- Zeit	Beobachtete Länge des Centr. C	Beobachtete Breite des Centr. C N.	Berechnete Länge des Centr. C	Berechnete Breite des Centr. C N.	Fehler der Monds- Tafeln
21 ^U 24	40° 39' 312"	18' 39,1"	0° 40' 39,9"	312" 18' 33,0"	+ 7,1
21 29	1, 06 312	20, 56, 9 0	40 29, 3 312	20 59, 4 0	- 10, 2
21 31	11, 36 312	22 31, 1 0	40 28, 9 312	22 13, 4 0	- 7, 2
21 38	55, 14 312	26 39, 9 0	40 4, 3 312	26 33, 6 0	- 17, 7
21 43	18, 94 312	29 11, 4 0	39 56, 8 312	29 3, 0 0	+ 6, 3
					+ 8, 4
					+ 4, 5

Der mittlere Fehler dieser Monds-Tafeln wäre demnach + 0,3 in der Länge, und — 3,0 in der Breite, welches auch in der That den höchst wahrscheinlichen Fehler dieser Tafeln, oder richtiger, die große Vollkommenheit derselben, sowohl als die leichten Resultate unserer Beobachtungen anzeigt.

Minder Werth hat das beobachtete Ende dieser Finsternis, welches wir bey sehr wahrer Bewegung des Sonnen-Randes mit einem dreyfüßigen Achromaten um 21^U 46' 52,86 mittl. Sonnenzeit bemerkten. *Werner* schätzte dies Ende mit einem geringern Fernrohre acht Secunden früher.

XVI.

Bestimmung des Azimuths von Altomünster, und dadurch der Lage des Meridians auf dem nördl. Frauenthurm zu München. Von *J. Soldner*, königl. Bayer. Steuer-Rath und Mitglied der Acad. der Wissenschaften. Herausgegeben auf Befehl der Kön. B. unmittelbaren Steuer - Cataster-Commission. München 1813.

Bey grossen Länder-Vermessungen, wo die Richtigkeit des Ganzen und die Lage aller darinnen begriffenen Punkte, von der astronomischen Bestimmung des Central-Ortes abhängt, ist es von der grössten Wichtigkeit, diese vollkommen genau zu kennen. Wünschenswerth ist es daher, daß die Elemente für Länge, Breite und Azimuth des Ortes auf den sich alle andere beziehen, im Detail mitgetheilt werden, um dadurch jeden Astronomen und Geographen für den der Gegenstand von Wichtigkeit ist, in Stand zu setzen, sich selbst von der Genauigkeit des gebrauchten Verfahrens und des daraus hergeleiteten Resultats überzeugen zu können. Eine solche Darstellung liegt jetzt vor uns, und wir eilen, deren wesentlichen Inhalt unsern Lesern mit dem Wunsche mitzutheilen, daß jeder, dem ähnliche Länder-Vermessungen obliegen, die astronomischen Normal-Bestimmungen auf eben die Art bekannt machen

machen möge, wie es hier von *Soldner* in Hinsicht des die bayerische Vermessung orientirten Azimuths geschieht.

Früher hatte man sich bey der *Steuer-Cataster-Commission* in München des Azimuths von Aufkirchen bedient, welches im Jahre 1802 von *Henry* zu $48^{\circ} 59' 53''$ bestimmt worden war. Erst aus dem neuerlich erschienenen Bande der Münchner Gedenkschriften*) wurde der Verf. mit dem Detail dieser Beobachtungen bekannt, die ihm bey wiederholter Berechnung, wobey die Sonnenlängen nach *Zach's* neuen Tafeln, die Schiefe nach *Delambre* angenommen wurde, folgende Werthe für das benannte Azimuth gaben.

A.	48°	59'	32"	L.	48°	59'	54"
B.	48	59	34	M.	48	59	55
C.	48	59	37	N.	49	1	16
D.	48	59	46	O.	49	1	14
E.	49	0	7	P.	49	1	18
F.	49	0	21	Q.	48	59	31
G.	49	0	30	R.	48	59	35
H.	49	0	48	S.	48	59	18
I.	48	59	42	T.	48	59	31
K.	48	59	43				

Die Differenz dieser Resultate mit den vom Hrn. Director *Seyffert* daraus hergeleiteten **) liegt darinnen,

*) Denkschriften der kön. Acad. der Wissenschaften in München. Für die Jahre 1811 und 1812, pag. 505.

**) Ebendaf. pag. 520.

innen, daß letzterer den Halbmesser der Sonne, nicht gleich zu dem zwischen dem Thurne von Aufkirchen und dem Sonnenrande schief gemessenen Winkel, wie es hätte geschehen sollen, sondern erst zu dem auf den Horizont reducirten Winkel addirt hat, wodurch die Resultate unrichtig werden mußten.

Die starken Sprünge in diesen *Henry'schen* Azimuthal-Bestimmungen, die wahrscheinlich durch unregelmäßigen Gang der Uhr herbey geführt wurden, veranlaßten, auf einen darüber vom Verfasser erstatteten Bericht, die Kön. Bayerische Cataster-Commission letztern den Befehl, zu einer neuen Messung dieses Azimuths zu geben. Da *Soldner* im Voraus vermuthen konnte, daß auf dem *Frauenthurm* (von wo aus die Bestimmung gemacht werden sollte) wo häufig geläutet wird, mit seiner Reise-Pedeluhr schwerlich eine scharfe Zeitbestimmung zu erhalten seyn werde, so wählte er zu seiner neuen Azimuthal-Bestimmung, die größten Digressionen des *Polaris*, wo jene ein minder wesentliches Element ist. Der Erfolg rechtfertigte jene Vermuthung vollkommen, indem die Pendeluhr durch das Läuten mehreremal zum Stillstehen gebracht wurde, so daß die Beobachtungen daran ganz aufgegeben und an einem von Herrn *Salinenrath v. Reichenbach* hergegebenen *Auch'schen* Chronometer gemacht werden mußten. Zwar hatte auch dieser keinen sonderlichen Gang; allein dies konnte auf die Resultate der Beobachtungen gar keinen wesentlich störenden Einfluss haben, da bey diesen immer die Vorsicht gebraucht wurde, daß die größte Digression nahe in die Mitte

der Beobachtungen fällt, wodurch der Fehler der Zeitbestimmung gewissermaßen eliminirt wird.

Zu den Beobachtungen selbst wurde ein multiplicirender *Reichenbach'scher* Horizontalkreis von einem Pariser Fuß Durchmesser gebraucht, der unmittelbar horizontale Winkel angibt, so daß die Strahlenbrechung keinen Einfluß hat, und mit dem ein zweyjähriger Gebrauch den Verf. vollkommen vertraut gemacht hatte. Ueber die Rectificationen des Instruments lassen wir des Verfassers eigne Worte hier folgen:

”Von Fehlern der Zeitbestimmung, heist es hier, S. 11, hatte ich also nichts zu befürchten, aber ein anderer Umstand trat ein, welcher die größte Vorsicht erforderte; es war die Bewegung des einem Passagen-Instrumente ähnlichen Fernrohres des Horizontalkreises im Vertical. Da in unsern Gegenden der Polarstern in einer bedeutenden Höhe erscheint, so hat ein geringer Fehler in der Vertical-Bewegung des Fernrohres beträchtlichen Einfluß auf den Horizontalwinkel. Es würde unnöthig seyn hier zu zeigen, wie man die Vertical-Bewegung des Fernrohres herstellt; denn da dieses Fernrohr im Grunde nichts anders ist, als ein kleines Passagen-Instrument, so ist die Art, wie es berichtigt werden muß, bekannt, nur muß ich sagen, welche Vorsicht ich hierinnen angewendet habe.”

”Die Corrections-Schrauben an den *Reichenbach'schen* Instrumenten sind bekanntlich von der größtmöglichen Feinheit. Da aber mein Passagen-Instrument nur 16 Zoll lang ist, so stehen diese Schrauben doch noch in einem zu großen Verhältniß zu der

der Länge des Rohres, als das man hoffen könnte, die Rectification bis auf ein paar Secunden zu treffen. Ich sah daher voraus, das wenn ich mein Instrument nur ein für allemal rectificirte, ich ohnegachtet aller Sorgfalt nie sicher seyn würde, ob nicht ein Fehler von einigen Secunden übrig geblieben wäre, der einen constanten Fehler in die Beobachtungen bringt, und beschloß daher das Instrument jeden Tag vor der Beobachtung ganz neu zu rectificiren. Ich verstellte absichtlich alles; Niveau, Unterlage der Zapfen, (d. h. Horizontalität der Rotations-Axe des Fernrohrs) und Fadenkreuz (optische Axe), und corrigirte es wieder so genau, als mir möglich war. Bey dieser Rectification wurde übrigens keine Vorsicht verabsäumt. Ich blieb z. B. nie zu lange am Instrumente stehen, um es nicht theilweise zu erwärmen, ich ließ dem Niveau viele Zeit, sich vollkommen einzuspielen, weil ich aus Erfahrung weiß, das ein sehr empfindliches Niveau längere Zeit gebraucht, bis es zur wahren Ruhe kömmt; außerdem gibt es nur Momente, wo es in einer scheinbaren Ruhe ist und dadurch sehr nachtheilige Täuschung verursacht. Durch dieses Verfahren habe ich den Vortheil erhalten, das erstens die Rectificationsfehler, welche noch übrig blieben, durch die Resultate nothwendig zum Vorschein kommen und mir bekannt werden mußten, und dann läßt sich ja erwarten, das sie nicht jedesmal auf dieselbe Seite fallen und sich daher aufheben werden."

Das diese so nothwendigen Vorsichtsmafsregeln einen glücklichen Erfolg hatten, zeigt die schöne Uebereinstimmung der erhaltenen Resultate, deren

zelle von dem mittlern aus allen, nirgends über 5° abweichen. Vollkommen stimmen wir dem Verf. bey, wenn er in der Rectification der Instrumente und ihrer zweckmäßigen Behandlung den Haupttheil der Beobachtungskunst setzt, indem hierzu offenbar mehr Kenntniß, Erfahrung und practische Geschicklichkeit erfordert wird, als zu dem bloßen Beobachten der Appulse und Ableßen der Winkel gehört. An neun Tagen wurde der Horizontal Winkel zwischen dem Thurme von Altomünster und dem Polarstern in der Nähe der größten Digression gemessen, und daraus folgende Resultate berechnet:

Tage	Azimuth	Zahl der Beob.
30 März	40° 6' 21,"5	15
31 —	24, 2	21
7 April	28, 1	23
8 —	23, 7	22
9 —	19, 4	22
10 —	23, 0	20
11 —	16, 4	18
12 —	17, 2	16
13 —	19, 4	22
Mittel	40° 6' 21,"4	

Aus dem Dreyecksnetz folgt der Winkel zwischen Altomünster und Aufkirchen $89^{\circ} 6' 29,"4$ und hiernach Azimuth von Aufkirchen vom nördlichen Meridian nach Osten gezählt

$$49^{\circ} 0' 8,"0$$

oder wenn die Beobachtung vom 7. April als etwas zu stark abweichend, ausgeschlossen wird

$$49^{\circ} 0' 8,"8.$$

Die

Die große Zahl von Beobachtungen, auf welche sich dieses Resultat gründet, die Vortrefflichkeit des Instruments, die große Sorgfalt des Beobachters, und die genaue Uebereinstimmung dieser Bestimmung, mit dem früher von dem Freyherrn v. Zach erhaltenen Werth dieses Azimuthes (*M. C.* Bd. XXV S. 334) berechtigen zu der Ueberzeugung, daß die Genauigkeit dieses Azimuths in den Grenzen weniger Secunden eingeschlossen seyn muß, und daher dem 24" hiervon abweichenden Resultat des Herrn Director Seyffert vorzuziehen ist. Für die Reduction des gemessenen Azimuthes auf die Zeit der größten Digression, findet der Verf. auf einem ihm eigenthümlichen Wege den Ausdruck

$$\Delta\alpha = -7,5 \sin 15'' \cdot \frac{\sin \alpha \sin \delta}{\sin t} \cdot \Delta t^2 \\ + 7,5 \sin^2 15'' \cdot \frac{\sin \alpha \sin \delta}{\sin t} \cdot \cotg t \Delta t^3$$

wo Δt , Abstand des Beobachtungsmomentes von der Zeit der größten Digression in Zeit-Secunden ausgedrückt seyn muß, α = Azimuth des Sterns, t Stundenwinkel, δ Abweichung des Sterns. Das zweyte Glied dieses Ausdrucks kann fast immer vernachlässiget werden, da es bey $\Delta t = 40'$ nur 1" beträgt.

Der Verf. gibt diesem Ausdruck eine noch bequemere Gestalt, indem er ihn auf die Form

$$\Delta\alpha = - \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2} \Delta t}{\sin 1''} \cdot \frac{\sin \alpha \sin \delta}{\sin t}$$

bringt, dessen erster variabler Factor derselbe, wie in der bekannten Reductions-Formel der Zenith-Distan-

Distanzen ist, und von dessen Werthen in der *Baſe du ſyſtème métrique* Tom. II pag. 244 eine berechnete Tafel ſich befindet. Der groſſe Nutzen und die Nothwendigkeit dieſer Tafel für alle, die mit *Reichenbach'schen* Kreiſen beobachten, hat den Verfaſſer veranlaſt, einen Abdruck davon der vorliegenden Schrift beyzufügen, wodurch dieſe ein noch generelleres Intereſſe erhält, als es ſchon der eigentliche Gegenſtand der Abhandlung ſelbſt gewährt,

Die Rechnungs-Elemente zu ſeiner Azimuthal-Bestimmung entlehnte *Soldner* aus *von Zach's* und *Oriani's* Beſtimmungen; die \mathcal{R} des Polaris wurde nach Erſtern angenommen, die Declination aber aus des Letztern Beobachtungen mit dem dreyfüßigen *Reichenbach'schen* Kreiſe hergeleitet. Die Reſultate waren folgende:

1813 Tag	\mathcal{R} Polaris	Declin	Azim.	Stunden- Winkel
März 30	^h 54' 48"	88° 18' 38,4"	31° 55,0'	88° 6' 50"
April 1	48	37,8	31 55,9	6 49
— 7	48	36,0	31 58,6	6 47
— 9	48	35,5	31 59,4	6 46
— 11	48	34,9	32 0,3	6 46
— 13	49	34,3	32 1,2	6 45

Die Poſitionen ſind ſcheinbar, wobey jedoch die Solar-Nutation unberückſichtigt geblieben iſt.

Lebhaft wünſchen wir, daſſe Hr. *Soldner* fortfahren möge, mit gleicher Genauigkeit und Sorgfalt geodätiſch-aſtronomiſche Beſtimmungen zu machen, und deren Reſultate, ſo wie hier geſchehen, mitzutheilen.

XVII.

Darstellung der Höhen verschiedener Berge, Flüsse und Orte Schlesiens. Von *Toussaint von Charpentier*, königl. preuss. Oberbergrathe etc., mit einem illuminirten Kupfer. Breslau 1812.

Schon öfterer haben wir uns über den Nutzen von Höhenbestimmungen in physisch-geographischer Hinsicht erklärt, und vorzüglich Nivellements ganzer Bergrücken den Freunden der Wissenschaft empfohlen. Eine solche Arbeit liegt jetzt vor uns, von der wir unsern Lesern eine Uebersicht mittheilen wollen. Die Nachrichten, welche wir hier über die Höhe des Riesengebirges und über die dortigen Fluss-Abdachungen erhalten, sind ungemein interessant, und geben eine bessere Uebersicht der ganzen Conformation jener ausgedehnten Gebirgskette, als eine weitläufige Beschreibung zu gewähren vermöchte. Zwar besitzen wir über dieses nördliche europäische Hauptgebirge schon mehrere schätzbare Schriften, und namentlich enthält die auch von Hrn. v. *Charpentier* mit verdientem Lobe angeführte Schrift von *Hofer* *) mehrere hierher gehörige Bestimmungen; allein

*) *Hofer* Reise ins Riesengebirge.

allein theils sind diese vom Verf. vermehrt und vervollständigt, und dann hauptsächlich auf eine zweckmäßige Art in ein *Ganzes* vereinigt worden, so daß durch die vorliegende Schrift und das dabey befindliche Tableau eine sehr befriedigende Uebersicht des Ansteigens und Abfallens dieser Bergreihe gewährt wird.

In einer gut geschriebenen Einleitung setzt der Verfasser die Vorthelle der heutigen Ansicht und Behandlungsart der Naturkunde auseinander, wo nicht mehr jeder einzelne Theil isolirt bleibt, sondern alle, gleich Zweigen eines Baumes, sich in einem gemeinschaftlichen Stamme vereinigen. Wir sind vollkommen damit einverstanden, daß die jetzt so rühmliche Tendenz der Naturforscher, alle einzelne Lehren immer mit Hinsicht auf das ganze Gebäude zu bearbeiten, reelles Bedürfnis ist und war, um die Wissenschaft auf einen höhern Standpunct zu bringen; allein läugnen wollen wir es nicht, daß wir in dieser an sich schönen Ansicht und in dem herrschenden Geist des Generalisirens eine Klippe sehen, an der minder gründliche Gebildete, von ungeläuterter Neuerungs- und Erfindungsfucht beseelte Naturforscher nur zu häufig scheiterten, und dadurch auf die unsern Zeitalter und unserer Nation eben nicht zur Ehre gereichenden transcendenten Naturphilosophie, im bösen Sinne der an sich so edeln Wissenschaft geleitet wurden. Recensent kann sich einer sehr unmuthigen, fast wehmüthigen Empfindung nicht erwehren, wenn er bedenkt, wie diese Wissenschaft, der *Newton* ein unsterbliches Werk weihte, in dem heut zu Tage mit dem Wort "*Natur-*
philo-

philosophie“ gewöhnlich verbundenen Sinne. entartet ist, und wenn er sieht, wie die Schöpfer dieser neuen Lehre mit einer wahrhaft wunderbaren Selbstzufriedenheit, verachtend auf das Werk des edlen Britten herablehen, dessen Geist, wir glauben uns nicht zu irren, ganz sicher von keinem der heutigen sogenannten Naturphilosophen gefaßt und begriffen wird. —

Alle in der vorliegenden Schrift mitgetheilte Höhenbestimmungen sind nicht neu, indem beynahe der grössere Theil davon den Herrn von Gersdorf, General Lindner und Professor Jungnitz angehört. Gewünscht hätten wir es, daß der Verfasser die Formel angegeben hätte, nach der er seine barometrischen Beobachtungen berechnet hat, um so mehr, da wir unter den S. 8 genannten Schriften über diesen Gegenstand, alle neuere Bearbeitungen vermissen,

Von allen ihrer Höhe nach bestimmten Punkten des Gebirges, werden zugleich in der Schrift auch die hauptsächlichsten mineralogisch-geognostischen Bestimmungen beygebracht, und auf der Karte die constituirenden Gebirgsarten durch Illumination angezeigt. Auf einem Auszug in dieser Hinsicht können wir uns hier nicht einlassen, da der Zweck dieser Blätter blos Aushebung des zur eigentlichen mathematischen Geographie gehörigen gestattet, wohin wir die Höhenbestimmungen der Gebirge und Flussthäler rechnen. Für die erstern finden wir hier folgende Angaben:

Namen

Namen der Berge	Höhe über der Meer- esfläche
	Par. Fufs.
1 Der Annaberg in Oberschlesien	1422
2 der Zobtenberg	2318
3 der Ruhberg	803
4 der Kleitschberg	1508
5 die Stadt Reichenstein	1183
6 der Jauersberg	3000
7 das Bad zu Landeck	1408
8 der schwarze Berg	3605
9 der Mittelberg	3666
10 der groſſe Schneeberg	4300
11 der kleine Schneeberg	3876
12 das Kammkoppel	4004
13 die Klappersteine	3456
14 der Spitzberg bey Wölfelsdorf *)	2517
17 die Hahnkoppe daſelbſt	2295
18 das Neſſelgrunder Fort	2113
19 das Bad zu Reinerz	1678
20 der Hummels	2402
21 die Seefelder **)	2858
22 die hohe Menſe	3242
23 der Spiegelberg	2803
	24*

*) Nahe dabey befindet ſich der ungemein romantiſche Wölfelsfall, wo der Wölfelsbach, eingengt durch ſteile Felſwände, ſich ohne Abſatz 50 Par. Fuſs tief, in einen Felſenkessel ſtürzt.

**) Wahrscheinlich Reſte eines ehemaligen Sees; der Boden, der einen Flächeninhalt von 400 Magdeburger Morgen Landes hat, beſteht jetzt noch aus Morast und kleinen Seen. In der Tiefe des dortigen Dorfgrundes, werden oft groſſe Baumſtämme angetroffen.

XVII. Darstellung d. Höhen verschiedener Berge etc. 179

Namen der Berge.	Höhe über der Meer- esfläche
	Parif. Fufs
24 der Carlsberg	2542
25 die Heufcheuer *)	2893
26 die Stadt Wünschelburg	1492
27 die Stadt Neurode	1200
28 der Ottenstein	2618
29 die Sonnenkoppe	2840
30 die hohe Eule	3036
31 der Glaferberg	2777
32 die Stadt Waldenburg	1359
33 der Hochwald	2699
34 der Hochberg	1930
35 die Stadt Gottesberg	1729
36 der Buchberg bey Landshut	2410
37 die Stadt Landshut	1254
38 der Landshuter Berg	2233
39 die Friesensteine	2888
40 die Stadt Schmiedeberg	1388
41 der Molkenberg	2884
42 die schwarze Koppe	4302
43 die Riefenkoppe	4950
44 die kleine Koppe	4331
45 der Seifenberg	4476
46 die Hempelsbaude	3839
47 der grofse Teich	3786
	48 Das

*) Eine hohe über 100 Fufs fenkrecht sich erhebende Felsenwand. Einige in neuern Zeiten dort angelegte Gänge, Treppen und Brücken, machen es jetzt möglich, auch den allerhöchsten Gipfel der Heufcheuer zu ersteigen.

Namen der Berge	Höhe über der Meeresfläche
	Parif Fufs
48 das Dorf Ober-Brückenberg	2293
49 die Sturmhaube	4540
50 das groſſe Rad	4707
51 der Rand der kleinen Schneegrube *)	4488
52 der Reifträger	4280
53 die Tafelfichte	3379
54 das Flinsberger Bad	1542
55 Meffersdorf	1336
56 der Kynaſt	1812
57 die Stadt Hirschberg	1092
58 die Falkenberge bey Fiſchbach	2037
59 die Bergſtadt Kupferberg	1580
60 der Ochfenkopf	2744
61 der Bleiberg	2256
62 der Kitzelberg	2033
63 der Graditzberg	1255
64 der Heſſenberg	1316
65 die Stadt Breslau	400

Die Angabe von Breslau gilt für den dortigen Marktplatz.

Der zweyte Theil der vorliegenden Schrift beschäftigt ſich mit der Erklärung, des auf der Karte zugleich

*) Bin ganz beſonders für Mineralogen merkwürdiger Punct, da hier der Baſalt zu beyden Seiten unmittelbar zwiſchen dem Granit liegt, und beyde Gebirgsarten ſo mit einander verbunden ſind, daß ſie ſich bey dem Zerſchlagen nicht leicht von einander ablöſen. In dünnen zu Doſen geſchliffenen Platten kommt Granit und Baſalt vor,

gleich mit gegebenen Fluß Profils; je seltner Bestimmungen wie die vorliegenden über successive Abdachung und Fall der Flüsse sind, um so interessanter waren uns diese Angaben, die nicht bloß in wissenschaftlicher, sondern auch nicht minder in politisch-statistischer Hinsicht so wichtig sind. Wir wünschen lebhaft, daß des Verfassers verdienstvolles Beispiel andere Naturforscher zur Nachfolge einladen möge. Die Flüsse, von denen wir hier theilweise Nivellements erhalten, sind folgende:

1. *Die Oder, von Kosel an, bis auf die Gränze mit dem Brandenburgischen.*
2. *Die Neisse, von der Quelle oberhalb Neißbach, auf dem Glätzer Schneegebirge, bis unterhalb Schiergast, wo sie in die Oder fällt.*
3. *Die Ohlau, von der Quelle bey Neu-Altmannsdorf im Münsterbergischen Kreise bis zu ihrer Vereinigung mit der Oder bey Breslau.*
4. *Die Katzbach, von ihrer Quelle bey Ketschdorf unweit Kupferberg bis Parchwitz, wo sie in die Oder fällt.*
5. *Der Bober, von Landshut an bis nach Sagan.*

Die in diesen Fluß-Districten barometrisch bestimmten Punkte, sind folgende:

	Höhe über der Meeresfläche Paris. Fuß.
I. <i>Oder,</i>	
bey Kosel	510
Krappitz	444
Briegg	419
	bey

Höhe über der Meeresfläche
Parif. Fuß

bey Ohlau	392
Breslau	370
Dyhrnfurt	338
Leubus	282
Aufhalt	262
Steinau	250
Köben	230
Glogau	212
Neufalz	190
Gränze mit Brandenburg	175

II. Neisse.

Quelle bey Neißbach	2708
Schreibendorf	1476
Habelschwerd	1017
Glatz	847
Wartha	745
Camenz	683
Patfchkau	638
Ottmachau	628
Neisse	592
Löwen	480
Schurgast	440

III. Ohlau.

Quelle bey Neu Altmannsdorf	904
Münsterberg	622
Strehlen	472
Ohlau	392
Breslau	367

IV.

XVII. Darstellung d. Höhen verschiedener Berge etc. 183

Höhe über der Meeresfläche

Parif. Fufe

IV. Katzbach.

Quelle bey Ketschdorf	1388
Schönau	846
Goldberg	631
Liegnitz	365
Parchwitz	270

V. Bober.

bey Landshut	1234
Rudelftadt	1184
Hirschberg	994
Löwenberg	775
Bunzlau	737
Sagan	309

Die von dem Verf. aus diesen Bestimmungen, über den Fall der genannten Flüsse gezogenen Resultate, heben wir mit dessen eignen Worten hier aus:

“Hiernach hat also die Oder von Kosel
bis auf die brandenburgische Gränze

Fall 335 Par. F.

die Neisse von der Quelle bis in die Oder

unterhalb Schurgast 2268 —

die Ohlau desgleichen 537 —

die Katzbach desgleichen 1118 —

der Bober von Landshut bis Sagan . 925 —

“Die Längen dieser Flüsse nach dem angegebenen
Laufe sind folgende:

Der

Der Oder	47	Schlef. Meil. *)
der Neisse	26	— —
der Ohlau	14	— —
der Katzbach	12	— —
des Bobers	18	— —

“Diese Entfernungen geben daher für eine
schlesische Meile einen Fall des Waf-
fers bey

der Oder von	7 $\frac{1}{2}$	Parif. Fuß
– Neisse –	87 $\frac{1}{2}$	—
– Ohlau –	38 $\frac{1}{2}$	—
– Katzbach	93 $\frac{1}{2}$	—
– Bober –	51 $\frac{1}{2}$	—

“Es versteht sich von selbst, sagt Herr v. Char-
pontier am Schlusse der vorliegenden Schrift, daß
dies das Wassergefälle nur im Durchschnitt ist, und
daß es an verschiednen Puncten völlig von diesen
Angaben, abweichend seyn muß. Das Gefälle obi-
ger Flüsse, zwischen zweyen der dabey angegebenen
Orte, kann natürlich sogleich berechnet werden,
wenn man nach einer guten Specialkarte, die Länge
des Flusses nach seinen Krümmungen ausmisst.”

Bey dem sehr reellen Interesse, welches wir an
diesen Bestimmungen nehmen, würden wir uns dem
Verf. wesentlich verbunden fühlen, wenn er darü-
ber, ob sich die letztern Fluß Höhen-Bestimmungen
auf mittlere oder einzelne Barometer-Höhen grün-
den, und ob und wo correspondirende Beobachtun-
gen dazu gemacht wurden, irgend ein weiteres De-
tail bekannt machen wollte.

*) Nach v. Charpontierts Angabe

1 Schlesische Meile = 22500 Breslauer Fuß
= 19945 $\frac{1}{2}$ Pariser —

XVIII.

Methodi projectionis orthographicae usum ad calculos parallacticos facilitandos explicavit simulque eclipsin solarem die VII. Sept. 1820 apparituram, hoc modo tractatam, mappaque geographica illustratam tanquam exemplum proposuit, Christianus Ludovicus Gerling. Göttingae 1812,

Die vor uns liegende sehr gelungene Darstellung einer der wichtigsten Lehren der theorischen Astronomie, ist eine um so erfreulichere Erscheinung, je seltener academische Gelegenheitschriften, Gegenstände dieser Art zu behandeln pflegen. Der Verfasser, durch mehrere in dieser Zeitschrift von ihm befindliche Arbeiten, als rechnender Astronom schon rühmlichst bekannt, schrieb diese Abhandlung bey seinem Abgang von Göttingen, als Lehrer der Mathematik nach Cassel. Lebhaft wünschen wir, daß diese Art specieller Behandlung einzelner astronomischer Lehren sich vervielfältigen möge, da wir überzeugt sind, daß die Wissenschaft dadurch gewiss mehr gewinnt, als durch Anhäufung neuer Lehrbücher, die doch immer nur mit mehr oder mindern Modificationen *trita et pertrita* enthalten.

Wäre es bey mathematisch-astronomischen Gegenständen nicht schon öfters der Fall gewesen, daß trotz sorgfältig wiederholter Bearbeitungen, doch immer noch spätere Verbesserungen möglich wurden, so könnte es Verwunderung erregen, daß die Theorie der Parallaxen, die seit einem halben Jahrhundert für die berühmtesten Geometer und Astronomen der Gegenstand von Untersuchungen war, doch noch jetzt Stoff zu Verbesserungen und Vereinfachung darbiete. Allein bey Gegenständen dieser Art, wo es nicht sowohl auf strenge Auflösungen, als auf hinreichende bequem zur Rechnung eingerichtete, approximirte Formeln ankommt, hat man erst in neuern Zeiten mehr zu raffiniren angefangen, und dadurch allerdings weit mehr Kürze erreicht, als die hierher gehörigen frühern Untersuchungen von *Dusejour*, *Lagrange*, *Euler etc.* gewähren.

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung hat die orthographische Projectiona-Methode zur Entwicklung der Parallaxen-Lehre gewählt; ist auch diese Methode an sich nicht neu, indem *Dusejour*, *Chabrol* und neuerlich *Monteiro*, auf eine ähnliche Art hierbey verfahren, so gebührt dagegen dem Verf. das gewiß nicht kleine Verdienst, einer ihm eigenthümlichen sehr bündigen und klaren Darstellungsart, die alles hierher gehörige auf wenig Bogen enthält. Jeder, derauch schon anderwärts mit der Theorie der Parallaxen sich bekannt gemacht hat, wird diese Schrift, wo auf etwa dreyßig Seiten alle wesentlich bey Finsternissen, Bedeckungen und Planeten-Vorübergängen vorkommende Aufgaben, die bey *Dusejour* mehr als einen halben Band einnehmen, sehr

sehr befriedigend erörtert und aufgelöst sind, mit Nutzen und Vergnügen lesen. Der ganze Gang der Untersuchung zeigt von vieler Bestimmtheit und Sicherheit mathematischer Begriffe, und man erkennt darinnen leicht den geschickten Schüler des berühmten Lehrers. Wir halten es für unsre Pflicht, bey dieser Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, wie groß der Einfluß eines Lehrers, wie *Gauß*, auf mathematisch astronomische Bildung ist, da es diesem in dem Zeitraum von wenig Jahren gelang, in den Herren *Gerling*, *Wächter*, *Nicolai* und *Enke**) vier mathematische Astronomen anzuziehen, die alle schon reell für die Wissenschaft nützlich waren, und zu noch ausgezeichnetern Hoffnungen für die Zukunft berechtigten.

Mit allen Schriftstellern über diesen Gegenstand nimmt der Verfasser als Fundamental-Ebene dabey diejenige an, die auf der die Centra des bedeckten Sterns und Erde verbindenden geraden Linie normal ist. Die beyden andern Ebenen werden dann entweder der Ecliptik oder dem Aequator, respect. parallel oder perpendicular angenommen, je nachdem die Sonnen- Monds- Stern- oder Planeten- Orte, auf diese oder jene Ebene bezogen sind. Durch die auf diese Ebenen bezogenen Coordinaten von Erde, Sonne, Mond . . . werden deren Orte bestimmt; die Ausdrücke dafür ergeben sich aus einer sinnreichen Betrachtung, der im Verhältniß der Breite des
Ge-

*) Alles Norddeutsche, so wie überhaupt alle jetzt lebende berühmte deutsche Mathematiker und Astronomen Norddeutsche sind.

Gestirns veränderten Lage jener Ebenen, sehr leicht und schnell; auch wird dabey gezeigt, wie die anfangs nur für die sphärische Gestalt der Erde berechneten Coordinaten für die sphäroidische zu erhalten sind, und wie für sehr scharfe Rechnungen die Breite der Sonne zu berücksichtigen ist.

Die ersten zehn Paragraphen enthalten diese allgemeinen Entwicklungen, auf die sich die nachherigen Auflösungen der bey parallactischen Erscheinungen vorkommenden Aufgaben gründen. Wir heben die von dem Verf. namentlich angegebenen und nach seiner vorherigen Darstellung sehr leicht aufzulösenden Aufgaben aus, um unsere Leser mit der Vollständigkeit der Abhandlung bekannt zu machen. Dafs sich diese speciell für Sonnenfinsternisse gemachte Entwicklungen mit leichten Modificationen auf alle andere analoge Erscheinungen übertragen lassen, bedarf keiner weitem Erörterungen. Die Aufgaben selbst sind folgende:

Prob. I. *Quaeritur locus terrae, datae poli elevationis in quo, dato tempore, propofita centrum lunae et solis distantia observatur.*

II. *Quaeritur locus datae latitudinis geographicae, in quo, dato tempore, initium finisve eclipseos cernitur.*

III. *Quaeritur locus terrae datae latitudinis, qui initium finemve eclipseos ipso sole oriente vel occidente videt.*

IV. *Quaeritur locus terrae datae poli elevationis, in quo, dato tempore, maxima phasis, h. e. minima centrorum distantia observatur.*

V. *Quae-*

- V. *Quaeruntur loci qui minimam centrorum distantiam inter ipsum solis ortum vel occasum cernunt.*
- VI. *Quaeritur locus terrae, in quo, dato tempore loci fundamentalis, lunae solisque centra, in eandem rectam incidere videntur.*
- VII. *Quaeruntur loca ea, quibus, ipsius maximae phaseos tempore, data centrorum distantia observatur.*
- VIII. *Quaeritur tempus loci fundamentalis, quo initium finisve eclipseos primum ultimumve in tota terra conspicitur.*
- IX. *Quaeritur locus terrae, haecce phaenomena, primum ultimumve conspiciens.*
- X. *Quaeruntur coordinatae puncti terrestres, in quo primum ultimumve simul cum maxima phase data quaedam centrorum distantia observatur.*
- XI. *Quaeruntur lunae coordinatae hisce phaenomenis respondentes.*

Da die hier, ohne Berücksichtigung der elliptischen Erdgestalt gegebene Auflösung der Aufgaben VIII—XI nicht ganz genau ist, so gibt der Verf. im 23. § noch ein indirectes Verfahren an, wo auf die Excentricität der Erd-Meridiane mit Rücksicht genommen wird. Zugleich erhalten wir aber bey dieser Gelegenheit die sehr elegante Auflösung einer hierher gehörigen Aufgabe, die dem Verfasser vom Herrn Prof. Gauss mitgetheilt wurde, und auf die wir vielleicht ein andersmal wieder zurückkommen werden.

XII. *Quaeritur tempus, quo in loco terrae dato, proposita quaedam lunae; solisque centrorum distantia observatur.*

XIII. *Quaeritur tempus maximae phaseos ipsaque centrorum distantia minima.*

XIV. *Quaeritur angulus, quo linea recta solis lunaeque centra jungens, quovis tempore, versus circulum verticalem, solis centrum transientem a parte puncti Zenith, inclinatur.*

Eine specielle Anwendung mehrerer der hier dargestellten Aufgaben, macht der Verfasser auf die Sonnenfinsternis vom 7. Sept. 1820, die für einen grossen Theil von Deutschland und Italien central und ringförmig seyn wird. Die vom Verfasser für mehrere deutsche Sternwarten berechneten Phasen heben wir hier aus:

7. September 1820.

	Anfang der Finst.	Ite innere Berührung	Grösste Phase
Göttingen	1 ^U 16' 38"	2 ^U 40' 31"	2 ^U 43' 15"
Bremen	1 8 10	2 31 43	2 34 32
Seeberg	1 21 57	2 45 46	2 48 23
Berlin	1 32 48	2 58 45
Wien	1 56 39	3 22 19
Mannheim	1 12 42	2 38 9	2 40 30

	IIte innere Berührung	Ende der Finsternis	Kleinster Abstand ☽ — ☉
Göttingen	2 ^U 46' 0"	4 ^U 3' 23"	16, 1
Bremen	2 37 21	3 54 53	14, 6
Seeberg	2 51 9	4 8 21	23, 5
Berlin	4 16 26	90, 6
Wien	4 39 14	91, 0
Mannheim	2 42 51	4 1 20	38, 0

Die

Die Rechnungs-Elemente hierzu wurden aus *Delambre's* Sonnen- und *Bürge's* Monds-Tafeln entlehnt, und wir halten uns für überzeugt, daß die hier angegebenen Momente, sich keine Minute von den im Jahre 1820 wirklich zu beobachtenden entfernen werden.

Lebhaft wünschen wir, daß es *Hrn. Gerling* auch jetzt, bey seinen freylich ziemlich angehäuften Beschäftigungen eines mathematischen Lehramtes möglich seyn möge, für Astronomie thätig zu seyn; vielleicht könnte dies selbst in practischer Hinsicht der Fall seyn, da die Caisler Sternwarte, wie wir aus eigener Ansicht wissen, mehrere Instrumente besitzt, mit denen bey geschickter Behandlung, wie dies bey *Hrn. Gerling* der Fall seyn würde, wohl brauchbare Resultate geliefert werden könnten. Die Zahl der wirklich beobachtenden Sternwarten ist in Deutschland noch so gering, daß deren Vermehrung jedem Freunde der Wissenschaften sehr am Herzen liegen muß.

XIX.

Auszug aus einem Briefe des Hrn. v. Münchow,
Professur der Aftronomie zu Jena.

Der Bau unserer Sternwarte ist nun, was ich bey den jetzigen Zeitumständen kaum zu hoffen wagte, doch noch zur Vollendung gediehen. Unser Herzog, dessen stets reger Theilnahme an dem Fortgange der Wissenschaften, insbesondere aber der Naturwissenschaften, die hiesige Universität schon mehrere treffliche Anstalten verdankt, erlies gleich nach seiner Rückkehr aus den böhmischen Bädern solche Verfügungen, durch die ich in den Stand geſetzt wurde, an dessen Geburtstage, unser vierschuhiges Mittagsfernrohr, das wir der Gnade des *Herzogs von Gotha* verdanken, zum erstenmale einzuhängen, und mich Abends durch einige voraus berechnete Stern-Culminationen von der guten Stellung der Pfeiler sowohl, als auch von der ziemlich genauen Lage des mittlern Spalt-Durchschnitts (der nach einem beyläufigem Überschlage ein westliches Azimuth von höchstens 3' haben wird) zu versichern.

Bey dem Bau der Sternwarte hat man vorzügliche Rücksicht auf die Festigkeit der Fundamente genommen, von welchen die Pfeiler des Mittag-rohrs und des Winkelinstruments getragen werden.

Beyde

Beyde Fundamente sind vom Gebäude, das gleichsam nur als ein Gehäuse der Instrumente betrachtet wurde, gänzlich unabhängig; beyde 18 Fuß tief so gelegt, daß die unterste Fläche derselben auf einer Schicht weichen Sandsteins ruhet. Das Fundament des Passagen-Instruments ist außerdem von gehauenen Steinen ohne Kalkverband dergestalt aufgeführt, daß die oberste und unterste Schicht jede aus einem ganzen Steine, die meilten Zwischenschichten aber aus drey, einige auch nur aus zwey Steinen bestehen. Ich hoffe, über solchem Fundamente sollen die Pfeiler des Passagen-Instruments nicht wanken.

Unser Vorrath an Instrumenten ist nicht groß; aber wir haben einige gute, und hoffen in Jahresfrist noch ein Paar sehr gute zu erhalten. Vorhanden sind gegenwärtig:

1) Das oben erwähnte vierschuhige Passagen-Instrument, welches in der *Schröder'schen* Werkstatt zu Gotha 1806 gearbeitet und von dem geschickten Mechanicus, Hrn. *Körner* zu Weimar (der zur genannten Zeit schon bey der Verfertigung desselben geholfen) in sehr guten Stand gesetzt, und mit einer besondern Vorrichtung versehen worden ist, durch die ich die wahre Umdrehungs-Axe (nicht bloß die Oberflächen dieser Axe) hoffe aufs genaueste horizon-
tiren zu können.

2) Eine gute Pendelnhr von *Vulliamy* zu London, deren Zapfenlöcher Hr. *Körner* mit Steinen ausgesetzt hat.

3) Ein Chronometer von *Emery* (Nr. 1161), das, so weit ich es bisher prüfen konnte, einen guten Gang zeigte.

4) Ein

4) Ein zweyfüßiger Quadrant, aus der Schenkung des *Herzogs von Gotha*, mit dem Herr *Körner* einige Abänderungen vornehmen wird.

5) Ein achtfüßiges Spiegel-Telescop von *Schröder*, an welchem die Gestalt des größern Spiegels, vielleicht durch unvorsichtiges Aufpoliren etwas gelitten hat.

6) Ein zweyfüßiger Achromat von *Ramsden*.

7) Ein Spiegel-Sextant.

8) Ein Cometen-Sucher, und

9) Die nöthigen Barometer und Thermometer.

Durch die zur Oberaufsicht der gelehrten Anstalten im Lande gnädigst verordnete Commission, an deren Spitze zwey besondere Gönner unserer Sternwarte, die Herren Geheimen Räte *v. Göthe* und *v. Voigt* stehen, sind bey Hrn. *Körner* noch zwey Instrumente bestellt worden, nämlich eine parallaxische Maschine, mit einem fünf- bis sechsfüßigen Achromaten, und ein 18zolliger Wiederholungskreis. Zum Behuf der Berechnung des Achromaten hat Hr. *Körner* schon mehrere Glasprismen aus Flint- und Cronglas geschliffen, die paarweise zusammengesetzt, ohne Farbenzerstreuung brechen. Auch hat derselbe einen Apparat verfertigt, vermittelst dessen jene Prismen zur genauen Messung der brechenden Winkel mit einem Theodoliten, bequem aufgestellt werden können.

So ausgerüstet soll, denke ich, unsere Sternwarte nach der Absicht Ihres Stifters, nicht sowohl eine Modell-Kammer seyn für die, meist hinlänglicher Vorkenntnisse entbehrenden Zuhörer der

der populären Astronomie, sondern vielmehr eine Gelegenheit für die Lehrer jener Wissenschaft zur Erweiterung derselben und zur Uebung gut ausgerüsteter Aspiranten.

In den bevorstehenden Ferien werde ich mich nun damit beschäftigen, das Passagen-Instrument genau in die Mittags-Ebene zu bringen. Ist dann die Stellung desselben durch eine Meridian-Marke hinlänglich gesichert, der Gang unserer Uhren so genau als möglich ausgemittelt, dann werde ich Sie um Ihre Mitwirkung zur Bestimmung unseres Meridian-Unterschiedes durch Pulver-Signale ersuchen, die vom Ettersberge gegeben werden können. Nachdem dies geschehen, soll auch eine ausführliche Beschreibung unserer Anstalt bekannt gemacht werden. Inzwischen habe ich geglaubt, die obigen vorläufigen Mittheilungen Ihnen bey dem Interesse, das Sie für das neue Institut von Anbeginn desselben gezeigt haben, schuldig zu seyn.

XX.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Professor Gerling.

Cassel, am 25. Aug. 1803.

. . . . Von astronomischen Beobachtungen kann ich Ihnen heute nur die der Mondfinsterniß vom 11. Aug. mittheilen, von der ich folgende Phasen beobachtete :

11. August

MZ. in Cassel.

Halbschatten auf d. ☾ Rande bemerkb.	14 ^h	16'	39"
der Kernschatten zeigt sich am Rande		21	14
die Begränz. des Randes verschwindet		24	44
<i>Aristarch</i> vom Kernschatten berührt		39	1
. . . gänzlich bedeckt		41	58
<i>Plato</i> tritt in den Kernschatten . . .		43	54
. . . halb bedeckt		45	8
. . . nicht mehr sichtbar		47	9
<i>Kepler</i> stark beschattet		53	6
<i>Timocharis</i> desgleichen		57	9
<i>Kepler</i> verschwindet		57	49
<i>Eratosphenes</i> im Halbschatten . . .	15	10	32
. . . verschwindet		13	2
<i>Pofidonius</i> beschattet		13	59
. . . verschwindet		17	48
<i>Copernicus</i> beschattet		21	51
<i>Kepler</i> schimmert durch ,		32	12
. . . vollkommen sichtbar		35	7
<i>Eratosphenes</i> gut sichtbar		54	8
. . . ganz ausgetreten		58	54
			Ich

XX. Auszug a. e. Schreib. des H. Prof. Gerling. 197

Ich weiß freylich wohl, daß diese Beobachtung, in so fern den Phasen einer Mondfinsterniß selbst, immer eine bedeutende Unsicherheit anklebt, eben keinen großen Werth hat; indessen kann ich wenigstens die Zeitbestimmung, welche auf mehreren Reihen correspondirender Sonnenhöhen beruht, als zuverlässig verbürgen, und finde mich deswegen veranlaßt, Ihnen zu erklären, daß der bey Bekanntmachung von Beobachtungen unanwendbare Ausdruck: *ziemlich* zuverlässig, der sich in meiner Anzeige davon im *westphäl. Moniteur* findet, keinesweges von mir selbst herrührt, sondern als Druckfehler zu betrachten ist.

XXI.

Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Gauss.

Göttingen, am 31. Aug. 1813.

.... Ich übersende Ihnen hier meine in diesem Jahre erhaltenen *Pallas*-Beobachtungen:

1813	M. Z. Göttingen	R ♄	Decl.
Jun. 28	11 ^h 37' 2"	327° 2' 13,3	+ 14° 5' 43,4
Aug. 16	10 36 23	319 50 54,7 ,
- 19	9 31 0	319 17 10,6	10 0 8,4
- 26	9 23 7	317 59 52,0	8 44 35,3

Herrn *Nicolas* Vergleichung mit den letzten Elementen gibt folgende Resultate:

1813

1813	Unteſchied	
	in \mathcal{R}	in Decl.
Jan. 28	+ 23, 6	+ 22, 4
Aug. 16	+ 35, 6
19	+ 28, 5	+ 4, 5
26	+ 22, 4	— 4, 3

Ich bemerke dabey, daß die \mathcal{R} vom 16. Aug. nur auf einer einzigen Vergleichung beruht, hingegen die Beſtimmungen vom 19. und 26. ſich auf zahlreiche und vortreflich harmonirende Vergleichungen gründen.

XXII.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. *Burckhardt*, Mitglied des kaiſerl. Inſtituts zu Paris.

Paris, am 28. Aug. 1813.

. . . . Ich theile Ihnen hier ein paar von mir und Herrn *Dauffy* beobachtete Sternbedeckungen mit:
 7 May 23 Ω Eint. $11^h 51' 21, 1$ Strnz. *B.* und *D.* zugl.
 — 27 Ω — 15 46 37, 1 — *D.*

Der Mond war zu tief für mein Teleſcop bey der letzten Bedeckung. Den 24. May Morgens hatte Herr *Dauffy* den Eintritt von ξ^2 in der Waage beobachtet, allein um mehrere Secunden zweifelhaft, weshalb ich ſie Ihnen nicht ſchicke.

7 Jul. Eintr. von $\xi \simeq 17^h 1' 44, 3$ Sternz. *D.*
 11 — — — $\mu^1 \rightarrow 18 \quad 36 \quad 4, 9$ — *B.*
 13 — — — $\pi \rightarrow 20 \quad 34 \quad 4, 8$ — *B. 4, 3 D.*
 Austritt $21 \quad 46 \quad 49, 0$ — *D.*

Die

Die *Pallas* habe ich zum erstenmal im Meridian den 5. August Morgens beobachtet; meine sämtlichen Beobachtungen sind folgende:

1813	Sternzeit	AR ϕ	Decl. bor.
5 Aug.	21 ^h 28' 30,5	322° 7' 38,0	12° 11' 58,5
10 —	21 24 42,0	verfehlt	11 32 38,4
11 —	21	11 15 28,1 <i>Daufsy</i>
15 —	21 20 7,2	320 1 48,0	10 38 48,2
17 —	21 18 35,2	319 38 48,5	10 19 29,3
19 —	21 17 4,3	319 16 4,5	9 59 18,3 <i>D.</i>
26 —	21 11 56,1	317 59 1,8	8 43 23,4 <i>D.</i>

Der Ort des Planeten stimmt genau mit der *Gauss - Nicolaischen* Ephemeride überein.

XXIII.

Sternbedeckungen.

Sternwarte Seeberg, 13. August 1813.)*

ψ Aquar. Eintr. 21^h 41' 38,1 Sternz. 12^h 13' 38,4 M.Z.

Austr. 22 8 36,0 — 12 40 31,9 —


	M. Z.	AR ζ II. R.	Decl. Ob. R.
13. August	13 ^h 40' 28,3	347° 10' 34,5	—9° 23' 15,3

Sowohl Ein- als Austritt wurden zwischen Wolken beobachtet, und beyde Beobachtungs-Momente sind daher nicht ganz sicher.

*) Wir bemerken bey dieser Gelegenheit, in Gemäfsheit einer uns von Hrn. Prof. *Wurm* mitgetheilten Berichtigung zu S. 409 *M. C.* 1813 May-Helt, daß nicht Herr *v. Ende*, sondern Prof. *Harding* den Austritt von α Leon. 21" später als *Barry* beobachtete. *M. V. M. C.* Bd. XXIII. S. 420. v. L.

I N H A L T.

	Seite
XII. Untersuchung über die Elemente der Mercursbahn (Fortsetz. und Beschluß zu S. 23)	105
XIII. Die Attraction homogener elliptischer Sphäroiden nach einer neuen Methode entwickelt von Herrn Prof. Ritter <i>Gauss</i> (Fortsetz. und Beschluß zu S. 57)	125
XIV. Ueber die Vortrefflichkeit der k. k. österreichischen und der k. bayerischen Landesvermessung und ihrer genauen Uebereinstimmung	135
XV. Ueber eine neue Art Sonnenfinsternisse zu beobachten, auf jene vom 31. Jan. 1813 angewandt. Auf der Sternwarte a la Capelle bey Marseille	151
XVI. Bestimmung des Azimuths von Altomünster, und dadurch der Lage des Meridians auf dem nördl. Frauenthurm zu München. Von <i>J. Soldner</i> , königl. bayer. Steuerrath und Mitglied der Acad. der Wiss. Herausgegeben auf Befehl der kön. bayer. unmittelbaren Steuer-Cataster Commission. München 1813	167
XVII. Darstellung der Höhen verschiedener Berge, Flüsse und Orte Schlesiens. Von <i>Toussaint v. Charpentier</i> , kön. preuss. Oberberggrathe etc. mit einem illuminirten Kupfer Breslau 1812.	175
XVIII. <i>Methodi projectionis orthographicae usum ad calculos parallacticos facilitandos explicavit simulque eclipsin solarem die VII. Sept. 1820 apparituram, hoc modo tractatam, mappaque geographica illustratam tanquam exemplum proposuit</i> <i>Christ. Ludovicus Gerling</i> Göttingae 1812	185
XIX. Auszug a. e. Briefe des Hrn. <i>von Münchow</i> , Prof. der Astronomie zu Jena.	192
XX. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. <i>Gerling</i>	196
XXI. Auszug a. e. Schreiben des Hrn. Prof. <i>Gauss</i>	197
XXII. Auszug a. e. Schreiben des Hrn. <i>Burckhardt</i>	198
XXIII. Sternbedeckungen	199
(Hierzu ein Kupfer.)	



Monat. Correspond. Aug. 1815.

- Tables abrégées et port. du soleil. 1 Thlr. 2 gl.
 - Tables abr. et port. de la lune. 2 Thlr. (Beyde in kl. 4. broch.)
 - Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour 1404 étoiles etc. 8° broch. 3 Thlr. 12 gl.
- Beckersche Buchhandlung in Gotha.*

XXI. Auszug a. e. Schreiben des Hrn. Prof. Gauss . . .	197
XXII. Auszug a. e. Schreiben des Hrn. Burckhardt . .	198
XXIII. Sternbedeckungen	199
(Hierzu ein Kupfer.)	

Sechs Monatsstücke, jedes von sechs bis acht Bogen, machen einen Band aus, der mit einem Sachen- und Namen-Register geschlossen wird; zwey Bände einen Jahrgang. Der Preis eines Jahrgangs ist 6 Thaler Conv. Geld, und man kann zu jeder Zeit in das Abonnement eintreten, muß aber den ganzen laufenden Jahrgang nehmen. Einzelne Monatsstücke kosten 14 ggr.

Man macht die Bestellungen bey den Post-Expeditionen und Buchhandlungen jedes Orts, welche die Exemplare von unterzeichneter Buchhandlung auf dem gewöhnlichen Wege beziehen.

Auch sind bey uns zu haben:

de *Lindenau* Tables barométr. pour faciliter le Calcul des Nivellements et des mesures des hauteurs par le Baromètre. 4°. 2 Thlr. 12 gl.

Ejusdem Tabulae Veneris novae et correctae. Fol. min. 2 Thlr.

de *Zach* Tabulae Motuum Solis novae et corr. quibus acced. Fixar. praecip. Catal. nov. ex observat. astr. ann. 1787-90 in spec. astr. Goth. habitis. 1792 Fol. min. 6 Thlr.

Ejusdem Fixarum praecip. Catal. nov. etc. (besonders gedruckt) 3 Thlr.

— Tabulae mot. sol. etc. Supplement 1804. 1 Thl. 12 gl.

— Astronom. Tafeln der mittl. geraden Aufsteig. der Sonne etc. zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc. (beym Observiren zu brauchen). Gebund. 6 gl.

— Nachrichten von der k. preuss. trigonom. und astronom. Aufnahme von Thüringen etc. und von der Gotha'schen Gradmessung I. Th. 2 Thlr.

— Tabulae spec. Aberr. et Nutat. una cum insignior. 494 stell. zod. Catalogo novo etc. Vol. I. II. 4° broch. 20 Thlr.

— Tables abrégées et port. du soleil. 1 Thlr. 12 gl.

— Tables abr. et port. de la lune. 2 Thlr. (Beyde in kl. 4. broch.)

— Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour 1404 étoiles etc. 8° broch. 3 Thlr. 12 gl.

Beckersche Buchhandlung in Gotha.



MONATLICHE
CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

Leib Regiment,

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

vom

Freyherrn F. von ZACH,

Herzoglichen Sachsen-Gothaischen
Oberhofmeister.

SEPTEMBER 1813.

G O T H A,

in der Beckerschen Buchhandlung.

Der Zweck dieser *Monatlichen Correspondenz* ist: Die Freunde der *Erde- und Himmels-Kunde* und der dahin einschlagenden Wissenschaften und Künste von den Fortschritten, welche von Zeit zu Zeit in diesen Fächern der Gelehrsamkeit geschehen, frühzeitig zu benachrichtigen. Sie beruht auf einer von dem Herrn Herausgeber mit vielen gründlichen Gelehrten im Fache der Astronomie und Geographie (beydes im weitesten Sinne,) in den verschiedenen europäischen Staaten getroffenen Uebereinkunft, ihm die Resultate ihrer Forschungen, Beobachtungen und Lectüre mitzutheilen, um solche mittelst dieser Zeitschrift sowohl gegenseitig auszuwechseln, als auch durch öffentliche Bekanntmachung gemeinnützig zu machen.

Sie enthält also:

- I. Neue eigene Aufsätze der Herren Correspondenten über Gegenstände der Astronomie, der mathematischen, physischen und politischen Geographie, und der zu diesen Fächern gehörigen Hulfswissenschaften und Fertigkeiten, welchen, wo es zur Erläuterung nothwendig ist, Zeichnungen, Plane und Landkarten beygefügt werden.
- II. Einzelne eigene Beobachtungen, Erfahrungen, Entdeckungen und Erfindungen in diesen Wissenschaften.
- III. Urtheile und Nachrichten von neuen in diese Wissenschaften einschlagenden Schriften, wodurch die Wissenschaft erweitert oder berichtigt wird.
- IV. Beurtheilende Nachrichten von neuen Landkarten, Planen, astronomischen und mathematischen Werkzeugen u. s. w.
- V. Biographische Nachrichten von Männern, die in diesen Fächern viel geleistet haben, mit ihren Bildnissen.
- VI. Berichte von Reisenden, die auf die Länder- und Völkerkunde Bezug haben.

MONATLICHE
CORRESPONDENZ
ZUR BEFÖRDERUNG
DER
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

SEPTEMBER 1813.

XXIV.

Geographische Lage von St. Gallen
im Thurgau.

Genaue astronomische Ortsbestimmungen, und trigonometrische Verbindungen in der Schweiz, gehören noch immer unter die geographischen Seltenheiten. Aufser den neuerlich bekannt gewordenen Operationen, welche das südwestliche Ende der Schweiz mit Frankreich und Teutschland, und Genf mit Strasburg und Mannheim in Verbindung gebracht haben, (*M. C.* XX Bd. S. 411) kennen wir keine ähnliche Arbeit, als welche Herr *Feer* im Jahre 1796 in der, unter den Namen *Rheinthal* bekannten östlichen Gränzgegend der Schweiz, auf Kosten eines *Mon. Corr.* XXVIII. B. 1813. O Schwei-

Schweizer-Patrioten, Herrn *Küſler*, ausgeführt hat, (*A. G. E.* III Bd. S. 350) *Tralles*, *Horner*, *Hassler*, *Wild* und *v. Zach*, haben wohl hie und da einige Breiten-Bestimmungen mit Spiegel-Sextanten gemacht, aber anhaltende und fortgesetzte astronomische Beobachtungen sind, ausser *Mallet* in Genf, und *Feer* in Zürich, noch wenige in der Schweiz angestellt worden. Mit so größerem Vergnügen können wir unsere Leser mit einer neuen geographischen Ortsbestimmung bekannt machen, welche wir einem sehr eifrigen und geschickten Liebhaber der Sternkunde, Herrn *Adrian Scherer* in St. Gallen verdanken, und welche um so schätzbarer ist, da sie das, durch den Canton St. Gallen getrennte Rheinthäl mit Zürich und folglich auch mit den Amannischen und *Bohnenberger'schen* trigonometrischen Vermessungen in Schwaben in Verbindung bringt.

Das Thurgau, und die St. Gallischen Lande bedurften vorzüglich einer solchen Berichtigung, da alle Karten, welche diesen Theil der Schweiz darstellen, (die *Mayer'schen* Karten nicht ausgenommen) von Stellungsfehlern strotzen. Man hat zwar vom Thurgau eine sehr große detaillirte Karte von *Nötzli*, welche für den Lauf der Gewässer, und für die Vollständigkeit der Ortschaften sehr genau ist, welcher es aber gänzlich an einer richtigen Orientierung fehlt. Herrn *Scherers* Arbeit kann daher zum richtigen Anhalts- und Verbindungs-Punct, und seine Bestimmung mit jenen des Herrn *Feer*, von Zürich, von Rheineck, von Grünstein, geben nun diesen ganzen nordöstlichen Theil der Schweiz seine richtige Schwenkung und die wahre geographische Lage.

Wenn uns unsere Erwartung nicht ganz trügt, so haben wir eine genaue Triangulirung der nördlichen Cantone zu hoffen, welche der verdienstvolle Herr Rath und General-Quartiermeister *Finsler* veranstaltet. Die Dreyecke der ersten Ordnung sind bereits, wie wir vernommen haben, von Herrn *Feer* mit einem 18zolligen Repetitions - Kreise aufgenommen worden, und er soll sich wirklich gegenwärtig mit ihrer Orientirung beschäftigen. Die geographische und astronomische Bestimmung von St. Gallen wird dieser Arbeit zum vortrefflichen Fixpunct dienen.

Herr *Scherer* hat seinen kleinen Instrumenten-Vorrath vortrefflich zu behandeln und zu benützen gewußt, wie unsere Leser aus den Breiten - Bestimmungen sehen werden, welche er mit einem 6zolligen *Le Noir'schen* Repetitions Kreise erhalten hat. Die Anomalien, welche sich mit einem so kleinen Werkzeuge bey seinen beobachteten Breiten zeigen, welche unter den ungünstigsten Umständen, da es meistens Winter Beobachtungen sind, und daher bey sehr niedrigem Sonnen - Stand gemacht worden, weichen vom Mittel nicht über vier bis fünf Secunden ab, Unterschiede, welche selbst bey zwölf und 18zolligen *Le Noir'schen* Kreisen noch statt finden. Ausser diesem Kreise ist Herr *Scherer* noch mit einem Passagen-Instrumente, einer guten Pendeluhr, mit Achromaten von *Dollond*, *Adams* und *Tiedemann*, versehen. Nächstens erwartet er einen $3\frac{1}{2}$ füssigen Achromaten von 42 Linien Oeffnung von *Cauchy* aus Paris, welchen er in Zürich unter der Aufsicht der Herren *Feer* und *Horner*, von einem jungen geschickten Künstler daselbst, Namens *Oert*,
 O 2 wel-

welcher auch das Passagen - Instrument verfertigt hat, auf ein parallactisches Gestelle setzen, und mit Stunden - und Declinations - Kreise versehen lassen will. Auch ist Herr Scherer Willens, sich einen *Reichenbach'schen* Kreis kommen zu lassen; auf diese Art wird er eine Sternwarte ausrüsten, von welcher man sich noch großen Nutzen versprechen darf.

Einstweilen theilen wir unsern Lesern folgende ergiebige Erndte mit, davon wir hier nur die End-Resultate anführen können, obgleich wir im Besitze der vollständigen rohen Original - Beobachtungen sind. Die fünf ersten Breiten sind von dem auch aus unserer *M. C.* Bd. X S. 270 rühmlichst bekannten Professor *Philipp Kyene*, vormaligen Astronomen in der Abtey Ochsenhausen; die drey letztern vom Ritter *Triesnecker* in Wien in Rechnung genommen worden. Ersterer hat sich der vom Pariser *Bureau des Longit.* herausgegebenen Sonnen- und Refractions-Tafeln, und bey der Berechnung der in der *M. C.* X B. S. 1 - 19 angezeigten Methode bedient. Welcher Strahlenbrechung und Sonnen-Declinationen sich Ritter *Triesnecker* bey seinen Rechnungen bedient habe, ist nicht bekannt; vielleicht liegt in dieser verschiedenen Wahl der Rechnungs-Elemente die Ursache des größern Unterschiedes, welchen man in den Resultaten der beyden Berechner bemerkt. Herrn *Kyene's* Breiten fallen 6 bis 7 Secunden größer aus als die von *Triesnecker* berechneten. Dies kann allein von der zum Grunde gelegten verschiedenen Schiefe der Ecliptik herrühren. Bey den drey ersten Beobachtungen hat Herr *Kyene* nur die *mittlere*

lere Strahlenbrechung anwenden können, da bey diesen der Barometer- und Thermometer-Stand fehlt; ein Umstand, welcher bey so geringen Höhen die Refraction, und folglich die damit geschlossene Breite um mehrere Secunden ändern kann. Zumal in den, zu dieser Jahreszeit mit vielen Dünsten angefüllten Schweizer-Thälern, wo die horizontale Strahlenbrechung ganz eignen Zufälligkeiten unterworfen seyn mag. Ueberhaupt sollte man zu genauen Breitenbestimmungen wegen der zweifelhaften Schiefe der Ecliptik (*M. C.* XXVII Bd. S. 105) nie die Sonne wählen, sondern sich zu diesem Behufe nur der Circumpolar-Sterne bedienen. Demungeachtet ist es vielmehr zu bewundern, daß die Anomalien, welche sich bey diesen Beobachtungen zeigen, bey einem so kleinen Kreise, bey der so geringen Vergrößerung des Fernrohrs und bey so manchen andern Schwierigkeiten, womit der Beobachter zu kämpfen hatte, nicht stärker als die bemerkten ausgefallen waren. Wir lassen demnach, erstens, die von den Herren *Kyene* und *Triesnecker* geschlossene Breiten folgen, dann geben wir diese sämmtlich von uns, und nach unsern Sonnen-Tafeln neu berechnet, welche wenigstens alle, nach einen und denselben Elementen und Methoden berechnet sind, wobey wir die *Carlini'sche* Refraction, und die angegebenen Abweichungen der Sonne angewendet haben. Noch müssen wir bemerken, daß wir für die drey ersten Tage, wo der Barometer- und Thermometerstand fehlt, dafür einen mittlern, nämlich für den Barometer 26 Zoll 0,10 und für den Thermometer + 5° R. angenommen haben. Wir geben auch die

die jeden Tag beobachtete *scheinbare* Zenith-Distanz der Sonne, wodurch, wer Luft hat, in Stand gesetzt wird, aus diesen Beobachtungen, nach jeder beliebigen Annahme von Strahlenbrechung und Schiefe der Ecliptik, die Breiten aufs neue zu berechnen.

*Breite von St Gallen, aus Circum-Meridianhöhen
der Sonne,*

Tag d. Beobachtung	Anzahl d. Beob.	Baromet.	Therm. R.	Breite	Berechneter
1810 Dec. 24	14	47° 25' 42", 58	Prof. Ryene
1811 Feb. 18	18	38, 98	
— — 24	28	41, 69	
— Sept. 15	30	26 ² 2, 164	+15, 75	43, 58	
— Oct. 5	28	26 3, 06	+14, 5	40, 96	
— Dec. 23	18	26 1, 59	+ 1, 5	33, 77	R. Trieb- ecker
1812 Febr. 2	30	26 0, 50	+ 4, 25	36, 84	
— — 9	14	25 11, 90	+ 3, 25	36, 93	
Mittel				47° 25' 39", 42	

Hier folgt unsere Breiten - Berechnung; die Längen und die Abweichungen der Sonne sind nach der letzten Ausgabe unserer Sonnentafeln (Gothae 1804) berechnet worden.

		1810 Decbr. 24		1811 Febr. 18		1811 Febr. 24		1811 Sept. 19	
Durchlauf. Bogen		991° 55' 20"	1066° 54' 20"	1600° 11' 20"	1325° 51' 45"				
△ Z. D.		— 18 25, 12	— 29 54, 03	— 1 44 52, 91	— 2 29 15, 17				
△ Declin.		+ 0, 52	+ 23, 19	+ 50, 78	+ 1 43, 99				
△ Refract.		+ 2, 76	+ 1, 91	+ 5, 06	+ 5, 20				
Reducirter Bogen		991 36 58, 16	1066 24 51, 10	1698 27 23, 93	1323 20 51, 04				
Einfache Z. D.		70 49 47, 01	59 14 42, 83	57 5 15, 85	44 6 41, 70				
Strahlenbrechung		+ 2 37, 12	+ 1 33, 35	+ 1 24, 98	+ 51, 18				
Parallaxe		— 3, 36	— 7, 57	— 7, 41	— 6, 08				
Wahre Z. D. ⊙		70 52 15, 77	59 16 7, 61	57 6 33, 42	44 7 26, 86				
Südl. Abweich. ⊙		23 26 41, 74	11 50 29, 81	9 40 53, 40	+ 3 18 7, 60				
Breite		47 25 34, 03	47 25 37, 80	47 25 40, 02	47 25 34, 46				
<hr/>									
		1811 Oct. 5		1811 Dec. 23		1812 Febr. 2		1812 Febr. 9	
Durchlauf. Bogen		1454° 48' 38"	1275° 34' 35"	1935° 28' 40"	1497° 17' 37, 5				
△ Z. D.		— 2 2 0, 48	— 25 15, 80	— 1 52 54, 22	— 1 5 33, 82				
△ Declin.		— 1 44, 29	— 11, 03	— 8, 78	— 7, 39				
△ Refract.		+ 5, 33	+ 3, 81	+ 10, 07	+ 5, 06				
Reducirter Bogen		1452 44 58, 56	1275 9 11, 98	1933 35 47, 07	1496 12 1, 35				
Einfache Z. D.		51 53 2, 09	70 50 30, 67	64 27 11, 57	62 20 30, 06				
Strahlenbrech.		+ 1 7, 63	+ 2 40, 69	+ 1 55, 37	+ 1 45, 57				
Parallaxe		— 6, 88	— 8, 34	— 7, 95	— 7, 82				
Wahre Z. D. ⊙		51 54 2, 89	70 53 3, 02	64 28 58, 99	62 22 7, 81				
Südl. Abweich. ⊙		4 28 31, 45	23 27 32, 71	17 3 121, 36	14 56 27, 87				
Breite		47 25 31, 44	47 25 3, 30	47 25 57, 63	47 25 39, 94				

Das Mittel aller dieser Breiten, aus 190 Beobachtungen geschlossen ist = 47° 25' 35", 70.

Zur Beſtimmung der Länge von St. Gallen hat Hr. Scherer folgende Stern-Bedeckungen vom Monde beobachtet, wozu er, mittelſt ſeines Paſſagen-Inſtruments jederzeit eine ſichere Zeitbeſtimmung hatte.

Tage der Beobachtung	Gefirn	Phaſe	Wahre Sternzeit
1810 Mai 8	♊ Gemin.	Eintritt	12 ⁰ 16 54, 13
1811 März 7	♌ Leonis	Eintritt	10 48 57, 14
1811 Octob. 5	♉ Tauri	Eintritt	2 44 42, 89
1811 Octob. 11	♌ Leonis	Eintritt	2 49 52, 13
1812 Jan. 23	Aldebaran	Eintritt	3 49 29, 21
		Austritt	4 40 50, 00
1812 Febr. 19	♉ Tauri	Eintritt	3 54 48, 67
1812 Febr. 19	♉ Tauri	Eintritt	8 4 48, 67
1812 Febr. 19	77 θ ¹ Tauri	Eintritt	8 54 40, 61
		Austritt	9 55 9, 54
1812 Febr. 19	78 θ ² Tauri	Eintritt	8 56 18, 61
		Austritt	9 56 45, 53
1812 Febr. 19	160 Mayer	Eintritt	10 9 22, 53
1812 Febr. 19	162 Mayer	Eintritt	10 26 35, 50
1812 Febr. 20	111 Tauri	Eintritt	9 11 9, 75

Hieraus hat nun Herr Ritter *Triesnecker* folgende Längen-Unteſchiede mit Paris berechnet :

Tage der Beobachtung	Gefirne	Vergleich-Punct	Länge in Z. öſt. v. Paris	Mittel
1811 März 7	♌ Leons	durch Wien	28' 1, 3	28' 3, 54
		Seeberg	28 2, 4	
		Göttingen	28 0, 5	
		Mannheim	28 8, 1	
		Paris . .	28 5, 6	
1811 Oct. 5	♉ Tauri	durch Seeberg	27 57, 9	27 57, 35 (*)
		Königsberg	27 56, 8	
1812 Jan. 23	Aldebaran	durch Padua	28 5, 0	28 5, 60
1812 Febr. 19	♉ Tauri	durch Wien	28 6, 7	28 6, 20
		Capellele	28 5, 7	
1812 Febr. 19	θ ¹ Tauri	durch Seeberg	28 15, 3	28 11, 80 (*)
		Göttingen	28 8, 3	
1812 Febr. 19	θ ² Tauri	durch Seeberg	28 3, 9	28 1, 95
		Göttingen	28 0, 0	
1812 Febr. 19	33 Tauri	durch Seeberg	28 10, 4	28 7, 75
		Göttingen	28 5, 1	
1812 Febr. 20	111 Tauri	durch Seeberg	28 11, 3	28 9, 60
		Göttingen	28 8, 0	
1813 April 14	Aldebaran	durch Wien	28 4, 90
Mittel aus allen dieſen Beobachtungen				28' 5, 41
— mit Ausſchluſſ der mit (*) bezeichneten				28 5, 65

Demnach kann man für die wahre geographische Lage des *Scherer'schen* Hauses in St.

Gallen annehmen	Breite	47° 25' 35,"70
	Länge	27 1 24, 75
In Zeit östlich von Paris		28 5, 65

Das *Scherer'sche* Haus in St. Gallen liegt eigentlich vor der Stadt; Herr *Scherer* hat sich aber schon vorgenommen, seinen Beobachtungs-Ort mit irgend einem Kirchthurm in der Stadt geodätisch zu verbinden.

Im Jahr 1809 hatte Hr. *Feer* St. Gallen mit Zürich durch Dreyecke der ersten Ordnung verbunden; diese hatte er ferner in Zürich durch sehr genaue Azimuthal-Beobachtungen gehörig orientirt, und daraus den östlichen Abstand der *Scherer'schen* Sternwarte in St. Gallen von dem durch die Zürcher Sternwarte gezogenen Meridian gefunden = 32229 Pariser Toisen, und vom Perpendikel nördlich = 3133 Toisen. Die Breite seiner Sternwarte bestimmt Herr *Feer* einstweilen aus Sonnen-Beobachtungen = 47° 22' 30". Die Länge = 26° 12' 25,"5. Damit, und in der Hypothese der Erd-Abplattung $\frac{1}{310}$, findet er, nach der im XXIII Bd. der *M. C. S.* 159 angezeigten Berechnungsart für die Sternwarte des Hn. *Scherer* in St. Gallen

	Breite	Länge
<i>Scherer</i> hat solche astronomif.	47° 25' 36,"9	27° 2' 25,"8
bestimmt	47 25 35, 7	27 1 24, 8
Unterschied	1,"2	59,"0
	in Zeit	3,"93

Diese

Diese geringen Unterschiede können noch in den astronomischen Bestimmungen, sowohl in Zürich als in St. Gallen liegen. Nach einer so geringen Anzahl von Beobachtungen, ist es nur durch Zufall möglich, sich einer Länge bis auf zwey Zeit-Secunden versichern zu können. Indessen zeigt schon die Uebereinstimmung, mit welcher Genauigkeit das gegen 14 Stunden weit geführte Dreyecks-Netz vollzogen worden sey. Noch mehr beweisen dies die Dreyecke, welche sich von Zürich bis Strasburg gegen 40 Stunden weit erstrecken, und wo der durch diese Dreyecke bestimmte Längen-Unterschied dieser beyden Städte beynahe ganz genau mit dem astronomischen übereinstimmt. — Doch von dieser Arbeit hoffen wir unsern Lesern ein andermal Nachricht zu geben.

XXV.

Verzeichniss

von

Stern-Bedeckungen

durch den Mond,

für das Jahr 1814

berechnet

von den Florenzer Astronomen

P. P. del Rico und Inghirami.

(Vergl. M. C. Bd. XXVII. S. 365 f.)

JANUAR.

Tage	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
1	87 μ Ceti	4	{ 10 9 J 10 17 E	7,3 N 3,7 S	P P
2	5 f Tauri	5	{ 3 44 J 4 20 E	6,7 S 15,8 S	P P
3	75 Tauri	6	{ 2 51 J 3 27 E	6,4 S 13,9 S	P P
4	54 χ^1 Orionis	5	{ 13 55 J 14 10 E	15,9 N 15,4 N	P
4	64 χ^2 Orion. *)	6	{ 12 21 J	12,8 S	P
4	64 χ^4 Oriou. **)	5, 6	{ 17 40 J	...	P
4	62 χ^3 Orio. ***)	5	{ 17 30 J 18 8 E	9,7 N 9,7 N	P

*) Muß heißen 57 χ^2 Orionis.**) — — χ^3 Orion. Nr. 64 existirt gar nicht. Siehe
M. C. IX. Bd. S. 154***) Muß heißen 62 χ^4 Orionis.

p. Z

JANUAR.

Tag	Namen der Sterne	Gröſs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
9	53 <i>L</i> Leonis	6	$\left\{ \begin{array}{l} 7 \ 4 \ J \\ 7 \ 50 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0,0 \ N \\ 10,2 \ N \end{array} \right.$	P
10	. . .	6, 7	$\left\{ \begin{array}{l} 11 \ 48 \ J \\ 12 \ 55 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 10,4 \ S \\ 1,1 \ N \end{array} \right.$	L. XIII
14	Librae	8	$\left\{ \begin{array}{l} 16 \ 57 \ J \\ 17 \ 9 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 11,1 \ S \\ 1,5 \ N \end{array} \right.$	P
16	Scorp. 653 May	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 14 \ 36 \ J \\ 15 \ 28 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 2,5 \ N \\ 11,0 \ N \end{array} \right.$	P
16	. . .	7	$\left\{ \begin{array}{l} 19 \ 18 \ J \\ 20 \ 8 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 14,2 \ S \\ 8,2 \ S \end{array} \right.$	L. X
25	Aquar. 983 M.	6, 7	$\left\{ \begin{array}{l} 4 \ 56 \ J \\ 4 \ 59 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 11,8 \ N \\ 12,1 \ N \end{array} \right.$	P
25	. . .	7	$\left\{ \begin{array}{l} 4 \ 59 \ J \\ 5 \ 36 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 12,1 \ N \\ 8,7 \ S \end{array} \right.$	L. VIII
28	Ceti	8	$\left\{ \begin{array}{l} 5 \ 36 \ J \\ 8 \ 46 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 8,7 \ S \\ 10,8 \ S \end{array} \right.$	P
28	73 ξ^2 Ceti	5	$\left\{ \begin{array}{l} 8 \ 46 \ J \\ 9 \ 7 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 10,8 \ S \\ 15,3 \ S \end{array} \right.$	P
30	55 Tauri	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 9 \ 19 \ J \\ 9 \ 19 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 3,8 \ N \\ 3,8 \ N \end{array} \right.$	P
30	63 Tauri seq.	6	$\left\{ \begin{array}{l} 11 \ 10 \ J \\ 11 \ 10 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 8,5 \ N \\ 8,5 \ N \end{array} \right.$	P
31	. . .	7	$\left\{ \begin{array}{l} 5 \ 45 \ J \\ 5 \ 45 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 14,6 \ N \\ 14,6 \ N \end{array} \right.$	L. IX

FEBRUAR.

1	16 Gemin.	6	$\left\{ \begin{array}{l} 11 \ 47 \ J \\ 12 \ 55 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 3,5 \ N \\ 11,4 \ S \end{array} \right.$	P
1	. . .	6, 7	$\left\{ \begin{array}{l} 12 \ 55 \ J \\ 12 \ 29 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 11,4 \ S \\ 13,2 \ S \end{array} \right.$	L. XIII
1	18 ν Gemin.	5	$\left\{ \begin{array}{l} 13 \ 8 \ E \\ 13 \ 8 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 12,7 \ S \\ 12,7 \ S \end{array} \right.$	P
2	56 ϕ Gemin.	5, 6	$\left\{ \begin{array}{l} 6 \ 45 \ J \\ 9 \ 14 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 7,1 \ N \\ 3,8 \ S \end{array} \right.$	P
2	61 <i>R</i> Gemin.	7	$\left\{ \begin{array}{l} 9 \ 14 \ J \\ 20 \ 9 \ J \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 3,8 \ S \\ 9,6 \ N \end{array} \right.$	P
10	13 ξ^1 Librae	5, 6	$\left\{ \begin{array}{l} 20 \ 9 \ J \\ 20 \ 53 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 9,6 \ N \\ 15,6 \ N \end{array} \right.$	P
11	38 γ Librae	4	$\left\{ \begin{array}{l} 15 \ 6 \ J \\ 16 \ 14 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 2,0 \ N \\ 12,5 \ N \end{array} \right.$	P
12	. . .	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 12 \ 8 \ J \\ 13 \ 8 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 6,6 \ S \\ 2,4 \ N \end{array} \right.$	L. XI
12	. . .	8	$\left\{ \begin{array}{l} 12 \ 57 \ J \\ 13 \ 46 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 6,2 \ S \\ 7,8 \ N \end{array} \right.$	L. XI
14	Sagitt. 715 M.	6, 7	$\left\{ \begin{array}{l} 17 \ 20 \ J \\ 18 \ 36 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 3,6 \ S \\ 1,9 \ N \end{array} \right.$	P
14	Sagitt.	7	$\left\{ \begin{array}{l} 18 \ 19 \ J \\ 19 \ 38 \ E \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0,4 \ S \\ 5,1 \ N \end{array} \right.$	P

FEBRUAR.

Tage	Namen der Sterne.	Gröſs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
15	39° Sagittar.	4, 5	$\begin{Bmatrix} 21 & 23 & J \\ 22 & 44 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 1,1 & N \\ 0,0 & \end{Bmatrix}$	P
16	Sagitt. 801 M.	6, 7	$\begin{Bmatrix} 16 & 8 & J \\ 17 & 4 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 5,4 & N \\ 6,4 & N \end{Bmatrix}$	P
27	104 m Tauri	5	$\begin{Bmatrix} 11 & 19 & J \\ 12 & 12 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 5,9 & N \\ 3,1 & S \end{Bmatrix}$	P
28	54 χ^I Orion.	5	$\begin{Bmatrix} 4 & 39 & J \\ 5 & 5 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 16,1 & N \\ 14,1 & N \end{Bmatrix}$	P
28	62 χ^3 Orio. ***	5	$\begin{Bmatrix} 9 & 29 & J \\ 10 & 27 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 7,6 & S \\ 8,1 & S \end{Bmatrix}$	P

MÄRZ.

1	43 ζ Gemin.	4	$\begin{Bmatrix} 8 & 40 & J \\ 9 & 52 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 3,4 & S \\ 2,4 & S \end{Bmatrix}$	P
2	. . .	6, 7	$\begin{Bmatrix} 6 & 25 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 6,6 & N \end{Bmatrix}$	L. XI
2	Canceri 108 P.	6, 7	$\begin{Bmatrix} 6 & 47 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 3,4 & N \end{Bmatrix}$	P. A.
3	71 Canceri	7, 8	$\begin{Bmatrix} 8 & 38 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 7,8 & N \end{Bmatrix}$	P
8	80 L ³ Virg.	6	$\begin{Bmatrix} 12 & 34 & J \\ 13 & 5 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 15,2 & S \\ 9,7 & S \end{Bmatrix}$	P
15	. . .	8	$\begin{Bmatrix} 14 & 42 & J \\ 15 & 45 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 2,0 & S \\ 1,5 & N \end{Bmatrix}$	L. XIII
15	. . .	8	$\begin{Bmatrix} 16 & 40 & J \\ 17 & 42 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 8,7 & N \\ 9,2 & N \end{Bmatrix}$	L. XIII
15	Sagittarii	7, 8	$\begin{Bmatrix} 17 & 50 & J \\ 18 & 59 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 6,8 & N \\ 6,8 & N \end{Bmatrix}$	P
17	30 Capric.	6	$\begin{Bmatrix} 18 & 53 & J \\ 20 & 10 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 1,2 & N \\ 5,3 & S \end{Bmatrix}$	P
27	Tauri 215 May.	8	$\begin{Bmatrix} 7 & 45 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 8,0 & N \end{Bmatrix}$	P
27	54 χ^I Orion.	5	$\begin{Bmatrix} 11 & 12 & J \\ 11 & 56 & E \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 8,6 & N \\ 8,6 & N \end{Bmatrix}$	P
27	Tauri 223 May.	7	$\begin{Bmatrix} 10 & 45 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 9,4 & N \end{Bmatrix}$	P
28	. . .	7	$\begin{Bmatrix} 6 & 14 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 0,4 & S \end{Bmatrix}$	L. IX
28	. . .	7	$\begin{Bmatrix} 6 & 32 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 10,3 & S \end{Bmatrix}$	L. IX
29	79 Gemin.	7	$\begin{Bmatrix} 6 & 13 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 1,7 & N \end{Bmatrix}$	P
29	85 L. Gem.	6	$\begin{Bmatrix} 11 & 53 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 4,0 & N \end{Bmatrix}$	P
29	. . .	7	$\begin{Bmatrix} 14 & 4 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 9,8 & N \end{Bmatrix}$	L. XI.
29	. . .	6, 7	$\begin{Bmatrix} 14 & 13 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 9,6 & N \end{Bmatrix}$	L. XI.
30	Canceri 236 P.	8	$\begin{Bmatrix} 12 & 57 & J \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 5,7 & S \end{Bmatrix}$	P. A.

APRIL.

Tag	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
1	. . .	7	12 1 J	15,6 S	L. VIII.
2	Leonis	7, 8	11 21 J	9,1 S	P
7	38 γ Librae	4	8 6 J	. . .	P
7	44 η Librae	4, 5	10 36 J	. . .	P
8	7 κ Sagittar.	5	10 4 J	. . .	P
10	Sagitt. 715 M.	6, 7	9 18 J	3,9 N	P
			10 2 E	8,4 N	
10	Sagittarii	7	9 57 J	7,2 N	P
			10 35 E	11,2 N	
10	14 Sagittarii	6	12 46 J	7,7 N	P. A.
			13 36 E	12,2 N	
11	39 \circ Sagitt.	4, 5	12 22 J	. . .	P
13	. . .	7, 8	16 1 J	1,1 S	L. XIII.
			17 15 E	5,1 S	
14	40 γ Capric.	4	13 55 J	10,5 N	P
			14 45 E	3,9 N	
26	44 Cancri	8	12 47 J	10,5 S	P
			13 11 J	5,1 S	
26	47 δ Cancri	4, 5	14 2 E	2,9 N	P

M A Y.

6	Scorpii 621 M.	7	11 43 J	13,9 N	P
			12 44 E	6,9 S	
7	Sagittarii	7, 8	12 0 J	9,5 S	P
			13 15 E	2,5 S	
8	28 Sagittarii	6	11 14 J	6,1 S	P
			12 24 E	1,8 S	
8	Sagittarii	8	13 59 J	9,0 N	P
			15 6 E	11,0 N	
10	. . .	7	12 43 J	11,1 S	L. XIII
			13 34 E	12,1 S	
22	56 ϕ Gemin.	5, 6	11 39 J	13,5 N	P
24	Leonis 278 P.	6, 7	12 35 J	8,1 N	P. A.
25	Leonis 441 M.	7, 8	11 53 J	16,1 S	P
25	. . .	8	11 10 J	4,2 S	L. XIII.
25	. . .	8	11 35 J	8,2 S	L. XIII.
29	80 L ³ Virg.	6	10 54 J	13,2 S	P

JUNIUS.

Tage	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
5	Sagitt. 776 M.	6	{ 9 56 J 10 56 E	6,6 S 4,6 S	P
5	. . .	6	{ 10 18 J 11 26 E	1,0 N 3,0 N	L. XIII
5	. . .	6,7	{ 13 6 J 14 19 E	5,5 S 6,5 S	L. XIII.
8	Capric. 903 M.	7,8	{ 10 1 J	. . .	P
22	53 L Leonis	6	{ 8 20 J	14,0 S	P
23	. . .	6,7	{ 12 3 J	7,1 S	L. XIII
28	46 θ Librae	6	{ 15 19 J	8,0 S	P
30	40 ε Oph.	4,5	{ 7 51 J 8 45 E	13,6 S 7,6 S	P

JULIUS.

6	Aquarii	0	{ 13 13 J	12,9 N	P
7	95 ♀ ³ Aquar.	5,6	{ 12 51 J	14,2 N	P
8	30 Piscium	4,5	{ 9 41 J 10 27 E	4,6 S 12,6 S	P
8	33 Piscium	5	{ 11 21 J 12 14 E	3,2 S 12,7 S	P
11	87 μ Ceti	4	{ 17 23 J 18 18 E	13,2 N 0,2 N	P
19	. . .	7,8	{ 7 42 J	3,1 S	L. XIII
19	. . .	7	{ 4 3 J	5,0 S	L. VIII
19	. . .	7,8	{ 7 58 J	2,3 S	L. XIII
26	7x Serpentar.	5	{ 13 51 J 14 39 E	5,6 N 8,6 N	P
27	Serpentarii	7,8	{ 10 27 J	2,1 S	P
29	32 ♀ ¹ Sagitt.	5,6	{ 11 18 J	10,6 S	P
29	25 ♀ ² Sagitt.	5	{ 11 49 J 12 55 E	6,5 S 8,6 S	P

AUGUST.

4	Ceti	7	{ 15 46 J 16 57 E	1,7 N 12,3 S	P
7	Ceti	8	{ 12 13 J 13 15 E	3,4 N 10,1 S	P

AUGUST.

Tag	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
7	73 ξ^2 Ceti	5	$\left\{ \begin{array}{l} 16 \ 15 \ J \\ 17 \ 29 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 0,5 \ N \\ 12,0 \ S \end{array}$	P
11	Gemin. 248 M.	8	$\left\{ \begin{array}{l} 17 \ 1 \ J \\ 17 \ 56 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 8,8 \ N \\ 6,8 \ N \end{array}$	P
11	Gemin. 249 M.	8	$\left\{ \begin{array}{l} 17 \ 12 \ J \\ 17 \ 56 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 12,0 \ N \\ 10,9 \ N \end{array}$	P
21	. . .	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 9 \ 22 \ J \\ 8 \ 3 \ J \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 13,2 \ S \\ 4,7 \ N \end{array}$	L. X
24	58 D Serptar.	5	$\left\{ \begin{array}{l} 8 \ 3 \ J \\ 8 \ 17 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 4,7 \ N \\ 7,7 \ N \end{array}$	P
25	. . .	6, 7	$\left\{ \begin{array}{l} 8 \ 43 \ J \\ 8 \ 18 \ J \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 2,3 \ N \\ 0,5 \ S \end{array}$	L. VII
26	. . .	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 8 \ 18 \ J \\ 7 \ 53 \ J \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 0,5 \ S \\ 7,5 \ S \end{array}$	L. X
26	. . .	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 8 \ 18 \ J \\ 7 \ 53 \ J \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 0,5 \ S \\ 7,5 \ S \end{array}$	L. X

SEPTEMBER.

9	7	$\left\{ \begin{array}{l} 15 \ 50 \ J \\ 16 \ 37 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 8,9 \ S \\ 8,9 \ S \end{array}$	L. XIII
20	40 ϵ Serptar.	4, 5	$\left\{ \begin{array}{l} 5 \ 59 \ J \\ 6 \ 30 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 12,4 \ N \\ 14,4 \ N \end{array}$	P
20	Scorpii	6	$\left\{ \begin{array}{l} 8 \ 12 \ J \\ 9 \ 25 \ J \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 1,2 \ S \\ 1,0 \ S \end{array}$	P
20	Serpentar. 428 P.	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 9 \ 25 \ J \\ 9 \ 27 \ J \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 1,0 \ S \\ 2,0 \ N \end{array}$	P A
20	Serpentar.	8	$\left\{ \begin{array}{l} 9 \ 27 \ J \\ 8 \ 30 \ J \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 2,0 \ N \\ 13,8 \ N \end{array}$	P
27	95 ψ^3 Aquar.	5	$\left\{ \begin{array}{l} 8 \ 30 \ J \\ 9 \ 29 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 13,8 \ N \\ 4,3 \ N \end{array}$	P

OCTOBER.

1	87 μ Ceti	4	$\left\{ \begin{array}{l} 11 \ 35 \ J \\ 12 \ 3 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 9,0 \ S \\ 15,0 \ S \end{array}$	P
5	7	$\left\{ \begin{array}{l} 17 \ 1 \ J \\ 18 \ 8 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 6,1 \ S \\ 7,1 \ S \end{array}$	L. IX
6	Geminor.	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 13 \ 31 \ J \\ 14 \ 12 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 11,4 \ N \\ 9,9 \ N \end{array}$	P
7	35 Cancr	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 11 \ 0 \ J \\ 11 \ 33 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 10,9 \ N \\ 11,4 \ N \end{array}$	P
7	41 Canc. 360 P.	7	$\left\{ \begin{array}{l} 12 \ 21 \ J \\ 13 \ 28 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 11,0 \ N \\ 11,0 \ N \end{array}$	P. A.
7	Cancr 362 M.	7, 8	$\left\{ \begin{array}{l} 13 \ 6 \ J \\ 13 \ 34 \ E \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} 13,7 \ N \\ 13,7 \ N \end{array}$	P

OCTOBER.

Tage	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
			^h		
7	. . .	8	{ 12 42 J	0,8 S	L. XIII
			{ 13 32 E	0,3 S	
7	. . .	7	{ 13 4 J	7,5 N	L. XIII
			{ 13 49 E	8,0 N	
7	Cancrī 205 P.	8	{ 12 33 J	13,0 N	P. A.
			{ 12 52 E	13,5 N	
7	Cancrī 355 M. mit zwey folg.	7	{ 12 36 J	10,6 N	P. A.
			{ 13 14 E	11,1 N	
7	Cancrī 372 M.	7	{ 17 53 J	15,3 S	P. A.
			{ 18 19 E	13,8 S	
16	. . .	6, 7	8 11 J	5,3 S	L. X.
18	. . .	7, 8	9 19 J	9,9 N	L. X.
18	. . .	7, 8	5 19 J	13,1 S	L. X.
18	. . .	6, 7	9 4 J	3,0 S	L. X.
18	. . .	7, 8	9 39 J	5,6 S	L. X.
19	. . .	7, 8	8 59 J	10,0 N	L. XIII.
25	Ceti . . .	7	15 44 J	11,7 S	P
30	61 ²¹ Tauri	4	14 46 J	. . .	P
30	68 ²³ Tauri	5	{ 16 10 J	3,8 S	P
			{ 17 10 E	10,3 S	
31	Tauri 164 M.	7	{ 11 53 J	4,7 S	P
			{ 12 45 E	12,7 S	

NOVEMBER.

3	Cancrī 349 M.	8	{ 17 26 J	14,1 S	P
			{ 17 59 E	9,6 S	
3	38 ⁰ Cancrī	7	{ 19 22 J	0,8 N	P
			{ 20 28 E	9,3 N	
3	Cancrī 359 M. mit d. vorheig.	6	{ 19 46 J	3,1 S	P
			{ 20 54 E	6,4 N	
3	41 Canc. 60 M	7	{ 19 55 J	9,5 S	P. A.
			{ 21 0 E	0,0 S	
3	42 ^E Cancrī	7, 8	{ 20 47 J	1,5 N	P
			{ 21 0 E	10,5 N	
3	. . .	8	{ 15 22 J	2,8 N	L. XIII
			{ 16 32 E	6,8 N	

Mon. Corr. XXVIII. Bd. 1813.

P.

NOVEMBER.

Tage	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
			h		
3	. . .	7, 8	{ 11 44 J	0,9 S	L. XIII
			{ 12 35 E	0,4 S	
3	Cancrī 362 M.	7, 8	{ 20 6 J	5,8 S	P
			{ 21 12 E	4,7 N	
3	Cancrī 204 P.	8	{ 19 6 J	6,9 S	P. A.
			{ 20 17 E	2,1 N	
3	Cancrī 205 P.	8	{ 19 15 J	11,5 N	P. A.
			{ 20 17 E	3,0 S	
3	Cancrī 355 M. mit zwey folg.	7	{ 19 42 J	12,0 S	P. A.
			{ 20 39 E	4,0 S	
3	Cancrī 209 P.	0	{ 19 53 J	10,9 S	P. A.
			{ 20 54 E	1,9 S	
4	83 Cancrī	6	{ 10 4 J	2,2 N	P. A.
			{ 10 49 E	5,7 N	
5	. . .	6, 7	{ 16 1 J	4,3 N	L. XIII
			{ 16 58 E	12,8 N	
5	. . .	7	{ 18 6 J	1,1 N	L. XIII
			{ 19 15 E	12,2 N	
13	Scorpii 657 M.	6, 7	{ 4 59 J	7,5 N	P
14	Serpentarii	8	{ 4 57 J	0,9 S	P
14	52 Serpentar.	6, 7	{ 8 10 J	8,3 N	P
15	. . .	7	{ 6 32 J	8,2 N	L. XIII
16	. . .	8	{ 3 6 J	2,6 S	L. XIII
16	. . .	8	{ 9 21 J	9,7 S	L. XIII
17	. . .	8	{ 8 33 J	11,2 S	L. XIII
17	4 Capricorni	6	{ 10 32 J	12,4 S	P
18	22 η Capric.	5	{ 8 24 J	0,9 S	P
			{ 9 28 E	9,9 S	
29	. . .	7	{ 5 59 J	2,1 S	L. IX
29	55 δ Gemin.	3, 4	{ 20 12 J	8,8 N	P
			{ 20 50 E	12,3 N	

DECEMBER.

1	. . .	7	{ 16 20 J	16,3 S	L. VIII
			{ 16 49 E	12,8 S	
1	83 Cancrī	6	{ 17 47 J	15,8 S	P
			{ 18 12 E	12,3 S	

DECEMBER.

Tage	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
3	. . .	7	{ 14 33 J 15 37 E	1,8 S 12,3 N	L. VIII
4	. . .	7	{ 13 30 J 14 33 E	6,9 S 4,6 N	L. VIII
5	. . .	6, 7	{ 19 48 J 21 8 E	6,9 S 10,4 S	L. X
18	95 χ^3 Aquar.	5	{ 12 14 J 12 50 E	13,9 N 5,9 N	P
19	Ceti . .	7	8 46 J	11,9 N	P
19	Ceti . .	8	9 31 J	6,7 N	P
19	Ceti . .	8	9 34 J	7,0 N	P
19	30 Piscium	4, 5	10 17 J	. . .	P
24	61 β^1 Tauri	4	{ 11 23 J 11 26 E	15,0 S 16,5 S	P
24	68 β^3 Tauri	5	{ 12 25 J 13 29 E	0,8 N 7,2 S	P
28	Cancr ³⁴⁹ M.	8	8 14 J	. . .	P
28	38 α Cancr ⁱ	7	{ 9 32 J 10 14 E	12,8 S 10,8 S	P
28	39 Cancr ⁱ	6	{ 9 31 J 10 30 E	1,1 N 4,1 N	P
28	14 Cancr ⁱ	6	{ 9 34 J 10 35 E	1,1 S 1,9 N	
28	Cancr ³⁵⁹ M. indem vorberg.	6	10 9 J	. . .	P
28	42 E Cancr ⁱ	7, 8	{ 10 6 J 10 37 E	14,6 S 13,1 S	P
28	Cancr ³⁶³ M.	7	{ 10 18 J 11 21 E	4,6 S 1,1 S	P
28	Cancr ⁵⁸⁸ Z.	8	{ 9 7 J 10 2 E	5,1 S 2,6 S	Z
29	26 Leonis	7, 8	{ 19 27 J 20 20 E	11,0 S 0,6 N	P

NOVEMBER.

Tage	Namen der Sterne	Gröfs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
3	. . .	7, 8	{ 11 44 J 12 35 E	0,9 S 0,4 S	L. XIII
3	Cancr ₃₆₂ M.	7, 8	{ 20 6 J 21 12 E	5,8 S 4,7 N	P
3	Cancr ₂₀₄ P.	8	{ 19 6 J 20 17 E	6,9 S 2,1 N	P. A.
3	Cancr ₂₀₅ P.	8	{ 19 15 J 20 17 E	11,5 N 3,0 S	P. A.
3	Cancr ₃₅₅ M. mit zwey folg.	7	{ 19 42 J 20 39 E	12,0 S 4,0 S	P. A.
3	Cancr ₂₀₉ P.	0	{ 19 53 J 20 54 E	10,9 S 1,9 S	P. A.
4	83 Cancr _i	6	{ 10 4 J 10 49 E	2,2 N 5,7 N	P. A.
5	. . .	6, 7	{ 16 1 J 16 58 E	4,3 N 12,8 N	L. XIII
5	. . .	7	{ 18 6 J 19 15 E	1,1 N 12,2 N	L. XIII
13	Scorpii ₆₅₇ M.	6, 7	{ 4 59 J	7,5 N	P
14	Serpentarii	8	{ 4 57 J	0,9 S	P
14	52 Serpentar.	6, 7	{ 8 10 J	8,3 N	P
15	. . .	7	{ 6 32 J	8,2 N	L. XIII
16	. . .	8	{ 3 6 J	2,6 S	L. XIII
16	. . .	8	{ 9 21 J	9,7 S	L. XIII
17	. . .	8	{ 8 33 J	11,2 S	L. XIII
17	4 Capricorni	6	{ 10 32 J	12,4 S	P
18	22 η Capric.	5	{ 8 24 J 9 28 E	0,9 S 9,9 S	P
29	. . .	7	{ 5 59 J	2,1 S	L. IX
29	55 δ Gemin.	3, 4	{ 20 12 J 20 50 E	8,8 N 12,3 N	P

DECEMBER.

1	. . .	7	{ 16 20 J 16 49 E	16,3 S 12,8 S	L. VIII
1	83 Cancr _i	6	{ 17 47 J 18 12 E	15,8 S 12,3 S	P

DECEMBER.

Tage	Namen der Sterne	GröÙs.	Zeit der Bedeckung	Ort des Ein- oder Austritts	Catalog
3	7	h 14 33 J 15 37 E	1,8 S 12,3 N	L. VIII
4	7	13 30 J 14 33 E	6,9 S 4,6 N	L. VIII
5	6, 7	19 48 J 21 8 E	6,9 S 10,4 S	L. X
18	95 χ^3 Aquar.	5	12 14 J 12 50 E	13,9 N 5,9 N	P
19	Ceti . . .	7	8 46 J	11,9 N	P
19	Ceti . . .	8	9 31 J	6,7 N	P
19	Ceti . . .	8	9 34 J	7,0 N	P
19	30 Piscium	4, 5	10 17 J	. . .	P
24	61 ϵ^1 Tauri	4	11 23 J 11 26 E	15,0 S 16,5 S	P
24	68 ϵ^3 Tauri	5	12 25 J 13 29 E	0,8 N 7,2 S	P
28	Canceri 349 M.	8	8 14 J	. . .	P
28	38 \circ Canceri	7	9 32 J 10 14 E	12,8' S 10,8 S	P
28	39 Canceri	6	9 31 J 10 30 E	1,1 N 4,1 N	P
28	14 Canceri	6	9 34 J 10 35 E	1,1 S 1,9 N	
28	Canceri 359 M. mit dem vorherg.	6	10 9 J	. . .	P
28	42 E Canceri	7, 8	10 6 J 10 37 E	14,6 S 13,1 S	P
28	Canceri 363 M.	7	10 18 J 11 21 E	4,6 S 1,1 S	P
28	Canceri 588 Z.	8	9 7 J 10 2 E	5,1 S 2,6 S	Z
29	26 Leonis	7, 8	19 27 J 20 20 E	11,0 S 0,6 N	P

Gerade Aufsteigungen und Abweichungen der
kleinern unbenannten Sterne in vorste-
hender Ephemeride.

Monat und Tag	Catalog	Größe	Gerade Aufsteigung für 1814	Abweichung für 1814
Jan. 10	La Lande XIII	6, 7	174 54	6 14 N
14	Piazzi	8	224 6	12 11 S
16	La Lande X	7	248 40	18 47 S
25	La Lande VIII	7	354 45	7 23 S
28	Piazzi	8	32 56	6 54 N
31	La Lande IX	7	75 40	18 45 N
Febr. 1	La Lande XIII	6, 7	94 13	20 21 N
12	La Lande XI	7, 8	241 57	16 55 S
12	La Lande XI	8	242 21	17 2 S
14	Piazzi	7	269 22	21 28 S
Marz 2	La Lande XI	6, 7	117 35	20 19 N
15	La Lande XIII	8	289 1	21 57 S
15	La Lande XIII	8	289 50	21 51 S
15	Piazzi	7, 8	290 18	21 54 S
28	La Lande IX	7	98 18	21 2 N
28	La Lande IX	7	98 22	20 53 N
29	La Lande IX	7	117 29	20 19 N
29	La Lande XI	6, 7	117 35	20 19 N
April 1	La Lande VIII	7	158 39	11 21 N
2	Piazzi	7, 8	171 45	7 9 N
10	Piazzi	7	269 23	21 27 S
13	La Lande XIII	7, 8	310 44	20 6 S
May 7	Piazzi	7, 8	266 18	21 54 S
8	Piazzi	8	279 52	22 28 S
10	La Lande XIII	7	304 58	21 19 S
25	La Lande XIII	8	151 58	13 49 N
25	La Lande XIII	8	152 10	13 43 N
Jun. 5	La Lande XIII	6	287 34	22 37 S
5	La Lande XIII	6, 7	288 39	22 48 S
23	La Lande XIII	6, 7	174 54	6 13 N
Jul. 6	Piazzi	0	335 33	14 33 S
19	La Lande XIII	7, 8	154 11	13 26 N
19	La Lande VIII	7	154 53	13 8 N
19	La Lande XIII	7, 8	154 20	13 23 N
27	Piazzi	7, 8	255 1	20 24 S

Monat und Tag	Catalog	Größe	Gerade Aufsteigung für 1813	Abweichung für 1814
Aug. 4	Piazzi	7	357° 32'	6° 55' S
7	Piazzi	8	32 57	6 54 N
21	La Lande X	7, 8	226 1	13 31 S
25	La Lande VII	6, 7	275 52	22 41 S
26	La Lande X	7, 8	288 39	22 48 S
26	Idem	7, 8	288 22	22 55 S
Sept. 9	La Lande XIII	7	118 11	20 50 N
20	Piazzi	6	258 24	21 15 S
20	Piazzi	8	258 55	21 14 S
Oct. 5	La Lande IX	7	99 10	21 53 N
6	Piazzi	7, 8	111 45	21 46 N
7	La Lande XIII	8	127 25	20 0 N
7	Idem	7	127 38	20 8 N
16	La Lande X	6, 7	241 0	18 3 S
18	Idem	7, 8	267 4	22 26 S
18	Idem	7, 8	265 17	22 37 S
18	Idem	6, 7	266 56	22 29 S
18	Idem	7, 8	267 12	22 31 S
19	La Lande XIII	7, 8	279 45	23 2 S
25	Piazzi	7	357 32	6 55 S
Nov. 3	La Lande XIII	8	125 29	20 46 N
3	Idem	7, 8	123 31	20 45 N
5	Idem	6, 7	154 42	14 14 N
5	Idem	7	155 36	13 52 N
14	Piazzi	8	260 37	21 59 S
15	La Lande VIII	7	274 13	23 6 S
16	La Lande XIII	8	285 59	23 24 S
16	Idem	8	288 29	23 23 S
17	Idem	8	300 51	22 35 S
29	La Lande IX	7	99 10	21 53 N
Dec. 1	La Lande VIII	7	136 33	18 41 N
3	Idem	7	164 23	11 13 N
4	Idem	7	166 49	6 23 N
5	La Lande X	6, 7	191 44	0 0
19	Piazzi	7	357 33	6 55 S
19	Piazzi	8	357 54	6 52 S
19	Piazzi	8	357 55	6 51 S

XXVI.

Über die Störungen der Vesta.

Von Herrn *Burckhardt*, Mitglied des Pariser Instituts.

Nachfolgende Resultate sind der Auszug aus einer Arbeit, welche den 7. Sept. 1807 dem Institute überreicht ward. Ich habe nicht geeilt, sie bekannt zu machen, weil ich immer hoffte, eine ältere Beobachtung der Vesta aufzufinden, wodurch es möglich geworden wäre, die Umlaufszeit dieses Planeten, und dadurch auch seine Störungen genauer zu bestimmen. Da meine Arbeit vielleicht ganz vollständig ist, da ich die Störungen, wo es nöthig war, mit zwey verschiedenen Voraussetzungen für die halbe Axe berechnet habe, wodurch das Interpoliren möglich wird, so schmeichle ich mir, daß diese Arbeit für die Freunde der Wissenschaft nicht ganz ohne Interesse seyn wird. Folgendes sind die allgemeinen Resultate:

- 1) Die Planeten Uranus, Erde, Venus und Mercur haben keinen merklichen Einfluß auf Vesta.
- 2) Saturn bringt nur zwey Gleichungen von $4''\frac{1}{2}$ hervor; Mars eine von $5''$ und eine von $17''$.
- 3) Jupiter bringt 4 Gleichungen von $2'$, zwey von $3'$ und eine von $6'$ hervor.
- 4) Vergrößert man die halbe Axe der Vesta um $\frac{1}{40}$, so wird Jupiter 4 Gleichungen von $2'$, eine von $4'$,

4', eine von 6', eine von 10' und eine von 17' hervorbringen.

- 5) Die jährliche Bewegung der Sonnen-Nähe ist 93,"8 (oder 96,"5 mit der zweyten Axe,) die des Knotens + 15", die der Excentricit. + 0,"87 und die der Neigung unmerklich.

Hier folgen nun die Details:

♀ gibt $- 0,"000078 \sin (\varphi - \odot) - 0,"0000001 \sin 2 (\varphi - \odot)$

Die Glieder, welche von den Excentricitäten abhängen, sind auch ganz unmerklich.

♀ gibt $+ 0,"17 \sin (\varphi - \odot) - 0,"001 \sin 2 (\varphi - \odot)$

Ich habe mich versichert, daß unter den von den Excentricitäten abhängigen Glieder kein beträchtliches ist.

♂ gibt $+ 0,"25 \sin (\delta - \odot) - 0,"011 \sin 2 (\delta - \odot) - 0,"002 \sin 3 (\delta - \odot)$

Für die übrigen Glieder gilt die vorhergehende Bemerkung.

♂ gibt $+ 1,"52 \sin (\delta - \odot) - 0,"09 \sin 2 (\delta - \odot) - 0,"02 \sin 3 (\delta - \odot)$

$+ 0,"16 \sin (\delta - \text{Perih. } \odot) - 5,"40 \sin (2 \odot - \delta - \text{Perih. } \odot)$

$+ 16,"76 \sin (2 \odot - \delta - \text{Perih. } \delta) - 1,"23 \sin (3 \odot - 2 \delta - \text{Perih. } \odot)$

$+ 0,"86 \sin (3 \odot - 2 \delta - \text{Perih. } \delta)$

Ich habe acht Glieder mehr berechnet, sie sind ganz unmerklich.

h gibt

$$\begin{aligned}
h \text{ gibt } & - 4,^{\circ}50 \sin (\zeta - h) + 2,^{\circ}11 \sin 2 (\zeta - h) \\
& - 0,^{\circ}16 \sin 3 (\zeta - h) \\
& + 1,^{\circ}03 \sin (h - \text{Perih. } \zeta) - 1,^{\circ}41 \sin (h - \text{Perih. } h) \\
& - 4,^{\circ}57 \sin (2 h - \zeta - \text{Perih. } \zeta) + 0,^{\circ}50 \sin \\
& (2 h - \zeta - \text{Perih. } h) \\
& + 0,^{\circ}48 \sin (3 h - 2 \zeta - \text{Perih. } \zeta) - 0,^{\circ}57 \sin \\
& (3 h - 2 \zeta - \text{Perih. } h) \\
& - 0,^{\circ}53 \sin (2 \zeta - h - \text{Perih. } \zeta) + 0,^{\circ}29 \sin \\
& (3 \zeta - 2 h - \text{Perih. } \zeta)
\end{aligned}$$

Ich habe noch zwey Glieder mehr berechnet, sie sind aber unmerklich.

$$\begin{aligned}
\delta \text{ gibt } & - 0,^{\circ}11 \sin (\zeta - \delta) + 0,^{\circ}03 \sin 2 (\zeta - \delta) \\
& + 0,^{\circ}001 \sin 3 (\zeta - \delta)
\end{aligned}$$

Den Gleichungen, welche Jupiter hervorbringt, werde ich doppelte Werthe geben; die erste Columne enthält sie in der Voraussetzung, daß der Logarithmus der halben großen Axe der Vesta 0,373 ist; die zweyte in der Voraussetzung, daß derselbe Logarithmus 0,385 ist. Einige Glieder verändern sich gewältig; dies rührt von den kleinen Divisoren her, welche diese Glieder erhalten. Will man interpoliren, so muß es zwischen den Dividenten geschehen; den kleinen Divisor berechnet man hernach direct. Wäre es mir übrigens geglückt, eine ältere Beobachtung aufzufinden, so hätte ich mit der neuen Axe die Rechnung wiederholt, um allen Einfluß des Interpolirens zu vermeiden.

$$\begin{array}{l|l|l}
-114,5 & -128,3 & \sin (\zeta - 4) \\
+132,9 & +125,4 & \sin 2 (\dots) \\
+13,8 & +14,6 & \sin 3 (\dots) \\
+2,9 & +3,2 & \sin 4 (\dots) \\
+0,8 & +0,9 & \sin 5 (\dots) \\
+0,2 & +0,2 & \sin 6 (\dots)
\end{array}$$

Hiermit muß man noch folgende Glieder vereinigen, welche von den Quadraten der Excentricitäten abhängen:

$$+ 0,3 \sin(\zeta - \square) - 3,7 \sin 2(\zeta - \square) + 6,6 \sin 3(\zeta - \square) \\ + 2,0 \cos(\zeta - \square) - 1,0 \cos 2(\zeta - \square) + 12,8 \cos 3(\zeta - \square)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 18,9 \mid + 19,1 \mid \sin(\zeta - \text{Perihel. } \square) \\ - 14,5 \mid - 9,9 \mid \sin(\zeta - \text{Perihel. } \zeta) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 132,8 \mid + 249,0 \mid \sin(3\zeta - 2\square - \text{Perih. Vesta}) \\ - 168,5 \mid - 370,0 \mid \sin(3\zeta - 2\square - \text{Perih. Jupit.}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 1,0 \mid + 1,1 \mid \sin(5\zeta - 4\square - \text{Perih. Vesta}) \\ - 1,3 \mid - 1,7 \mid \sin(\quad \quad \quad - \quad \quad \quad \text{Jupit.}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} - 10,9 \mid - 6,4 \mid \sin(2\square - \zeta - \text{Perih. Vesta}) \\ - 0,9 \mid - 0,3 \mid \sin(\quad \quad \quad \text{Jupit.}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 0,4 \sin(4\square - 3\zeta - \text{Perih. Vesta}) \\ - 0,1 (\quad \quad \quad \text{Jupit.}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 2,9 \mid + 3,0 \mid \sin(\zeta + \square - 2 \text{ Perih. Vesta}) \\ - 3,0 \mid - 2,4 \mid \quad \quad \quad - \text{Perih. Vesta} - \text{Perih. Jup.} \\ + 0,2 \mid + 0,2 \mid \quad \quad \quad - 2 \text{ Perih. Jupit.} \\ + 0,9 \mid + 1,2 \mid \quad \quad \quad - 2 \Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 186,0 \mid + 703,2 \mid \sin(3\zeta - \square - 2 \text{ Perih. Vesta}) \\ - 369,3 \mid - 1019,7 \mid \quad \quad \quad - \text{Perih. } \square - \text{Per. Jup.} \\ + 31,1 \mid + 115,0 \mid \quad \quad \quad - 2 \text{ Perih. Jupit.} \\ + 32,1 \mid + 115,5 \mid \quad \quad \quad - 2 \Omega \text{ Jupiter} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 1,6 \mid + 3,1 \mid \sin(5\zeta - 3\square - 2 \text{ Perih. Vesta}) \\ + 4,4 \mid + 6,2 \mid \quad \quad \quad - \text{Perih. Vesta} - \text{Perih. Jup.} \\ - 2,3 \mid - 3,1 \mid \quad \quad \quad - 2 \text{ Perih. Jupit.} \\ - 0,2 \mid - 0,3 \mid \quad \quad \quad - 2 \Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} - 0,7 \mid \sin(3\square - \zeta - 2 \text{ Perih. Vesta}) \\ - 0,1 \mid \quad \quad \quad - \text{Per. Vesta} - \text{Perih. Jupit.} \\ - 0,0 \mid \quad \quad \quad - 2 \text{ Perih. } \zeta \\ + 0,1 \mid \quad \quad \quad - 2 \Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} - 120,3 \mid - 102,4 \mid \sin(2\zeta - \square - \text{Perih. Vesta}) \\ + 24,3 \mid + 14,1 \mid \sin(2\zeta - \square - \text{Perih. Jupit.}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 4,7 \mid + 5,3 \mid \sin(4\zeta - 3\square - \text{Perih. Vesta}) \\ - 6,1 \mid - 7,8 \mid \sin(4\zeta - 3\square - \text{Perih. Jupit.}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 0,3 \mid + 0,4 \mid \sin(6\zeta - 5\square - \text{Perih. Vesta}) \\ - 0,4 \mid - 0,6 \mid \quad \quad \quad \text{Jupit.}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 11,2 \mid + 6,9 \mid \sin(3\square - 2\zeta - \text{Perih. Vesta}) \\ - 0,4 \mid - 1,0 \mid \quad \quad \quad \text{Jupiter}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l|l|l} -12,9 & -12,8 & \sin(24 - 2 \text{ Perih. Vesta}) \\ +1,6 & +4,6 & \cdot \cdot \cdot \text{ Perih. Vesta} - \text{Perih. Jupit. } \mathcal{Z} \\ -0,8 & -1,0 & \cdot \cdot \cdot 2 \text{ Perih. } 24 \\ -1,7 & -2,0 & \cdot \cdot \cdot 2 \Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l|l|l} +14,4 & +15,8 & \sin(4 \mathcal{Z} - 2 \square - 2 \text{ Perih. Vesta}) \\ -28,8 & -30,1 & \cdot \cdot \cdot \text{ Perih. Vesta} - \text{Perih. Jupit.} \\ +14,1 & +14,3 & \cdot \cdot \cdot 2 \text{ Perih. Jupit.} \\ +8,3 & +2,8 & \cdot \cdot \cdot 2 \Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l|l|l} +0,5 & & \sin(6 \mathcal{Z} - 4 \square - 2 \text{ Perih. Vesta}) \\ +1,0 & & \cdot \cdot \cdot \text{ Perih. Vesta} - \text{Perih. Jupit.} \\ -0,5 & & \cdot \cdot \cdot 2 \text{ Perih. Jupit.} \\ +0,2 & & \cdot \cdot \cdot 2 \Omega \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -0,6 (\sin 4 \square - 2 \mathcal{Z} - 2 \text{ Perihel. Vesta}) \\ \text{die drey übrigen Glieder sind 0.} \end{array} \right.$$

Gleichungen für die Breite der Vesta,
(wo $\Omega = 104^\circ$).

$$\left\{ \begin{array}{l|l|l} -4,5 & -4,8 & \sin(\mathcal{Z} - \Omega) \\ -3,7 & -4,0 & \cos(\square - \Omega) \\ +7,5 & +8,2 & \sin(\mathcal{Z} - \Omega) \\ +5,0 & +5,5 & \sin(2 \mathcal{Z} - \square - \Omega) \\ -13,6 & -29,7 & \sin(3 \mathcal{Z} - 2 \square - \Omega) \\ -0,6 & -0,7 & \sin(4 \mathcal{Z} - 3 \text{ Vesta} - \Omega) \\ -0,1 & -0,1 & \sin(5 \mathcal{Z} - 4 \text{ Vesta} - \Omega) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l|l|l} -1,3 & -1,5 & \sin(2 \text{ Vesta} - \mathcal{Z} - \Omega) \\ -0,3 & -0,3 & \sin(3 \text{ Vesta} - 24 - \Omega) \\ -0,1 & -0,1 & \sin(4 \text{ Vesta} - 3 \mathcal{Z} - \Omega) \end{array} \right.$$

XXVII.

Auszug
aus einem Schreiben
des Ruff. Kaif. Kammer-Affeffors
Dr. U. J. Seetzen.

(Fortfetz. zu S. 182 des Februar-Hefts von 1813.)

Mocha, am 17. Nov. 1810.

Den 27. Jun. verliessen wir die Residenzstadt und ritten über Seijân und Surrâdche nach Damâr, wo wir den 30. Jun. ankamen. Bis Seijân gewöhnlich jaspisartiges Gestein; an einer Stelle Sandstein; nachher auch Jaspis; poröse Lava (?) und Pockenstein. Hinter Surrâdsche bestanden die Berge aus blauer und schwarzer poröser Lava (oder Wacke?), und sie hatten oft ein so schwarzes wildes Ansehen, daß man glauben sollte, sie seyen vulcanischen Ursprungs. An einer Stelle ragten auf dem Wege Felsenboden von Mandelstein hervor. Auch der nackte ebene Felsenboden, worauf Damâr erbaut ist, besteht aus dem genannten porösen Gestein, oft mit weissen Kalkspaththeilchen.

In Surrâdche hatte ich vergebens nach Eddoffâ gefragt, wo sich nach Niebuhr hamjaritische Inschriften finden sollten, und das nach seiner Angabe in dieser Gegend seyn mußte. Kein Mensch kannte es.

Die

Die Berge an dem Wege von Damâr nach Jerîm hatten eben das wilde melancholische Ansehen, als zwischen Damâr und Surâdsche; alle Steinart schwarz und porös.

Von Jerîm ritten wir nach Doffâr oder Dsoffâr, den Ruinen des alten Sitzes des hanjaritischen Regenten. Berge, von jener schwarzen porösen Wacke, und nahe vor Doffâr beträchtliche Massen von schwarzen Pechstein darinn. Zu meiner grossen Freude hatte ich hier und in dem nahen Dorfe Mankât das Glück, etliche hamjaritische Inschriften zu entdecken, welche ich mit diesem Paquet dem Hrn. Agenten von *Hammer* für die Fundgruben überfende. Sie sind vielleicht die ersten Inschriften dieser Art, welche von einem Europäer copirt wurden. Auf dem Berggipfel sieht man noch das Fundament von dem Palast des Königs Allâd Ibn Kemel; er besteht aus sieben Fuß langen und verhältnißmäfsig dicken und breiten Porphyquadern, welche ohne Mörtel auf genaueste auf einander schliessen. Also gerade die altägyptische, altrömische und altgriechische Bauart, wovon ich so manche Proben gesehen hatte.

Am 6. Jul. setzten wir unsere Reise nach Aden weiter fort. Wir passirten den ansehnlichen Sumâra, welcher aus Jaspis, Porphyr, Wacke und Pechstein besteht. Wir blieben in Mechader, und erreichten am folgenden Tage Ibb oder Äbb, ein artiges Städtchen auf einem Berge mit den lieblichsten und fruchtbarsten Feldern umgeben. Zwischen Ibb und Taäs kamen wir über einen beträchtlichen Berg, el Tâker, wo wir in einen ungeheuern Schwarm von Heuschrecken geriethen, von welchen wir nicht nur
den

den ganzen Tag, sondern auch des folgenden Tages, etliche Stunden lang umgeben waren. Alle Schwärme von diesem Insecte, die ich an andern Orten gesehen hatte, waren Kleinigkeiten dagegen, und selbst Schech Hamse, welcher aus einem Lande der Heuschrecken war, hatte nie einen solchen Zug gesehen.

Den 12. Jul. kamen wir in Taäs an, einer Stadt, die vormals bedeutend, jetzt grösstentheils in Ruinen liegt, und höchstens den Namen eines Marktfleckens verdient. Taäs liegt am Fusse des sehr hohen und schroffen Berges Szábbar, welcher wenigstens unten, wie seine Vorberge, aus Granit bestehen. Nirgends fanden wir schönere Mango, als hier.

Von hier weiter nach Aden fängt der Weg schon an nicht mehr so sicher zu seyn, als im übrigen Jemen, weil das Beduinengebiet zwischen den Besitzungen des Imám und des Sultans von Aden, gleich einem Sumpfe, seine übeln Wirkungen über seine Nachbarn verbreitet. Die Gegend ist nach dieser Seite auch beträchtlich öder, als nordwärts von Taäs. Nur mit Mühe erlangten wir einen Eseltreiber, der uns mit seinen schwachen Thieren nach dem Gränzorte des Gebiets von Imám brachte. Wir traten den 14. Julius unsere Reise dahin an. Die Berge bestanden anfangs aus dem schwarzen vorhin so oft genannten Gestein; dann wieder aus Jaspis und Porphyr, manchmal mit Mandelstein abwechselnd. Den 15. Jul. kamen wir in Maánwijáh, einem kleinen geringen Dorfe an, wo gleich darauf das Gebiet der Beduinen vom Stamme Hauáschib anfängt, welches

ches sich bis eine Tagreise nordwärts von Lahhak erstreckt, wo der Sultan von Aden wohnt.

Wir nahmen Beduinen von diesem Stamme an, die uns nach Lahhek führten, bis wohin wir uns mit Lebensmitteln verfahren, weil alles verwüßtet. Die Berge blieben, wie vorhin, d. h. sie bestanden aus Porphyr, Jaspis und dem porösen schwarzen Gestein, und die Thäler waren mit vielem Gebüsch bewachsen. Wir brachten vier Tage auf dieser Reise zu. Ich muß Ihnen ein Beyspiel anführen, wie sehr verschieden das Geschicke der Reisenden sey. Alle Reisenden versichern, daß die Gebüsche von Jemen voll von Affen seyen, und *Barthama* behauptet, er habe auf seiner Reise von Aden nach Damâr, welche Straßse ich auch, obgleich in entgegengesetzter Richtung machte, mehr als 10,000 Affen und Meerkatzen gesehen. Wird man es nun nicht fast unglaublich finden, wenn ich versichere, in meiner kleinen Vaterstadt mehr Affen gesehen zu haben, als in dem ganzen Gebirge von Jemen? Und dies ist doch buchstäblich wahr; denn hier fand ich auch keinen einzigen, während dem ich doch in jener bisweilen einen zur Schau herumführen sah.

Das Gebiet des Stammes Hauâschib ist 3 Tagereisen breit und bergigt, aber fast ganz ohne Cultur. Ihre Zelte oder beweglichen Hütten bestehen aus Binsen. — Den 20. Jul. erreichten wir die Ebene und mit ihr das Gebiete des Sultans von Lahhak. Diese Ebene ist völlig der Ebene von Tehâme gleich, erstreckt sich von dem westlichen Tehama bey Mocha bis ostwärts von dem Gebiete von Aden, und hat gewöhnlich eine Breite von ein bis zwey Tagereisen,

Läh-

Lāhhak, eigentlich Lahhadsch, ist ein geringes offenes Städtchen, das größtentheils aus Rohrhütten besteht. Es ist auffallend, daß der Herr davon und von Aden Sultan betitelt wird, da doch der Regent von Jemen nur Imām heißt. Sogar die Scheche der Beduinenstämme heißen im südlichen Arabien Sultane.

Aden war nur noch eine Tagereise von hier entfernt, und wir sahen den ansehnlichen Berg, wovon es umgeben ist, deutlich von Lahhak. Wir eilten, um diese im höchsten Alterthume so blühende Stadt kennen zu lernen, und erreichten sie den 22. Jul. Aber wie sehr sahe ich mich in meiner Erwartung getäuscht! Auf dem ansehnlichen von öden nackten Bergen umgebenen Platz, worauf Aden ehemals stand, sieht man jetzt bloß zerstreute Gruppen von Rohrhütten und wenigen unansehnlichen Steinhäusern; und das Ganze gewährte mir einen Anblick von Verfall und Zerstörung, daß ich mich kaum erinnere, einen unansehnlichern Ort in Jemen gesehen zu haben. Der Hafen ist furchtbar, aber es lag nur ein Küstenschiff vom Indus am Ufer; das Meer war noch etliche Monate für Aden geschlossen, weil der Wind erst alsdann günstig wird.

Das Unangenehme meines Aufenthaltes in Aden wurde indessen durch die Entdeckung gemindert, daß der dortige Berg sichtlich sein Entstehen vulcanischen Eruptionen verdankte; nirgends sieht man regelmäßige Lager, alles ist Lava, und diese findet man von der dichtesten bis zur porösesten Art, wo sie sich der Leichtigkeit des Bimsteins nähert; auch Porzelane findet man. In dichter Lava fand ich bisweilen

weilen kopfgroße Löcher; in anderer poröser Lava trifft man Kalkspath- und Chalcedon-Kügelchen und Rinden. In Betreff dieser vulcanischen Producte hatte ich in der Folge das nämliche Glück, als ich vorhin von den Laven um Medine angab. Ich fand nämlich in einer Geschichte von Aden die Nachricht von einem dortigen vulcanischen Ausbruche auf der Berginsel, welche zur Seite des schönen Hafens liegt. Man kann hieraus sehen, wie nützlich die arabischen historischen Werke auch in physikalischer Hinsicht sind; denn auch Nachrichten von Erdbeben, Luft-Metcoren, Eclipsen, außerordentlichen Witterungen u. s. w. findet man darinn für die Nachwelt aufgehoben.

Ostwärts von dem Gebiete von Aden ist das Gebiet des Sultans von Föddel und Abian; eine starke Tagetelke von Aden am Meere, ist ihm zugehörig. Die Hadameter wählen nie die Landreise nach Aden, theils weil sie mehr kosten würde, als die Seefahrt, theils weil auf dem Wege zwey ihnen feindliche Stämme sind, wovon der eine der Stamm der Analek heist.

Es freute mich sehr, hier keine Schiffsgelegenheit für Mochà zu finden; denn nun wurde es mir leichter, Schach Hamse zu bewegen, den von Europäern nie besuchten Weg über die Küsten-Ebene nach Mochà zu wählen. Er entschloß sich jedoch nur mit großer Mühe dazu, weil uns die Herren dieses Landstrichs, die Beduinen Szobbäehh (in *Niebuhr* Beni Zubey genannt) als wilde Barbaren geschildert wurden, welche noch vor wenigen Wochen etliche Personen ermordet haben sollten. Ich gründete

gründete meine Sicherheit auf einen guten Führer, und da dieser hier nicht zu erhalten war: so verließen wir Aden und zogen nach dem Dorfe Bir Achmed, welches eine kleine Tagereise davon an der Westgränze dieses Gebiets liegt. Schech Hamse war in Aden mit einem Fieber befallen, und dies nahm hier so sehr zu, daß sein Leben nicht ohne Gefahr war. Glücklicherweise erholte er sich kurz vor der Abreise, und die Reise war so wohlthätig für ihn, daß er ganz geheilt in Mochà ankam. Wir hatten Kameel-Führer auf einem benachbarten Dorfe angenommen, sichere Leute, welche mit den Szobbeàhh bekannt waren. Den 7. Aug. traten wir unsere Reise von Bir Ahmed an und reiseten auch immer des Nachts. Am Abend des zweyten Tages kamen wir an einen Berg, welcher die Ebene quer durchschneidet und sich aus der Nähe des Meeres etliche Stunden lang nach dem Gebirge hinzieht, doch so, daß ein beträchtlicher Zwischenraum übrig bleibt. Dieser Berg heist Dschibbal Fórrid, und dürfte eins seyn mit dem, was europäische Karten das Vorgebirge des heil. Anton's nennen. Es wohnt dort ein berühmter Schech; ob auch dieser unter freyem Himmel oder unter Bäumen lebe, wie alle Szobbeàhh, oder in Zelten, Hütten oder Häusern habe ich nicht erfahren. Wir blieben in der Nähe des Berges, von welchem am folgenden Tage vier bewaffnete Beduinen kamen, welche Passagegeld einforderten.

Den 9. Aug. stießen wir auf einen bewaffneten Beduinenhaufen, zwanzig bis dreyßig Köpfe stark, welche zuerst feindliche Absichten zu haben schienen,

Mon. Corr. XXVIII. B. 1813.

Q

und

und man näherte ſich von beyden Seiten mit großer Vorſicht. Sie verboten unſern Leuten anfänglich weiter zu paſſiren; nachher verlangten ſie ſo viel Paſſagegeld, daß die Kameelführer wirklich umlenkten, um ihre Rückreiſe anzutreten; endlich kam man doch mit einander überein. Während der Unterhandlung hielten unſere Leute ihre Lunten-Flinten immer zum Schuſſe bereit.

Am folgenden Tage erblickten wir den anſehnlichen, aber iſolirten Berg von Bâb el Mandeb, welchen wir links liegen lieſen, indem wir vom indiſchen Ocean Abſchied nahmen und in nordweſtlicher Richtung nach dem Strande des arabiſchen Meerbuſens zogen, wo wir den 11. Aug. in dem elenden Fiſcherdörfchen Dubbâb anlangten, welches aus 8 ſehr kleinen Hütten beſteht, und dieſe waren dennoch die erſten menſchlichen Wohnungen, welche wir ſeit Bir Achmed geſehen hatten. Von Dubbâb zieht ſich eine Reihe von Fellenhügeln nach dem Gebirge von Jemen hin, wodurch indeſſen die Ebene wenig unterbrochen wird. Da die nächſten Hügel davon aus Blöcken von ſchwarzer ſehr poröſer Lava beſtanden, ſo vermuthe ich, daß auch die übrigen vulcaniſcher Natur ſeyen.

Mit dieſen Hügeln fängt das Gebiete des Imâm's von Jemen, und mit ihm die gerühmte Sicherheit wiederum an. Ueberzeugt, daß ſie fernerhin nicht mehr ihrer Waffen bedurften, ſchoſſen meine Leute ihre Flinten los, als wir dieſe Hügel paſſirten, — Am folgenden Tage erreichten wir das beträchtliche Hüttendorf Kaddâhba, welches mit einem anſehnlichen Gehölz von Dattelpalmen umgeben iſt, das ſich

sich eine Tagereise lang bis Mocha erstreckt und vieles dazu beyträgt, den Weg dahin angenehm zu machen. Es war am 13. Aug. als wir unsere Reise in Mocha beendigten.

So wie Szannà ohne Zweifel die schönste Landstadt in ganz Arabien ist, so dürfte dort Mochà die schönste Seestadt seyn. Die nahe Gegend umher ist wegen ihrer Dattel- und Dömpalmen ein Paradies im Vergleich mit der Oede, die um Dschidda herrscht, und Mocha hat auch bessere Häuser, als Dschidda. Zwar kenne ich Maskat und andere Häfen des südlichen Arabiens noch nicht; ich zweifle aber, daß sie sich mit den genannten beyden messen können. Mochà ist unter allen Städten, die ich in Arabien sah, am meisten befestiget, und aus dem Grunde fiel sie auch den Wuhabisten nicht in die Hände. Die Hitze war bey unserer Ankunft noch sehr groß, und man war den ganzen Tag in heftiger Transpiration; der häufig herabtröpfelnde Schweiß hinderte mich oft am Schreiben. Seit der letzten Hälfte des Septembers aber herrscht hier eine sehr angenehme Witterung, die noch ein paar Monate anhält. Täglich weht der südwestliche Monson oder Mäusim, welcher ungemein erfrischend ist.

Es hält sich hier ein englischer Resident, Herr Capitain *Rudland*, auf, ein sehr achtungswürdiger Mann, mit seiner sehr liebenswürdigen Gattin, einer Engländerin. In seinem Hause sind noch Mr. *Benzoni*, dessen ich vorhin erwähnte, und ein englischer Arzt, Hr. Dr. *Barthow*. Dies sind alle Europäer, die jetzt hier sind; denn ein vorgeblicher französischer Consul war kurz vor meiner Ankunft nach

Isle de France abgereifet, nachdem er hier beträchtliche Schulden hinterlassen. — Mein Reisegeld war bey meiner Ankunft in Mochà fast gänzlich beendet; Ew. . . können sich also meine Freude vorstellen, als ich von Hrn. Hadsch Abdallah Lukkàth in Dschidda die Nachricht erhielt, daß er mir durch Hrn. *Benzoni* etwa 12000 Piafter übersende, welchen bald der Ueberrest des Wechsels folgen werde. Ich habe bis jetzt von dieser Summe etwa 1000 Piafter genommen; da aber meine persönlichen Ausgaben sehr geringe sind, so habe ich erst ein paar hundert Piafter davon ausgegeben. Etwa anderthalb tausend Piafter werde ich zu meiner bevorstehenden Reise noch baar von ihm nehmen, und tausend Piafter in einer Anweisung nach Maskat. Dies sind im Ganzen viertelhalb tausend Piafter. Der Rest von den 12000 Piaftern, und der noch nicht von Dschidda angekommene Ueberrest des ganzen Wechsels bleibt in seinem und des Hrn. Residenten *Rudland* Händen. So viel zu Ihrer Nachricht.

Gewiss wünscht niemand sehnlicher, als ich, mich für diese aufs Neue erhaltene fürstliche Unterstützung dankbar zu bezeigen, und mich durch Fleiß und Ausdauern der hohen Gnade, womit mich Sr. Herzogl. Durchlaucht zu beehren geruhen, einigermaßen würdig zu machen. Ich hoffe, daß man einst meinen langen Aufenthalt in Kahira nicht für unnütz erklären werde, wenn nur die dort gemachte ansehnliche Sammlung das Glück hat, richtig bey Ihnen anzukommen, und ich schmeichle mir, daß auch meine bisherige Reise in Arabien nicht ganz ohne Werth befunden werden werde. Ew. . . er-
sten

sten Brief erhielt ich in Damask, und es war mein erstes und ernstlichstes Bestreben, die darin befindlichen Aufträge Ihrer Durchlaucht, welche Bezug auf den todten See hatten, während meines Aufenthaltes in Jerusalem aufs genaueste auszurichten, und wenn meine mit Gefahr verbundenen Bemühungen etwas dazu beygetragen haben sollten, dieses berühmte Gewässer mit seinen Umgebungen besser kennen zu lernen, als bis dahin: so wird das Publicum es einst blos und allein Sr. Herzogl. Durchlaucht zu verdanken haben. Dafs meine ausführliche Antwort auf diesen Brief nebst einer Karte vom todten See nicht bey Ihnen angekommen ist, thut mir sehr leid; ich sandte sie von Jerusalem ab. — Die Anträge des Herzogs, welche in Ihrem zweyten in Kahira erhaltenen Briefe befindlich waren, konnte ich nur gröfstentheils erfüllen; hoffentlich haben Sie die ausführliche Antwort, welche ich Ihnen von Kahira übersandte, seit lange erhalten.

Ew. . . äufserten in einem Briefe an Hrn. Agenten v. Hammer, dafs sie sich in meinem jetzigen Reiseplan nicht zu finden wüßten. Ihre Achtung ist mir von zu hohem Werth, als dafs eine solche Aeußerung mir gleichgültig seyn könnte, die bey mir einen Wankelmuth voraussetzt, dessen ich mich bisher nicht schuldig fühle. Wenn Sie die Gewogenheit haben wollten, meinen vor zehn Jahren geschriebenen und in der Monatl. Correspondenz gedruckten Reiseplan durchzublätern: so würden Sie finden, dafs Arabien geradezu auf der Route lag, die ich mir damals vorschrieb, und dafs dieses merkwürdige Land einen Haupttheil der Länder ausmachte,
die

die ich zu besuchen vorhatte. Bis jetzt weiß ich mir nicht vorzuwerfen, daß ich von meinem Plane abwich, als nur in so fern ich ihn erweiterte, wie ich statt der Seereise von Constantinopel nach Syrien die Landreise wählte. Von Arabien bleibt mir nun noch Hadramût, Omân und die Südküste von Aden bis zum persischen Meerbusen zu untersuchen übrig, und ich hoffe, innerhalb wenig Tagen die Reise dahin antreten zu können. Die mir vorgenommene Route ist folgende: Zuerst reise ich zum andernmal nach Szannâ, um dort noch etliche wichtige Manuscripte für die orientalische Sammlung zu kaufen. Von dort hoffe ich auch das berühmte Mareb in Deschod und den alten Damm zu besuchen, von wo ich alsdann nach Hadramût übergehen werde. Von dort reise ich nach einem Hafen der nächsten Küsten, berühre etliche östlichere Häfen, ziehe, wo möglich Nachrichten über die Sprache der Beduinen von Mahra ein, lande in Szûr oder Kalhât, um das Innere von Omân kennen zu lernen, und kehre alsdann von Maskât zu Schiffe hieher zurück.

Das Innere von Afrika aus eigner Ansicht kennen zu lernen, ist noch ein eben so lebhafter und feuriger Wunsch bey mir, als damals, wie ich den Plan schrieb, während dem meine Erfahrung um vieles gereift ist. Bleibe ich leben und gesund, so werde ich bald nach beendigter Reise in Arabien dem Ziele meiner langen Reise in Afrika mit der größten Erwartung entgegen eilen, wobey mir hoffentlich die Maske des Islams eben so nützliche Dienste leisten wird, als sie mir bisher in Arabien leistete. Ich schmeichle mir, daß die Abhandlungen über das innere

nere Afrika, welche ich Ihnen von Kahira übersandte, zum Beweise dienen werden, daß ich diesen Welttheil nicht vergaß, und daß mir die Aufhellung der Dunkelheit, die ungeachtet der dauernden Bemühungen der London'schen Societät noch immer über sein Inneres schwebt, beständig sehr am Herzen lag.

Ev. . . erhalten hierbey meine astronomischen Beobachtungen, welche ich an unterschiedlichen Orten von Arabien anzustellen Gelegenheit hatte. Falls der talentvolle Aly Bäk mir nicht zuvor gekommen ist, astronomische Beobachtungen in Mekka anzustellen: so dürften die meinigen die ersten seyn, welche dort je von einem Europäer gemacht wurden, und, wenn sie branchbar befunden werden sollten, so ahnen es meine neuen Glaubensverwandten gewiß nicht einmal, welchen wichtigen Dienst ich ihnen erzeugte, als ich dadurch die Lage von Mekka bestimmte, weil auf deren Richtigkeit die Richtigkeit des Kübla-Systems in der ganzen islamitischen Welt beruht. Auch die Observationen in einer so berühmten Stadt, als Aden, angestellt, dürften für Kenner nicht ohne Werth seyn, da, so viel ich weis, die Lage dieser Stadt noch nicht astronomisch bestimmt wurde.

In einem Briefe, von Dschidda im November vorigen Jahres abgesandt, hatte ich die Ehre, Ihnen etliche Nachrichten von Hadramût mitzutheilen. Erlauben Sie mir, daß ich zu diesen noch einige neuere Nachrichten hinzufüge.

Zwey hadramutische Kaufleute, welche mit mir von Dschidda nach Medine reiseten, erzählten mir von ihrem Vaterlande folgendes: Alle Städte von Hadramût

Hadramût liegen auf Berggipfeln, und unter ihnen im Thale findet man große Pflanzungen von Dattelpalmen nebst Saaten. Jede Stadt hat ihren Sultan oder Scheich und steht gewöhnlich mit ihrer Nachbarstadt in feindschaftlichen Verhältnissen, weswegen sie etwa hundert Soldaten zur Garnison unterhält. Stadtmauern sind nicht vorhanden, sondern an deren Statt Wartthürme. Flüsse hat Hadramût nicht, bloß Regenbäche. Man lebt sehr wohlfeil, weil wenig Geld bey uns ist. Unser Hausvieh besteht aus Kamelen, Eseln, Schaafen und Ziegen; Pferde sind nicht vorhanden. Nur die Küstengegenden sind wohnhaft, aber die innern Gebirgsgegenden noch nicht. Hadramûter findet man in allen Küstengegenden von Arabien und Egypten; auch in Indien gibt es viele hadramûtische Soldaten und Gewerbtreibende; aber die meisten kehren in ihre Heimath zurück, wenn sie sich etwas Geld erworben haben, und verheirathen sich daselbst; auswärts nehmen sie bloß Slavin nen zu Beyschläferinnen. Bir Barhût raucht immer. In Terim webt man eine Art reicher seidener Schahle mit Goldfäden, welche das Stück 50 — 60 Kaifertaler kosten und von vornehmen Arabern zum Hüftentuch statt der Beinkleider getragen werden. Diese Kaufleute salbten sich und ihre kleinen Negerclaven bisweilen mit Butter, welches im ganzen südlichen Arabien im Gebrauch ist. Sie versicherten mir noch, zwischen Hadramût und Medine sey ein Sandmeer, welches niemand passiren könne, indem alle gemachten Versuche unglücklich abgelaufen seyen. In Hadramût findet man keine Kalkbäume, bloß auf den Bergen von Jemen. — Der Baum Beschâm (nicht

(nicht Abu Schâm) soll auch in Jemen und Hadramût wachsen.

Ein anderer hadramutischer Kaufmann, den ich in Maauwieh an der Gränze zwischen Taäs und Lahhak kennen lernte, sagte mir: Alle Berge in meinem Vaterlande sind grün und dienen zu Weiden. Quellen sind nicht vorhanden; ihre Stellen vertreten Brunnen und Regenbäche. Man säet Durrah und Waizen und wir haben einen Ueberfluß an Datteln. Da jeder Ort seinen Regenten hat, so ist das Reisen durch unser Land für Fremde etwas beschwerlich, weil jeder Sultan nach seinem Kopf handelt. Soldaten gibt es sehr viele bey uns. Terim ist eine große Stadt. Ostwärts von Hadramût sind die Beduinestämme von Mahira, Nèhhem (?) u. s. w. Fast nie reiset jemand zu Lande nach Hadramût, weil die Beduinen nicht sicher genug sind, und weil man fast einen Monat Zeit dazu nöthig hätte. *) Von Aden bis Hadramût sind 10 Tage zu Lande. In Makalla sind 100 Banianen.

Von einem in Mekka ansässigen hadramutischen Gesetzkundigen erfuhr ich noch folgendes in Mochâ:

Hadramût liegt fünf Tagereisen von dem Hafen Mekalla, welche ein Schnell Kameelreiter in drey Tagen macht. Der Weg dahin ist gebirgigt, aber überall trifft man gutes Wasser. Der Hafen von Makalla ist besser als der von Schäbher, welcher nur eine halbe Tagereise davon entfernt ist. Jeder Hafen hat seinen besondern Sultan. Von Mochâ nach Makalla sind fünf Tagereisen zur See. Hadramût macht eigentlich nur ein weites Thal aus, das viele Nebenthäler hat,

*) Er meinte wahrscheinlich von Mochâ über Szannâ. S.

hat, drey Tagereisen lang und eine Tagereise breit, aber sehr angebaut und volkreich ist. Datteln sind in außerordentlicher Menge vorhanden. Quellen gibt es wenige, und diese dienen nur zur Gartenwässerung, während dem die Saathfelder bloß vom Regenwetter getränkt werden. Schibàm und Sejùn sind größer als Terim. Döän ist der Name eines Nebenthales in der höhern Gegend von Hadramût, nicht aber der Name einer Stadt; in demselben liegen mehrere Städte, als Raschid, Grein u. s. w. Nur ein einziger enger Felsenpaß führt in dasselbe, welcher sehr leicht zu vertheidigen ist, weswegen die Wuhabisten sich auch nicht hineinwagten, obgleich sie Terim, Schibàm, Sejûn, u. s. w. bereits erobert haben. Karavanen gibt es häufig bey uns, und es herrscht für Reisende die größtmöglichste Sicherheit, eine größere, als selbst in Jemen. Die Kameelführer, welche den Waaren-Transport zwischen Maskalla und Hadramût besorgen, sind alle Hadramüter, weswegen der Sultan von Makalla von ihnen abhängig ist und ihnen nicht zu nahe kommen darf; denn bleiben sie aus, so ist der Handel gestört und seine Einkünfte leiden. Indessen beobachtet er bey der Zolleinnahme die größte Billigkeit und Uneigennützigkeit, statt daß der Imàm von Jemen in Mochà, und der Scherif von Mekka in Dschidda sich oft große Erpressungen zu Schulden kommen lassen.

Unser Steinsalz erhalten wir von Marib und zwar durch Tausch. Es kommen ganze Kameelzüge damit beladen zu uns, und wir erhalten $10\frac{1}{2}$ Maafs Steinsalz für 1 Maafs Durra.

Die

Die Hadramuten sind alle Schaffälchen und außerst religiös, weswegen sie auch den Geistlichen viele Geschenke machen, wenn sie als gute Koranfänger bekannt sind. Und diese sind ehrlicher als in Mekka; denn haben sie Geld von jemanden erhalten: so lesen und beten sie auch fleißig für ihn, statt dals die Mekkaner das Geld nehmen und das Gebet vergessen.

Alles ist sehr wohlfeil bey uns. Ein Kaiserthaler thut 120 Bali; eine grössere Münze als Bali heisst Ukje.

Rindvieh, vorzüglich aber Schaafe und Ziegen gibt es in Menge bey uns. Das Wasser ist außerordentlich gut. Weintrauben sind wenig vorhanden und Granatäpfel gar nicht. Die meisten Städte sind ohne Mauern, weil diese der grossen Landesicherheit wegen unnütz seyn würden.

So viel von Hadramüt. Jetzt noch einige vermischte Nachrichten über unterschiedliche Länder, welche ich gelegentlich auf der Reise einzog.

In Medine versicherte man mir, dals jetzt alle Einwohner von Cheibar Neger seyen, aber Mahomedaner — In Medajin Szälehh oder Hadschar, sagte mir ein haleppinischer Tischler, in Medine sieht man viele solche Verzierungen an den Felsen, als die Franken in den Häusern machen. Er hatte in Halep viel in den Häusern der Europäer gearbeitet, und meinte wahrscheinlich Arabesken oder Schnitzwerk in Holz.

Medine ist 16 Tagereisen, und Mekka 20 bis 25 Tagereisen mit Dromedaren von Deräya, dem Sitz der Wuhabisten, entfernt; mit der Karavane aber
bleibt

bleibt man von Mekka dahin 30 Tage unterwegs. Der Weg von Medine dahin führt durch eine Wüste, an dem Wege von Mekka aber sollen mehrere Örter angetroffen werden. Die Pilger von Bagdad passiren den Dschibbal Schämer, worauf viele Ortschaften sind, wenn sie nach Medine reisen; Pilger von Basra aber nehmen ihren Weg über Deraja.

“In Gesellschaft von mehrern indischen Pilgern segelte ich von Súrrat nach Makalla, dem Hafen von Hadramút, sagte mir ein junger indischer Pilger von Neckló, weit jenseit Delhi. Makalla wurde damals gerade von den Wuhabisten belagert; aber es fehlte dennoch nicht an Lebensmitteln; Fische hatten wir im Ueberflufs. Von Makalla reisete ich zu Schiffe nach Mochâ und von dort zu Lande nach Mekka. Ich hatte das Unglück nebst meinen Landsleuten unterwegs von einem andern wuhabistischen Corps überfallen zu werden, obgleich wir ganz unschuldig, und diese Truppen wider Scherif Hammud von Abu Arisch bestimmt waren; mehrere von uns verloren das Leben, und ich alle meine wenigen Haabseligkeiten. Ganz nackt entrann ich der Gefahr. In den ersten paar Nächten fürchtete ich mich, und suchte verborgene Winkel hinter Gesträuch; allein ich bedachte bald, dafs eine solche Besorgniß ungegründet sey, wo nichts zu verlieren war; und nun legte ich mich überall an der Landstrasse zur Ruhe hin, wo es mir nur einfiel.*) —

Ich

*) Das schönste Lob der Armuth. S.

Ich hielt mich eine Zeit lang in Delhi auf. Diese große Stadt hat fast eine Tagereise im Durchmesser (?) und ist mit drey Mauern und noch einem Graben um die Festung versehen. Der Pallast des Moguls hat Leimwände, die aber fast so fest als eine Steinmauer sind. Sonst baut man die Häuser dort gewöhnlich von Backsteinen, indem in der unvergleichlich fruchtbaren Ebene von Delhi fast kein einziger Stein zu finden ist, so daß ein Stein zum Gewicht, oder zum Reiben des Getreides zu Mehl verhältnißmäßig theurer bezahlt wird. Die meisten Einwohner sind Mahomedaner; doch gibt es auch viele Banianen. Die dortige indische Sprache hat viele Aehnlichkeit mit der persischen, und es gibt außer den indischen viele persische Bücher, in welcher letztern Sprache auch die Erklärung des Koràn's geschrieben ist. — Seitdem diese Stadt in den Händen der Engländer ist, halten sich dort viele von dieser Nation auf. Man muß ihnen das Lob geben, daß sie Freunde der Gerechtigkeit sind; sie halten streng auf gutes Maas und Gewicht und bestrafen die Uebertreter aufs nachdrücklichste. In allen von Banianen beherrschten Ländern sind zahllose Diebe und Straßenträuber, welche die Landstraßen sehr unsicher machen; sobald aber die Engländer Herrn davon werden, so kann ein einzelner Mensch mit Gold in den Händen reisen. *) Einem jeden lassen sie seine Religion. Daß die Engländer zuerst das Land erobern konnten, rührte bloß von den Uneinigkeiten her, welche die regierenden Familien entzweyten, und sie sichern sich

*) Man muß Europäer seyn, um den Werth dieses unschminkten Lobes zu empfinden. S.

sich dessen Besitz durch eine Menge indischer Truppen, welche sie auf den Beinen halten. —

Dafs Weibspersonen nicht sicher für Anfälle der Affen sind, ist gewifs. In der Gegend von Neckló geht kein Weib allein ins Gehölz, aus Furcht, von ihnen genothzüchtigt zu werden, wovon ihr Blut so erhitzt wird, dafs sie davon sterben. Ich erinnere mich, von drey bis vier solchen Fällen gehört zu haben. —

”Die Witterung ist in Indien weit gemäßigter und gleichförmiger, als hier in Mekka, sagte mir ein Mekkaner, der Bombay und Madras besucht hatte. Die Engländer verdienen das gerechteste Lob für die Aufmerksamkeit, welche sie auf die öffentliche Sicherheit wenden, statt dafs es in den Besitzungen der Banianen von Dieben und Räubern wimmelt. Die Engländer verschönern die indischen Städte durch ansehnliche neue Gebäude. — Ich habe in Konstantinopel schöne Moscheen gesehen; ich kann ihnen aber versichern, dafs es in Indien noch schönere gibt.

”Indien ist gut, erzählte mir hier Seid Hössan, ein Gelehrter von Mekka, nirgends findet man einen solchen Reichthum als dort; selbst in Konstantinopel nicht, welches ich genau kenne. Indische Privatpersonen füllen grosse irdene Wassergefäße mit geschmolzenem Golde, und nach deren Zahl schätzt man ihren Reichthum. (!?) Aber die Tafel ist in Indien sehr schlecht; immer Reis, statt Butter mit Cocosöl bereitet. Wie ganz anders ist dies in Kon-

stan-

stantinopel, wo man sehr gut speiset, und wo überhaupt alles am besten ist.

"In Lahôr, sagte mir ein Pilger von dort, herrschen Banianen, aber es gibt keine feste Regierung; der Mächtige wird von einem Mächtignern verdrängt. Nichtsdestoweniger findet keine Unterdrückung der Unterthanen statt. Der Sultan von Kabûl hingegen läßt sich viele Avanien zu Schulden kommen, obgleich er ein Müslim ist, und aus diesem Grunde wandern aus seinen Staaten, zumal aus Kaschmîr, viele nach Lahôr und andern indischen Städten aus, wo sie die Bereitung der köstlichen Schahle fortsetzen. Kaschmîr ist mit ewigen Schneebergen umgeben; der klare Fluß dieses Landes gauckelt den Einwohnern von Kaschmîr so liebliche Blumen auf seinem Wasserpiegel vor, daß die Künstler darnach die schönen lebendigen Farben zu den Modellen ihrer Fabrikate wählen, *) In Kaschmîr bereitet man auch ein unverbrennliches Zeug, welches man im Feuer wäscht, wenn es schmutzig geworden. — Er setzte noch etwas Fabelhaftes hinzu. Indessen war sicher die Asbest-Leinwand gemeint, wovon ich nie gehört habe, daß man sie dort bereite. —

In der Gegend von Kabûl ist die Erde so reich an brennbarer Luft, daß man kein Holz zum Kochen nöthig hat; man macht nur ein kleines Loch in die Erde und setzt den Kochtopf darüber. **)

Der

*) Eine dichterische Idee; aber die wirklichen Worte des Erzählers. S.

**) Also ein zweytes Baku? S.

"Der Weg nach meiner Vaterstadt Bochara (so erzählte mir ein pilgernder üsbeckischer Tartar) ist zwar am kürzesten durch Persien; allein, wenn wenige arme Pilger diese Route einschlagen, so haben sie viel von schiitischen Persern zu leiden. Nur wenn sie zahlreich und bewaffnet sind, sind sie sicher, weil sie Furcht einflößen. Der zweyte längere Weg geht von Mekka oder Medine nach Kahira; dann zur See nach Konstantinopel, nach der Krimm und Astrachan, von welcher Stadt wir in einem Monat Bochara erreichen. Alle Üsbecken sind Sunniten, und so wie die Türken, Hannefiten.

"Bochara ist jetzt eine sehr blühende Stadt, grösser und volkreicher, als Kahira nach der französischen Occupation. Es ist die Residenzstadt unsers Sultans, der von keiner andern Macht abhängig ist. Der Handel ist groß. Es gibt dort viele sehr ansehnliche Medresse, die voller Studenten sind. Samarkand, die alte Residenz des berühmten Timur Lenk, hat zwar einen weit größern Umfang, als Bochara; man findet dort auch sehr große Medresse; aber alles ist im höchsten Verfall, und Samarkand hat jetzt nicht so viele Einwohner, als Bochara. Bochara hat einen Überflus an allem, und alles ist sehr wohlfeil. — Uhren sind bey uns ganz unbekannt. — Es gibt in Bochara auch Christen und Juden, welche sich auf eine ausgezeichnete Art tragen müssen, damit man sie schon von weitem von einem Mahomedaner unterscheiden könne. Jährlich gehen etliche jüdische Familien zum Islām über, wofür der Sultan sie beschenkt und pensionirt.

Ich

Ich bin von Argúbba, sagte mir ein pilgernder Gibberty in Mekka; mein Land ist dem König von Habbésch nicht unterworfen, vielmehr stehen wir mit Amhára und Tigry in beständiger Fehde. Mein Vaterland hat blos Mahomedaner zu Bewohnern, und es gibt bey uns viele gesetzwissenschaftliche Werke. Bárbara kenne ich nicht, wohl aber das Land Szomal, dessen mächtiger Sultan landeinwärts zu Hárrer wohnt, wo es einen Überfluß an Lebensmittel gibt. Der Sultan ist, so wie die meisten Szomaler, mohammedanischer Religion; doch gibt es dort auch Christen und Götzendiener. Argúbba steht eben nicht in sehr freundschaftlichen Verhältnissen mit Szomal. — Dieser Gibberty war, wie gewöhnlich, ziemlich schwarz, hatte aber sonst gute Gesichtszüge.

Ein Gelehrter meines Vaterlandes, (so erzählte mir ein Pilger von Fesán, dem bekannten afrikanischen Lande südwärts von Tripoli) durchwanderte die Negerländer 18 Jahre lang. Er sahe dort unter andern eine ganz nackte Nation, die aber am ganzen Körper behaart war; eine andere Nation mit Hundsköpfen u. s. w. Da seine Hautfarbe weißlicht war, so sagten die Neger zu ihm: 'deine Haut ist ja noch unreif; oder besteht sie etwa aus Salz, dessen Farbe sie hat? Und nun leckten sie daran, um sich vom Gegentheil zu überzeugen. Das Salz ist sehr selten bey ihnen. *)

Wäh-

*) Schade! daß dieser fessanische Gelehrte wohl weiter nichts war, als ein unwillender Aufschneider. S.

Während meines Aufenthaltes in Mekka trug ich nach Beendigung der Hadsch, einem Bekannten auf, mir jemand von Szomal, Dankal, Dähblak, Mallána u. f. f. aufzutreiben, um mir von den Sprachen dieser Länder Proben zu verschaffen; allein, seine Bemühung war umsonst. Zur Zeit der Hasch waren Pilger aus allen genannten Gegenden hier; aber das würde ja ein unverzeihliches Verbrechen seyn, zu einer so heiligen Zeit an solche weltlichen Dinge, als Sprachen u. f. w. sind, zu denken und davon zu sprechen! Ein Mekkaner, der drey Jahre lang in Szomal, Sennâr u. f. w. war, war damals vor kurzem zurückgekommen; allein er wußte von der Sprache von Szomal nichts. Er erhielt viele Geschenke in diesen Ländern, und unter andern vier Slavinnen von dem Sultan von Sennâr. Aber alle sein Geld und sein Gepäck wurden ihm nebst den Slavinnen auf dem Wege von Sennâr nach Sanâken von den Beduinen geraubt, und er kam etwas weniger reich zurück, als er dahin abgereiset war.

Nachträge zu meiner Abhandlung über Ophir.

Da ich keine Copie davon zurück behalten habe, so weiß ich nicht gewiß, ob folgende Bemerkungen darinn vorkommen oder nicht? Ist ersteres, so bitte ich um Verzeihung, eine Sache zweymal gesagt zu haben.

In der Geographie des Scherif Edris finde ich, daß Höms nur eine Tagereise von El-Haffa oder El-Ahhfa, zwey Tagereisen aber von El Kothhêf entfernt

fernt sey, und am Strande des persischen Meerbusens liege, Höms lag also den Inseln Bahhrèn so ziemlich gerade gegen über. Höms war sehr wahrscheinlich eine phöniciſche Colonial-Stadt, welche ihren Namen von der im Alterthume durch ihren Handel sehr blühenden Stadt Höms (Emeſſa) in Syrien erhielt. Von den Inseln Bahhrèn erhielt die grössere den Namen Tyrus oder Szûr (denn Tylos könnte doch wohl ein Schreibfehler seyn), die kleinere Aradus, nach der gleichnamigen mit Tyrus sehr genau verbundenen Insel in der Nähe von Tripoly. Diesen Inseln gegen über wohnten in der Folge die Gerrhäer, ein durch Handel eben so reiches und blühendes Volk, als die Sabäer; man kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussetzen, daß hier schon zu den Zeiten der Tyrer ein Centralpunct des Handels war, wovon entweder sie die Seele waren, oder woran sie wenigstens den grössten Antheil nahmen. Und es ist merkwürdig, daß Scherif Edris gerade hier eines Ophîr erwähnt, welches er bey der Aufzählung der Örter von der Provinz Bahhrèn gleich nach El Ahhfa folgen läßt, was also nur wenig davon entfernt seyn kann. Schade! daß dieser treffliche Geograph nichts weiter als den Namen davon anführt; indessen bin ich gewiß, daß man bey ausführlicheren geographischen Werken, z. B. in Abulfeda, oder Yakût u. s. w. Nachrichten davon finden werde. Unmittelbar auf El-Ophîr läßt Edris einen Ort, El-Hárrahh, folgen; auch davon findet man nur den Namen; fast sollte ich vermuthen, daß dies der Stammort der Garrhäer sey; denn es ist bekannt genug, wie fehlerhaft dieses Werk in Rom gedruckt

wurde, und hier dürfte nur ein ganz kleiner Fehler statt finden, nämlich ein fehlender Punct unter dem ersten ζ . Mit diesem Punct würde man Dscherrehh oder nach ägyptischen Dialect Gérrehh haben, wovon sich mit der griechischen und römischen Endigung ganz natürlich die Garrhäer herleiten ließen. Es fehlt mir hier an Hülfsmitteln, um dies aufs Reine bringen zu können.

Wahrscheinlich gab es noch mehrere phönicische Factoreyen am persischen Meerbusen; denn nach *Nearch's* Nachrichten fand man ein Sidodona und ein Vorgebirge Tarfia auf der Ostküste dieses Golfs, und diese beyden Namen erinnern unwillkührlich an Sidon und Tarsus (letzteres in Karamanien, nordwärts von Antiochien). Tarfia soll nach dem verdienstvollen und gelehrten Dr. *Vincent Cap Dsjerd*, und Sidodona etwas südwärts davon Ràs el Heti seyn, welche beyde der Insel Bolior oder Belior gegen über liegen. Sehr wahrscheinlich war hier ein sehr wichtiger Perlenfang; denn noch jetzt werden bey Carrak oder Niebuhr's Tsjaräk, welches etwas nördlicher liegt, häufig Perlen gefischt, und zwar sehr große, die aber gewöhnlich an der Schaafe festsitzen, wodurch sie vieles von ihrem Werth verlieren.

Das zweyte Ophir war in Omàn vorhanden. Dieses Städtchen kann nicht weit von den Bergwerken in Omàn entfernt seyn, welche reich an Bley und Kupfer seyn sollen. Will mir das Glück wohl, so werde ich diese besuchen.

Eine noch jetzt vorhandene Seestadt Szûr mußte wahrscheinlich für die Provinz Omàn, eine der Haupt-

Hauptniederlassungen und Colonialstädte der Phönicier seyn, weil sie den Namen von dem damals so allmächtigen Tyrus erhielt. Auch hier findet man in der Nähe wichtige Perlenbänke, und für den indischen Handel lag diese Stadt ungemein bequem.

Vorausgesetzt, daß die phönicische Handelsflotte im arabischen Meerbusen mit mehrern Küstenstädten handelte, und auf der Südküste von Arabien und im persischen Meerbusen von Factorey zur Factorey fuhr: so kann es gar nicht mehr auffallen, daß sie drey Jahre zu ihrer Hin- und Rückreise nöthig hatte. Denn wenn sich diese zahlreichen Schiffe vielleicht ihrer Sicherheit wegen immer zusammen hielten: so mußte dadurch ihre Ein- und Ausladung sehr verzögert werden.

Es gibt noch einen Grund, worauf man bauen kann, um Ophir nach dem südlichen Arabien zu verlegen. Denn in der Genealogie der arabischen Städte (man verzeihe mir diesen Ausdruck) wird Ophir mit Hadramût, Szanna (Ufal) und Saba (Mareb?), als Söhnen Jocktan's, genannt; und diese Orte sind bekanntlich im südl. Arabien. *)

*) Genes. 10; 26 — 30.

XXVIII.

Supplément au second livre du *Traité de Topographie*, contenant la *Theorie des Projections des Cartes*; par *L. Puissant*, Chef de Bataillon au corps impérial des *Ingénieurs Géographes*. Paris 1810.

Die beyden Werke desselben Verfassers, *Traité de Geodesie*, und *Traité de Topographie*, an die sich die vorliegende Schrift als Supplement anschliesst, wurden schon früher in dieser Zeitschrift (Bd. XVI p. 443 Bd. XXI p. 523) angezeigt. Bey dem verdienten Lobe, was wir jenen Ausarbeitungen aus voller Ueberzeugung gaben, konnten wir doch eine Rüge, hinsichtlich der Unvollständigkeit des darinnen über Karten-Projectionen beygebrachten, um so weniger unterdrücken, da ausserdem jene beyden Bände, das ganze Gebiet der höhern Geodesie befriedigend umfassen: sehr erwünscht war es uns daher durch die gegenwärtige Abhandlung, jene Lücke vollkommen ausgefüllt zu sehen, und wir halten uns für verbunden, auch noch von dieser unsern Lesern, eine kurze Ueberlicht mittheilen zu müssen. Zufälligkeiten haben die Anzeige dieser Schrift, die gleichzeitig mit dem vom Obersten *Henry* herausgegebenen *Mémoire sur la projection des cartes géographiques* erschien, verspätet. Da der Gegenstand beyder Arbeiten ganz derselbe ist, so kann natürlich Zusammentreffen der
Resul-

Resultate datinnen nicht fehlen, allein allemal bleibt es interessant, die Verschiedenheit der Verfahrens-Arten kennen zu lernen, mittelst deren zwey Männer, die mit der Theorie und Praxis des Gegenstandes gleich vorzüglich vertraut sind, zu denselben Bestimmungen gelangten. Beyder Abhandlungen sind der Darstellung der modificirten *Flamseeed'schen* oder *Bonne'schen* Projection gewidmet, indem nach dieser, vermäge des Beschlusses einer im Jahre 1803 deshalb niedergesetzten Commission, alle im *Depôt général de la guerre* zu Paris herauskommende Karten bearbeitet werden. Wünschenswerth wäre es, daß diese mehrere sehr wesentliche Vorzüge in sich vereinigende Projection, so wie der dort gewählte Maßstab von $\frac{1}{500000}$, und die im *Memorial topographique et militaire* vorgeschlagenen sehr zweckmäßigen Bezeichnungsarten in allen topographischen Karten eingeführt werden möchten, um dadurch in allen speciellern Länder-Darstellungen, eine gewisse Einheit der Ansicht und Haltung zu erhalten, die eben so vortheilhaft für den militairisch-statistischen, als den wissenschaftlich geographischen Zweck seyn würde.

Der Titel der Schrift, die uns jetzt beschäftigt, entspricht dem Inhalt nicht ganz, indem er theils zu viel, theils zu wenig besagt; die Angabe "*Contenant la Théorie des projections des cartes*," ist zu generell, da blos von der modificirten *Flamseeed'schen*, und dann von der *Mercator'schen* Projection die Rede ist, dagegen kommen außerdem noch manche interessante Untersuchungen über Theorie des Sphä-

Sphäroids vor, die dem Titel nach nicht erwartet werden.

Folgende fünf Capitel machen den Inhalt dieses Supplements aus :

Chap. I. *Tracé de la projection modifiée de Flam-
sied.*

Chap. II. *Théorie analytique de la projection pré-
cedente.*

Chap. III. *Solutions numériques de divers pro-
blèmes relatifs à la projection précédente.*

Chap. IV. *Formules pour déterminer les positions
géographiques des sommets des triangles du
premier ordre.*

Chap. V *Construction des cartes réduites, en
ayant égard à l'aplatissement de la terre.*

Der Verfasser schickt im ersten Capitel eine all-
gemeine Ueberlicht der Projection's-Methode, von der
hier ausschliessend die Rede ist, und der mechan-
ischen Hülfsmittel zu deren Construction voraus. Da
die Parallelbögen in dieler Projection meistens
sehr grosse über die Karte hinaus reichende Radien
haben, die Meridiane aber transcendente Linien sind,
so ist die Construction durch Punkte mittelst berech-
neter Coordinaten, allen andern mechanischen Hülf-
smitteln bey weitem vorzuziehen.

Vor Uebergang auf den eigentlichen Gegenstand
der Abhandlung, beschäftigt sich der Verf. mit der
analytischen Entwicklung einiger Functionen, die
bey den nachherigen Untersuchungen häufig ge-
braucht werden. Es werden hier die Grössen

$\frac{1}{1+n \cos z}$, $\frac{1}{(1+n \cos z)^2}$, und $U^\mu = \frac{e^\mu}{1+\sqrt{(1-e^2)}^\mu}$ in Reihen entwickelt, die resp. nach den Vielfachen der Cos. z und nach den Potenzen von e fortschreiten. Die Reihen für die beyden erstern Functionen sind nicht neu; allein wir erinnern uns nicht, den Werth von U^μ schon auf die hier befindliche Art, irgend sonstwo dargestellt gefunden zu haben.

Durch Einführung einer Hülf - Gröfse $n = \frac{e^2}{2 - e^2}$ (e . Excentricität) werden für die gewöhnlich im Erdsphäroid betrachteten Linien, Tangente, Normale, Radius des Parallels, Krümmungshalbmesser etc. sehr geschmeidige endliche Ausdrücke erhalten. Da diese meistens aus zwey Factoren, von denen der eine $\left(\frac{1+n}{1+n \cos 2\lambda} \right)^m$ für alle derselbe ist, bestehen, so möchten wir fast glauben, daß die Rechnung nach diesen endlichen Ausdrücken bequemer, als nach den dann dafür entwickelten Reihen ist. Der Verf. hat übrigens nur einige dieser Entwicklungen wirklich beygebracht, da die von Henry S. 39 seines Memoire dafür gegebenen allgemeinen Formeln nichts zu wünschen übrig lassen.

In den früher erschienenen *Traité Géodésie* war die Abplattung aus den durch die Gradmessung gegebenen, mittlern Werthen der Breitengrade hergeleitet worden; da dies Verfahren minder streng ist, so gibt der Verf. hier eine andere Methode, wo die ganzen gemessenen Bögen zum Grund gelegt werden, und wo aus einer quadratischen Gleichung der Werth

Werth der Excentricität folgt. Schon früher haben *Legendre*, *Delambre* und *Svanberg* ähnliche Methoden zu dieſem Behuf gegeben. Aus der Vergleichung der Aequatorial und neuen franzöſiſchen Gradmeſſung, findet *Puiſſant* die Abplattung $= \frac{1}{334}$, etwas kleiner als ſolche mit den berichtigten Werthen der peruanischen Gradmeſſung folgt.

Nach dieſen vorläufigen Beſtimmungen geht der Verf. auf die eigentliche Theorie der modificirten *Flamſteed'schen* Projection über, die vollſtändig in der Auflöſung folgender Aufgaben enthalten iſt:

1. *Etant données la latitude et la longitude d'un point du ſphéroïde terreſtre ſuppoſé de révolution, trouver ſur la carte les coordonnées rectangles de ce point.*)*

Dieſe Beſtimmung iſt der weſentliche Theil der Projection, da darauf die Conſtruction der Karte beruht. So geſchmeidig die von dem Verf. für die Berechnung dieſer Coordinaten gegebenen Ausdrücke ſind, ſo würde doch das Verfahren nicht wenig mühsam ſeyn, wenn für viele Punkte dieſe Rechnung geführt werden müßte. Seit zwey Jahren iſt daher der Ingenieur-Capitain *Pleſſis* damit beſchäftigt, Tafeln zu entwerfen, die für 80000 Punkte die Coordinaten dieſer Projection enthalten werden, mit deren Beyhülfe die Zeichnung der Netze ſolcher Karten, ganz leicht und ohne alle Rechnung geſchehen kann. Freylich wird ſich der Gebrauch dieſer Tafeln hauptſächlich nur auf Frankreich und auf ſolche Länder beſchränken, wo die dabey zum Grunde liegende Vor-

aus-

*) Bey der hierzu gehörigen Fig. 4 fehlt der Buchſtabe K.

aussetzung, daß der mittlere Parallel, der des 45ten Breitengrades ist, statt finden kann.

Für die Auflösung des umgekehrten Problems, aus den gegebenen Coordinaten die Breite des Punctes zu finden, werden hier ebenfalls die nöthigen Formeln beygebracht, dabey jedoch bemerkt, daß ein graphisches Verfahren meistens zu dieser Bestimmung hinlänglich sey.

2. *Détermination des angles des quadrilatères formés, sur la carte, par les méridiens et les parallèles, et recherche du rayon de courbure d'un méridien quelconque. *)*
3. *Méthodes pour déterminer les points d'intersection des méridiens et des parallèles avec les lignes du cadre.*

Wir halten uns bey diesen Aufgaben hier nicht auf, da wir deren schon bey Anzeige des *Memoire* von Henry umständlicher erwähnt haben.

4. *Méthodes pour projeter sur la carte un triangle dont la projection de la base est connu.*

In Henry's *Memoire* kommt diese Aufgabe nicht vor, und wir sehen solche als einen interessanten Zusatz an, da dadurch die Berechnung der Längen und Breiten erspart, und die durch ein Dreyeck gegebenen Puncte unmittelbar auf die Karte projectirt werden können.

Bey Aufzählung der Eigenschaften dieser Projection, bringt der Verfasser auch den Beweis des Satzes bey, daß die hier durch Meridiane und Parallel-

*) Bey der hierzu gehörigen Fig. 6 fehlt der Buchstabe B,

rallenen gebildeten Vierecke, in demselben Verhältniss wie die auf dem Erd Sphäroid stehen; bekanntlich haben schon früher, *Albers* und *Mollweide* diesen Beweis gegeben, der aber hier auf eine eigenthümliche Art durchgeführt ist.

Die merkwürdige von *Henry* aufgefundenen Eigenschaft der Ellipse, vermöge deren an dem Punkte, wo die bis an die beyden verlängerten Axen reichende Tangente, deren halbe Summe beträgt, die Differenz der beyden Bogen des elliptischen Quadranten der Differenz der Halb-Axen gleich ist, wird am Schlusse der theoretischen Entwicklungen, von dem Verfasser auf eine sehr elegante Art, aus einem allgemeinen Theorem von *Euler* abgeleitet.

Das dritte Capitel beschäftigt sich mit Anwendung und numerischer Entwicklung der vorher gegebenen analytischen Ausdrücke; die Anweisung ist so klar und deutlich, daß auch minder geübte dadurch in Stand gesetzt werden, Karten nach dieser Projection zu entwerfen.

Im IV. Capitel kommt der Verf. auf die schon früher abgehandelte Herleitung geographischer Ortsbestimmungen aus den gegebenen Seiten und Winkeln eines Dreyeck-Netzes zurück, und entwickelt hier hauptsächlich die Beweise zu mehreren von *Legendre* in seiner Abhandlung über sphäroidische Dreyecke (*Mémoires de l'institut pour 1809*) gegebenen Formeln. Wir unterlassen es jetzt in ein näheres Detail über diesen Gegenstand einzugehen, da uns die Anzeige eines vortrefflichen Werks von *Oriani*, "*Elementi di Trigonometria sferoidica*," wo alle diese Gegenstände erschöpfender, als irgendwo, abge-

abgehandelt sind; noch ein anderesmal darauf zurückführen wird. Die am Schlufs dieses Capitels gegebene "*Explication d'un Tableau synoptique, dressé conformément aux formules que M. Delambre a données pour déterminer les coordonnées géographiques des sommets des triangles du premier ordre,*" enthält eine gute Übersicht, wie alle hierher gehörige Rechnungen zu führen sind. Zum Behuf der Ordnung und einer bessern Übersicht, scheint uns dieses, so wie überhaupt, die für die ganze Geodésie im *Depôt général de la guerre* eingeführten Tableaus, vortreflich zu seyn; allein ob solche zur Bequemlichkeit des Rechners beytragen, möchten wir wohl bezweifeln, da man hier öfters genöthigt ist, eine Rechnung auf einem Folio-Blatte einzutragen, die sich leichter auf einem halben Octavblatte machen läßt.

Das fünfte und letzte Capiel dieses Abschnittes ist der Theorie der *Mercatorschen* Projection gewidmet. Der Verf. nimmt bey diesen Entwicklungen auf die abgeplattete Gestalt der Erde Rücksicht, gibt die Formel für wachsende Breite, und dann auch die Gleichung für die hier vorkommende loxodromische Linie, von der eine merkwürdige Eigenthümlichkeit erwiesen wird.

Man sieht aus der kurzen Übersicht, die wir von der vorliegenden Schrift gegeben haben, daß dadurch einige in den beyden frühern hierher gehörigen Handbüchern desselben Verf. minder ausführlich abgehandelte Theorien, sehr befriedigend vervollständigt wer-

werden, so daß durch die Vereinigung aller drey ein Lehrbuch der höhern Geodesie gebildet wird, wie es noch nicht vorhanden war, und was nur wenig zu wünschen übrig läßt.

Da uns trotz der in ihrer Art vortrefflichen practischen Geometrie des Herrn Prof. Mayer, doch ein solches Buch wie der Complexus der Abhandlungen von *Puissant* ausmacht, noch fehlte, so freuen wir uns, daß diese Lücke in unserer deutschen mathematischen Litteratur, durch die von Herrn Professor *Schumacher* übernommene Übersetzung und Vereinigung jener Werke in ein Ganzes, bald ausgeführt werden wird.

XXIX.

Georgii Wahlenberg, Med. Doct. de vegetatione et climate in Helvetia septentrionali inter flumina Rhenum et Arolam observatis, et cum summi septentrionis comparatis tentamen. Cum tabula altitudinem montium terminosque vegetationis monstrante, et tabula temperaturae, nec non tabula botanica. Turici Helvetorum impensis Orell, Fuessli et Soc. 1813,

Der Verfasser des vorliegenden Werks, durch seine frühern Untersuchungen und Reisen im höchsten europäischen Norden, der botanisch-geographischen Welt schon rühmlichst bekannt, liefert hier eine Vergleichung seines Vaterlandes in Hinsicht von Vegetation und Clima mit dem nördlichen Theile der Schweiz. Viermal hatte *Wahlenberg* in den Jahren 1800, 1802, 1807 und 1810 ganz Lappland nach allen Richtungen durchreist und die Resultate seiner Beobachtungen in der Schrift "*G. Wahlenberg Flora Laponica etc. etc. Berolini 1812*" dargelegt, die wir damals als hauptsächlich botanischen Inhalts unbeachtet liessen. Zwar ist dies auch mit vorliegendem Werke hauptsächlich der Fall, allein neben den botanischen Untersuchungen enthalten beyde Schriften so manche interessante neue Bemerkungen über relative Vegetation, Clima, Beschaffenheit der Luft
u. s. f.

u. f. f. daß dadurch ein sehr schätzbarer Beytrag zur physisch mathematischen Geographie unseres Welttheils geliefert wird, dessen in dieser Zeitschrift nicht unerwähnt bleiben darf. Wir sehen es als einen großen Gewinn für die Wissenschaften und namentlich für die bessere Erdkunde an, wenn Männer von vielseitiger Bildung, Länder unter verschiedenen Himmelsstrichen selbst bereisen, und so die Data zu deren Vergleichung, zu Heraushebung ihrer gegenseitigen Eigenthümlichkeiten nicht aus anderer Erzählungen, sondern aus eigener Ansicht und Untersuchung schöpfen. Eben dadurch ist es, daß die Darstellungen zwey berühmter deutscher Reisenden, *Humboldt's* und *Buch's*, einen eben so eigenthümlichen Werth als Reitz erhalten, da diese Männer mit einer seltenen Vielseitigkeit der Bildung, eine Mannichfaltigkeit von Erfahrungen und Ansichten verbinden, die ihnen überall ein verwandtes Bild und die passendste Vergleichung leicht auffallen läßt. Freylich gehört zu vergleichenden Darstellungen dieser Art, eine ganz unbewölkte Freyheit in Ansicht und Urtheil, so wie Entfernung von Partheylichkeit für irgend ein Land, indem offenbar das kleinste Vorurtheil in dieser Hinsicht, sehr trübe und verschobene Bilder zur Folge haben müßte. Wenn wir *Wahlenberg* Glück wünschen, durch seine ausgedehnten Reisen in Europa, und durch seine vielfachen physisch-botanisch-geographischen Kenntnisse, auf eine Stelle unter jenen wissenschaftlichen Reisenden, nicht mit Unrecht Anspruch machen zu können, so mögen wir es doch auch nicht verschweigen, daß in Hinsicht des zuletzt beygebrachten Er-

forder-

fordernissen, vielleicht noch ein Wunsch übrig bleiben könnte. Wir werden auf diesen Punct weiterhin noch einmal zurückkommen, da es uns scheint, daß dadurch einige Angaben veranlaßt worden sind, denen wir unbedingt gerade nicht beystimmen möchten.

Der hauptsächlichste Zweck, den der Verfasser bey der Reise nach der Schweiz vor Augen hatte, war die Vergleichung der Vegetations-Fähigkeit der Polar-Länder mit *höher* gelegenen Gegenden einer mildern europäischen Zone, wozu ihm der nördliche Theil der Schweiz ganz vorzüglich geeignet schien, da sich hier ein sehr hohes Land mit Bergen von jeder Höhe darbot. Um hier so viel als möglich alle anomalische Erscheinungen auszuschließen, wählte der Verf. zu seinen Untersuchungen den zwischen dem Vorder-Rhein und der Aar befindlichen Theil der Schweiz ($46^{\circ} 40' - 47^{\circ} 40'$ nördl. Br. und $5 - 7^{\circ}$ östl. Länge von Paris) indem er auf diese Art, sowohl den Einfluß des wärmern italienischen als südfranzösischen Clima's zu vermeiden hoffte, *ut sic*, heißt es hier ferner (p. VI in der Einleitung) *"vegetatio existeret non multum calidior vegetatione totius Sueciae, quo nimirum vegetatio altera cum altera aptius comparare posset."* Zu wiederholtenmalen bereiste *Wahlenberg* die Alpen von Toggenburg, Appenzell, Einsiedel, Sentis, Unterwald, Entlibuch, Engelberg, Glarus und dem Urserenthale, um deren Vegetation und Clima zu allen Jahreszeiten kennen zu lernen. Da es hier auf Kenntniß der Höhe über die Meeresfläche hauptsächlich ankam, so liefs es sich der Verfasser angelegen seyn,

von allen etwas ausgezeichneten Punkten eigene barometrische Höhenbestimmungen zu machen, und wir erhalten hier außer mehreren zum Nivellement des Rheins und der Aar dienlicher Angaben, noch eine Menge andere Bestimmungen von Bergen, deren Höhen zeither gar nicht oder doch nur minder zuverlässig bekannt waren. Die correspondirenden Beobachtungen für diese Messungen wurden größtentheils von dem Herrn Hofrath *Horner* in Zürich gemacht, wobey die Höhe des Zürcher Sees über der Meeresfläche zu 1252 Par. Fuß angenommen wurde. Die Resultate dieser Messungen, so wie sie *Wahlenbergs* Rechnungen geben, sind folgende:

Namen der Orte			Höhe üb. d. Meeresfläche Par. Fuß.
Höhe des Rheins bey	Tawetsch	4375
- - -	Diffentis	3557
- - -	Surrein	2774
- - -	Trons	2654
- - -	Reichenau	1850
- - -	Ragatz	1545
- - -	Gambs	1413
- - -	Schafhaufen	1208
Höhe der Aar bey	Meyringen	1852
- - -	im Grund	2081
- - -	Guttannem	3253
- - -	Handekk	4421
- - -	Stockboden	5186
- - -	Grimfel Hospitz	5778
	Utlberg	2673
	Segerberg	2603
	Vier		

XXIX. *Wahlenberg de Vegetatione et Climat. etc.* 267

Namen der Orte	Höhe üb. d. Meeresfläche Parif. Fufs.
Vier waldstädter See	1320
Katzenfee	1340
	Wildbaus 3360
	Tiken 2290
	St. Johann 2253
	Lichtenstegy 1979
Toggenburger Alpen	Schnabelhorn 3413
	Großwald 3554
	Hörnli 3496
	Hulstegy 3252
	Speer 5915
die Sitter bey Appenzell	2135
- - Weifsbad	2542
- - Urnäfen	2553
	Vöglifegg 2963
	Gais 2938
	Gäbris 3884
	Stadt St. Gallen 2086
	Kroneberg 5190
	Hochalp 4784
	Hochfentis 7671
Appenzeller Alpen	Hoch Mefsmer 6680
	Schäfler 5926
	Ebenalp 5094
	Wild Kerchlein 4615
	Hohe Kasten 5540
	Kamnor 5437
	Fähnern 4676
	Semtike See 3790
	Bötzler 5481

S 2

Ein-

Namen der Orte

Höhe üb. d. Meeresfläche
Parif. Fufs

Sentiſer Alpen

Einfiedel	2774
die Sil bey Hummelberg	2735
Alpthal	3055
Hohe-Ezel	3402
Hohe-Rohne	3808
Hakenweg	4135
Sattelalp	4227
Groß-Aubrig	5239
Rofsberg (Wildspitze) .	4870
- Knieperspitze .	4825
Rigikulm	5190
Rigi { Dofsen	5141
Rigifirft	5103
Schneecalp	4035
Maria zum Schnee . .	4404
Schwefterborn	1569
Giswyl	1569
Lungefer See	2108
Ezel	6554
Pilatus { Ringfluhe (Oberh.)	6570
Tomlishorn . .	6450

Unterwald

Tomlis-Alp	5185
Pilatus-See	5625
Birchboden	5068
Schien Alp	4131
Burgenberg	3492
Feuerſtein	5999
Sewerſee	5241
Schwarzberg	5502
Tannhorn	6532

Entlibuch

Soren-

XXIX. *Wahlenberg de Vegetatione et Climate etc.* 269

Namen der Orte	Höhe üb. d. Meeresfläche Parif. Fufs
Entlibuch	{ Sorenberg 3513
	{ Flühli 2699
	{ Entlibuch 2256
	{ Grafenort 1758
	{ Engelberg 3085
	{ Herrenrute 3614
	{ Auf dem Laub 4099
	{ Jochli 6735
	{ Laubergratspitze 7668
	{ Blanke-Alp (Oberstaffel) 5673
Engelberg	{ Ruckhübel 7039
	{ Rotheftock { nörd. Sattel 8080
	{ { füdl. Sattel 8248
	{ Min - Alp 6588
	{ die Linth bey Schwanden 1623
	- - Lintthal . 1998
	- - Riedwald . 2434
	{ Pantenbrück 3012
	{ Unterfand - Alp 4002
	{ Oberblegi-See 4420
Glarus	{ Leugelftock 5314
	{ Krauchkamm 6704
	{ Weißstannen 3078
	{ Pfeffersbad 2110
	{ Mond - Berg 7396
	{ Amftaeg 1579
	{ Im Weiler 2322
	{ Wafen 2847
	{ Gefchinen 3396
	{ Urferen an der Matt . . 4435
	Realp

Namen der Orte	Höhe üb. d. Meeresfläche
	Parif. Eufs
Realp	4733
Hospital	4542
Zumdorf	4627
Rofsboden (Badur)	6770
Rofsbodengrat	7583
Rofsbodenſtock	8735
Iſenſtock	8185
Gallenſtock	8271
Sidlinen Alp	6384
Oberalp - Sec	6224

Die Berechnung dieſer Höhen wurde von dem Verfaſſer nach Tafeln gemacht, die ihm Hofr. *Horn* zu dieſem Endzweck mitgetheilt hatte. Früher hatte er ſich hierzu der in der *Monatl. Corr.* (Bd. XI S. 527) befindlichen bedient, die ihm aber alle Höhen etwas zu groß zu geben ſchienen. Da die *Hornſche* Formel hier nicht gegeben iſt, ſo können wir über deren Begründung und Vorzüglichkeit nicht urtheilen; allein da *Wahlenberg* ſeine ſämmtlichen Beobachtungen gleichfalls mitgetheilt, und uns dadurch in Stand geſetzt hat, die Berechnung mit andern Elementen vornehmen zu können, ſo zeigt ſich, daß jene Tafeln die Höhen kleiner, als alle andere dormalen vorhandene, und nach den neuſten Beſtimmungen conſtruirte Tafeln geben. Wir wählen als Belege dieſer Angabe drey Punkte:

	<i>Wahlenberg</i>	<i>Oltmanns</i>	<i>v. Lindenau</i>
Grimfel	5778	5807	5806
Ezel	6554	6598	6594
Rothenſtock	8248	8289	8280

Die

Die Resultate aus *Biots* und *Benzenbergs* Tafeln, sind identisch mit denen von *Oltmanns*, da sie nach derselben Formel construirt sind. Sind also nicht (was wir jedoch bezweifeln möchten) besondere Gründe vorhanden, für den vom Verf. bereiften Theil der Schweiz eine Modification unserer heutigen Barometer-Formeln vorzunehmen, so werden alle hier mitgetheilte barometrische Höhenbestimmungen noch einer Aenderung bedürfen.

Nach dieser vorläufigen Höhenbestimmung der nördlichen Schweiz, die den eigentlichen Maßstab zu allen nachherigen Untersuchungen abgibt, geht der Verf. in den folgenden Abschnitten auf die eigentliche Vergleichung des hohen Nordens mit der mildern Zone über. Der Hauptzweck bleibt dabey immer botanisch, und wir können daher hier nur den kleinern zur allgemeinen physischen Geographie gehörigen Theil ausheben. Die einzelnen Abschnitte dieser Untersuchung sind folgende :

I. *De regionibus vegetationis earumque denominatione.*

Der Verf. begreift die Vegetation in verschiedenen Höhen unter vier Abtheilungen, *regio nivalis*, ewige Schnee-Gränze. *regio subnivalis*, wo der Schnee in günstigen Jahren ganz wegschmilzt und nur an versteckten Orten liegen bleibt, *regio alpina inferior*, zwischen der letztern und der Baum Gränze, und zuletzt *regio arborea*; dabey werden die vorzüglichsten Eigenthümlichkeiten der nordischen und Schweizer-Vegetation in diesen verschiedenen Abtheilungen aufgezählt, und es als eine auffallende Erscheinung

Erfcheinung bemerkt, daß die Alpen- und Baum-Region in Lappland nur 1800 in der Schweiz aber 2700 Fuß von einander entfernt wären; eine Abweichung, die durch den in der Schweiz häufig und zu allen Jahreszeiten fallenden Schnee herbey geführt seyn soll. Der Verf. entwirft bey dieser Gelegenheit ein etwas poetisches Bild der nordischen Alpen, was in Vergleichung mit dem gleich dabey von den Schweizer Bergen aufgestellten, ziemlich zum Vorthail jener ausfällt, und wohl jedem, der weder die einen noch die andern sah, weit mehr Lust zu Bereifung der Polar-Länder als unserer südlichern Dofrinen machen müßte. "*Ab Alpibus lapponicis descendentibus*" heist es hier (p. 35) "*nobis obvia est sylva betulina laetissimo virore splenscens et cacuminibus flexilibus ventis amice obsequens, quam circumvolant myriades culicum et apium alpinarum, nec non circumsaltant alacres illi Rhenones; ibique tota natura a die perpetuo et sole continuo laetitiam et alacritatem incomparabilem accipit. Contra in Helvetia sylvam obscuram abietinam primum intramus, cujus pyramides nigrescentes rigidae parcius disperguntur per pascua pinguißima, in quibus tauri alpini torvam suam et immobilem verticem imbris et glaciibus inter fulmina nocte atra cadentibus opponunt et ubi culices apesque nullas choreas agunt.*"

Hier so wie in einigen nachherigen Behauptungen ist es, daß wir etwas Vorliebe für Lappland zu finden glauben, die Darstellungen, wenn auch nicht entstell, doch in einer zu sehr verschönerten Farbe erscheinen läßt. Daß die Alpen-Region in der Schweiz ausgedehnter, oder der Abstand der Baum-Gränze

Gränze vom ewigen Schnee gröfser als in Lappland ist, liegt wohl nicht in den vom Verf. angeführten Umstand, sondern eines Theils darinnen, dafs in der Schweiz alles einen gröfsern Mafsstab als in jenem hohen Norden hat und mufs dann wie wir glauben, auch mit dataus erklärt werden, dafs die Baum-Vegetation nicht blos von der Temperatur, sondern auch unstreitig vom Druck der Luft oder von der mehr oder mindern Dichtigkeit der Atmosphäre abhängt. In den Tropenländern beträgt jener Abstand der ewigen Schnee und Baum-Gränze über 4000 Fufs, allein darum wird man doch wahrhaftig die Baum-Vegetation am Aequator nicht für ungünstiger als die ärmliche lappländische halten, da ja offenbar dort so wie in der Schweiz, wo die Vegetation überhaupt sich zu Höhen von 15000 und 9000 Fufs erhebt, gröfsere Stufenleitern statt finden müssen, als in jenem minder begünstigten Norden, wo schon bey einer Höhe von 3000 Fufs fast alle Vegetation erstirbt. Die Angabe, dafs keine Bienen in der Schweiz vorkämen, ist irrig, da gerade der vortrefliche Appenzeller Honig einen nicht unbedeutenden Industriezweig der dortigen Bewohner ausmacht; die Nicht-Existenz der Mücken aber gewifs nicht einem Lande zum Vorwurf gereichen kann, da im Gegentheil alle nordische Reisende über jene, als eine fast unleidliche Plage klagen. Ob endlich die "*alacres Rhenones*" auf dürrem Rennthier-Moos einen angenehmern Eindruck gewähren, als Heerden Schweizer-Sennen, wenn am Abend über glänzendes Grün, muntern Ziegen folgend, das schönste Hornvieh mit wohlthönendem Geläute heimkehrt, das

das überläßt Recensent dem Urtheil eines *Buch*, der beydes aus eigener Ansicht kennt.

Eben darum, weil die niedern lappländischen Gegenden, nur mit den höhern Puncten der Schweiz in Hinsicht des Clima's übereinkommen, scheint es uns, daß eine eigentliche Vergleichung der an beyden Orten statt findenden Vegetationen, mit Bestimmtheit nicht statt finden könne, da hier immer noch die Berücksichtigung des gewiß bedeutenden Einflusses verschiedener Dichtigkeit der Atmosphäre (*Humboldt Geograph. des plantes* pag. 95) übrig bleibt, der vom Verf. ganz außer Acht gelassen worden ist.

2. *Differentia reliqua inter vegetationem praecipue Alpinam Helvetiae et Lapponiae respectu progressionis plantarum versus Alpes.*
3. *Diversitas plantarum Helvetiae septentrionalis et Sueciae respectu indolis seu ordinis naturalis.*
4. *Diversitas plantarum Helveticarum et Suecicarum respectu soli.*
5. *Temperatura aeris.*
6. *Temperatura terrae.*
7. *Calor solaris directus.*
8. *Meteora.*

Im zweyten, dritten und vierten Abschnitt zählt der Verf. die Verschiedenheiten der nordischen und Schweizer-Vegetation auf, deren wahrscheinliche Ursachen in den letztern beygebracht werden. Die erstere Untersuchung ist rein botanisch und kann

uns

uns hier nicht beschäftigen, allein unter den letztern vier Rubriken bringt *Wahlenberg* mehrere ihm eigenthümliche interessante Beobachtungen bey, von denen wir das hauptsächlichste ausheben wollen. Der hier gleich anfangs aufgestellte, allerdings mehr für ein botanisches, als für unser Forum gehörige Grundsatz, daß ein größerer oder kleinerer Grad der Winterkälte keinen Einfluß auf die Vegetation habe, indem diese vielmehr bloß durch die Stärke der Sommerwärme bestimmt werde, scheint uns manchen Schwierigkeiten unterworfen zu seyn; wäre diese Behauptung allgemein wahr, so könnte ja eigentlich von der Erscheinung die wir das *Erfrieren der Gewächse* nennen, gar nicht die Rede seyn. Daß es Gewächse gibt, bey denen im Winter alles eigentliche Leben aufhört, so daß dann der Einfluß von -10° oder -30° Kälte ganz derselbe ist, sind wir weit entfernt zu läugnen, da dies durch die Erscheinungen im Norden außer allen Zweifel gesetzt wird; allein gegründeten Bedenklichkeiten scheint uns die Ausdehnung dieses Grundsatzes auf südlichere Gegenden und auf deren reichere Vegetation unterworfen zu seyn. Früher hatte *Wahlenberg* die mittleren Temperaturen der Luft für mehrere nordische Orte bestimmt, und dasselbe geschieht nun für die Schweiz. Die Resultate mehrjähriger barometrischer Beobachtungen sind folgende:

Umea . . .	+ 0,77
Ulea . . .	+ 0,65
Enontekis .	- 2,86
Mageroe . .	+ 0,07

Gotthardt-Hospice	—	0,°93
Zürch	+	8, 86
Chur	+	9, 45
Marschlin	+	11, 15
Peißenberg	+	6, 16

(hunderttheiliger Thermometer.)

Um eine Vergleichung der Temperatur auf dem Gotthardt mit der von Enontekis, und dann der von Stockholm und Peißenberg anschaulicher zu machen, sind die an diesen Orten beobachteten Thermometer-Stände auf einem Blatte vorgezeichnet; allein da die Vegetation auf dem Gotthardt allerdings weit kümmerlicher ist, als die in Enontekis, und hiernach jenes Clima auch noch weit rauher als das letztere vorausgesetzt wird, so glaubte der Verfasser noch eine Reduction deshalb anbringen zu müßen, um das relative Clima beyder Orte richtig würdigen zu können. So scharfsinnig die Art und Weise ist, mit der *Wahlenberg* hierbey verfährt, so wenig können wir doch das Verfahren selbst für statthaft halten, da es uns scheint, als könne eine bloß mit Hinsicht auf Temperatur gemachte Vergleichung der Vegetation zweyer Punkte, von denen der eine fast im Niveau des Meeres, der andere 1100 Toisen darüber liegt, wegen der großen Differenz in der Dichtigkeit beyder Atmosphären, nur sehr trügliche Resultate geben. Eben dasselbe dürfte, wiewohl im mindern Maßstabe, auch bey der Vergleichung von Stockholm und Peißenberg statt finden, wo die Höhen-Differenz 3087 Fufs beträgt.

Für

Für sehr interessant halten wir die vom Verfasser über das relative Verhältniß der Temperatur der Luft und Erde gemachten Beobachtungen; und wir sind vollkommen überzeugt, daß eine genaue Bestimmung der letztern einen weit sicherern Maßstab für die Vegetations-Verhältnisse verschiedener Länder abgibt, als die zeither dazu benutzten mittlern jährlichen Temperaturen der Luft; aus zahlreichen Beobachtungen über die Temperatur der Quellen suchte *Wahlenberg* die der Erde herzuleiten, und kam dadurch auf das interessante Resultat, daß im Norden die Temperatur der Erde durchgängig um einige Grade höher als die der Luft ist, daß diese Differenz mit der geographischen Breite abnimmt, ungefähr bey 46° und im Niveau des Meeres Null wird, und dann im entgegen gesetzten Sinn eintritt, indem nach *Humboldts* Beobachtungen am Aequator die meisten Quellen vier Grad kälter, als die Atmosphäre sind. Des Verfassers Erklärung dieser Erscheinung, durch eine Art von *Trägheit* der Erde, vermöge der diese eine mindere Receptibilität als die Luft für Extreme von Temperaturen hat, scheint uns sehr sinnreich und gelungen zu seyn. Die zahlreichen Beobachtungen hierüber, so wie über den großen Einfluß der directen Wärme der Sonnenstrahlen auf Vegetation im Norden, die dadurch in einer weit kürzern Zeit als im Süden gelingt, müssen in des Verfassers Werken selbst nachgelesen werden.

Meteore sind im Ganzen in Lappland weit seltner, als in der Schweiz, und die hier so häufigen, oft von Schloßen und Schnee begleiteten Gewitter, finden dort fast nie statt. Der Grund dieser Erscheinung liegt

liegt offenbar in einer Eigenthümlichkeit, die wir beynahe als die hauptsächlichste und am meisten charakterisirende beyder Länder ansehen möchten; in der grossen Feuchtigkeit der Schweizer- und der grossen Trockenheit der lappländischen Atmosphäre. Diese Ursache ist es, die in der neuen Welt eine seltene vegetabilische Fülle erschafft, während in Afrika unter denselben Parallelen Wüsteneyen sind; und eben darum hat die Schweiz einen glücklichen Pflanzen-Reichthum, während unter Lapplands unwirthbarem Himmel, alles den Charakter von Dürre und Mangel an sich trägt; die von *Humboldt* in seinen Ansichten der Natur für die amerikanische Vegetation gebrauchte, so richtig bezeichnende Benennung, „*safstsirotzende Pflanzen*,“ ist der lappländischen Flora fremd. „*Exinde fit*,“ sagt der Verf. (S. 94) wo von der Trockenheit der nordischen Atmosphäre die Rede ist, „*ut maxima pars terrae Lapponicae Lichene rangiferino tantum obducta sit, qui aestate tam exsiccat ut pedes peregrinatoris fere exurat, quasi in arena desertorum Africae iter faceret Exinde fit ut Lapponia fere ericetis siccissimis et paludinibus tantum tegatur, et ut pascua tantum inveniantur ad margines paludum et lacuum, eaque uliginosa caricibus duris repleta, adeo ut si Betulis et Salicibus tali aestate gaudentibus deslitteretur, in desertum fere completum converteretur.*“

Freylich ist dafür die Atmosphäre in Lappland frey von den gewaltsamen Revolutionen, die in einer feuchtern so häufig eintreten und eintreten müssen, und wo oft aufer so heftigen electrischen Entbindungen auch nicht selten, durch zum Theil noch un-

kannte

bekannte chemische Processe, Kälte-Grade statt finden, die dem eigentlichen Clima des Ortes ganz anomalisch sind. So sah Recensent Ende Aprils alle benachbarte Berge um Bordeaux mit Schnee und Reif bedeckt, ging im May in den Pyrenäen auf 5 bis 6000 Fufs hohen Bergen auf frisch gefallenem Schnee, erlebte im July in dem Hafen von Speccia ein Gewitter, welches mehrere Dächer abdeckte und handhoch Schlofsen zurückliefs, litt anfangs Aug. auf den Höhen von Vallombrosa empfindlich durch Kälte, nachdem am Morgen die Temperatur im Thal +, 25° Réaum. gewesen war; — allein darum wird doch wohl Niemand das Clima dieser Gegenden für ungünstiger halten, als das eines Landes, wo wie der Verf. sagt: "*Tale quid in tranquilla sua sylva betulina nunquam vidit Lappo*" da gerade diese Ruhe von Armuth und Mangel belebender Kraft zeigt, während im Gegentheil jene gewaltsamen Natur-Erscheinungen Beweise des schaffenden Reichthums sind, den nur eine feuchtwarne südliche Atmosphäre, dem glücklichen Lande, das eine solche umhüllt, zu gewähren vermag.

XXX.

Aus einem Schreiben des Herrn Professor Ritter *Bürg.*

Wien, vom 12. Jul. 1813.

Für die mir gütigst überschickte Abhandlung *Bessel's*, welche ich durch Frau von *Matt* am Ende des verfloßenen Monats erhalten habe, statte ich Ew. Hochwohlgeb. meinen verbindlichsten Dank ab; ich würde dieses früher gethan haben, wenn ich nicht gewünscht hätte, Ihnen zugleich die Resultate meiner Untersuchungen über die Verbesserung der zu Greenwich beobachteten Zenith - Distanzen mitzutheilen. Diese Resultate beziehen sich zwar auf *Bradley's* Refractionstafel, und ich bedaure es sehr, daß ich *Bessel's* interessante Abhandlung nicht dabey benutzen konnte; da sich aber die Refractionstafel des letztern von der *Bradley'schen* in jenen Entfernungen vom Scheitel, die ich untersucht habe, nur sehr wenig entfernt, so darf ich hoffen, daß die erhaltenen Resultate auch für jene brauchbar seyn werden, welche *Bessel's* Refractions-Tafel anzuwenden wünschen.

Ich habe alle Jahrgänge der zu Greenwich angestellten Beobachtungen von 1765 bis 1790 durchgerechnet, und in jedem Jahre ungefähr 60 Beobachtungen untersucht; 6 für jedes Solstitium, und 10 für jededer Entfernungen 35° , 45° , 55° , 65° vom Scheitel; bey diesen letzteren habe ich die Beobachtungen

tungen immer aus zwey verschiedenen Monaten gewählt, um beurtheilen zu können, ob sich der Collimationsfehler während dieser Zwischenzeit geändert habe. Der Regel nach war dieses nicht der Fall, und wenn eine Aenderung statt hatte, so liefs sich immer die Ursache derselben nachweisen. Dabey versteht es sich aber von selbst, dafs ich deswegen, weil einzelne Resultate von verschiedenen Jahren oder Monaten um 2" bis 3" verschieden waren, noch nicht auf eine Aenderung des Collimationsfehlers geschlossen habe, und ich denke, practische Astronomen werden mir darinn beystimmen. Ich habe daher, wenn es die Umstände zu erlauben schienen, aus den Resultaten mehrerer Jahre das Mittel genommen, und so die Verbesserungen für einen länger dauernden Zeitraum festgesetzt, nämlich von 1765 bis August 1772, wo das Fernrohr des Quadranten mit einem achromatischen Objective versehen wurde; vom October 1775, wo neue Punkte zur Untersuchung der Lage des Lothes gemacht worden sind bis August 1781, wo der Faden im Brennpuncte des Fernrohres beschädiget wurde; vom August 1781 bis 16. Sept. 1784, wo der Faden neuerdings zerrifs, und von da bis anfangs 1790. Die für das letztgenannte Jahr erhaltenen Resultate entfernen sich, ohne dafs mir eine Ursache bekannt ist, mehr von jenen zwischen 1784 und 1790, als dafs ich sie in das Mittel aufnehmen wollte. Diese Haupt-Resultate nun sind in folgenden vier Täfelchen enthalten:

1765 bis 1772			1775 bis 1781		
Entf. v. Scheit.	Verbeß.		Entf. v. Scheit.	Verbeß.	
28°	—	1, 2	28°	+	3, 6
35	—	1, 2	35	+	4, 3
45	+	1, 0	45	+	5, 2
55	+	1, 8	55	+	8, 0
65	+	3, 3	65	+	9, 5
75	+	6, 6	75	+	12, 2

1781 bis 1784			1784 bis 1790		
Entf. v. Scheit.	Verbeß.		Entf. v. Scheit.	Verbeß.	
28°	—	6, 1	28°	—	0, 7
35	—	4, 3	35	+	1, 3
45	—	3, 1	45	+	4, 7
55	—	0, 6	55	+	6, 2
65	+	1, 6	65	+	9, 8
75	+	3, 2	75	+	11, 3

Daraus folgt also, daß, wenn das positive Wachsen der Verbesserungen gegen den Horizont aus einer excentrischen Bewegung des Fernrohrs herzuleiten ist, diese größtentheils schon im Jahre 1765 vorhanden gewesen seye, und bis 1790 eben nicht sehr beträchtlich zugenommen habe.

Von 1773 bis October 1775 läßt sich keine allgemein brauchbare Verbesserung festsetzen; in diesem Zeitraume geben nur um wenige Tage von einander entfernte Beobachtungen nicht selten Correctionen, welche um mehr als eine halbe Minute von einander abweichen. Es ist mir daher glaublich, daß ein von den Beobachtern nicht bemerktes Hinderniß die freye Bewegung des Lothes gestört habe. Soviel mir bekannt ist, hat *Maskelyne* das Loth vor jeder Beobachtung zum Einspielen gebracht, und dadurch mögen bey der Schwierigkeit, einem so schweren Quadranten-

dranten eine sanfte Bewegung zu geben, so wie bey den verschiedenen, die freye Bewegung des Lothes hemmenden Hindernissen manche Abweichungen entstanden seyn. Ich habe bey der Stellung weit leichter Quadranten zu bemerken geglaubt, daß das Loth die Richtung öfters nicht änderte, obschon ich überzeugt war, daß der Quadrant wirklich eine Bewegung erhalten hatte, und das Loth dieser zufolge seine Stellung hätte ändern sollen. Auch *Piazz* sagt irgendwo, wenn ich mich recht erinnere, daß er durch einen gewissen Zeitraum fehlerhafte Zenith-Distanzen erhalten habe, weil das Loth zu tief im Wasser gieng. Bey einem Lothe von beträchtlicher Länge würde es mir daher vorzüglicher scheinen die Abweichung zu messen, oder durch eine Scale zu schätzen, und ich würde dasselbe, wenn es hinreichend gegen den Luftzug verwahrt ist, entweder gar nicht, oder doch nur am untersten Theile im Wasser gehen lassen. Sollte mich aber jemand, der noch mehr Erfahrungen darüber hat, als ich, zurechte weissen können, so wird mir dieses vielmehr willkommen, als unangenehm seyn.

Die vorher angeführten Resultate hängen in den äußersten Entfernungen vom Scheitel ganz, in den übrigen mehr oder weniger von der angenommenen Schiefe der Ecliptik ab. Zu jener Zeit, als ich diese Untersuchungen angefangen habe, war mir nichts zuverlässigeres darüber bekannt, als *Piazz*'s Bestimmung $23^{\circ} 27' 56''$ für 1800, und die jährliche Abnahme $0''.52$. Diese Haupt-Elemente habe ich während des ziemlich langen Zeitraums der Untersuchung ununterbrochen zu Grund gelegt, weil es

mir immer freystand, die Resultate zu verbessern, wenn mir, wie ich hoffte, etwas zuverlässigeres über die Schiefe der Ecliptik zwischen 1750 und 1800 bekannt werden würde. Zu meinem Leidwesen ist zwar diese Hoffnung nicht erfüllt worden; indessen war es mir sehr erwünscht, *Bessel's* Bestimmung der Schiefe der Ecliptik aus *Bradley's*chen Beobachtungen für 1755 kennen zu lernen; da es aber scheint, daß man für einen längern Zeitraum keine gleichförmige Abnahme der Schiefe der Ecliptik annehmen könne, ohne sich von dem Resultate der Beobachtungen zu entfernen, so versuchte ich die Schiefe der Ecliptik für 1778 herzuleiten, um ein Datum für die Mitteljahre zu erhalten. Ein Hilfsmittel dazu fand ich in den zu Greenwich beobachteten Scheitel-Abständen von H , η , μ und $\varepsilon\Pi$, deren Declinationen *Piazzi* für 1805 bestimmt hat. Auf dieses Jahr reducirte ich die Bestimmungen von *Mayer*, *La Caille* und *Bradley*, (freylich letztere nur, wie sie mir aus dem ältern Cataloge bekannt seyn konnten) mit der Lunifolar-Präcession $50,3899$, und suchte, nachdem mir die eigne Bewegung bekannt geworden war, die Declinationen für 1778. Eigene jährl. Bewegung. fand ich für $H\Pi - 0,1224$; für $\eta\Pi - 0,0592$; für $\mu\Pi - 0,1816$, und für $\varepsilon\Pi + 0,0204$; die Declinationen für 1778 aber $H\Pi 23^{\circ} 15' 22,5$; $\eta\Pi 22^{\circ} 33' 8,3$; $\mu\Pi 22^{\circ} 36' 30,8$; $\varepsilon\Pi 25^{\circ} 19' 53,3$. 68 Beobachtungen in den Jahren 1777, 1778, 1779 gaben mir die Verbesserung für 28° Entfernung vom Scheitel $+ 3,8$; für eben diesen Scheitelabstand hatte ich aus den Sonnen-Beobachtungen der Jahre 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 $+ 4,0$ Verbesserung gefunden; mit-

mithin war die Schiefe der Ecliptik, welche ich für 1778 angenommen hatte, um 0,"2 zu klein, und daraus folgte mittlere Schiefe der Ecliptik für 1778 $23^{\circ} 28' 7,6$. Vor vielen Jahren (*Eph. Vindob.* 1797) hatte ich aus ganz andern Daten die Schiefe der Ecliptik für 1781 $23^{\circ} 28' 5,8$ gefunden, und wenn ich gleich auf diese letztere Bestimmung jetzt keinen großen Werth lege, so scheint es mir doch, daß sich die für 1778 gefundene Schiefe der Ecliptik kaum um 1" oder 2" von der wahren entfernen dürfte. Ich habe daher die Schiefe der Ecliptik für 1756 $23^{\circ} 28' 15,0$, für 1778 $23^{\circ} 28' 7,6$, für 1800 $23^{\circ} 27' 56,0$ gesetzt, und daraus die Schiefe für jedes Mitteljahr hergeleitet. Die Sonnen-Declinationen, welche ich in meinen Untersuchungen gebraucht hatte, verbesserte ich durch die Formel

$$\Delta \delta'' = \frac{\Delta \omega'' \sin 2 \delta}{\sin 2 \omega} + \frac{2 (\Delta \omega'')^2 \sin 2 \delta \sin (\omega + \delta) \sin (\omega - \delta) \sin 1''}{(\sin 2 \omega)^2},$$

welche die Aenderung der Declination δ ausdrückt, die mit einer Aenderung der Schiefe ω zusammenhängt, und in der für meinem Zweck das zweyte Glied ganz überflüssig war. Auf diese Art erhielt ich die Resultate, welche ich Ihnen mitgetheilt habe, und wenn es getadelt werden sollte, daß ich die Aenderung der Schiefe der Ecliptik ungleichförmig angenommen habe, so werde ich nichts darauf erwiedern, als daß es mir leid thue, keine zuverlässigern Bestimmungen gekannt zu haben.

XXXI.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Staats-
Ministers von Ende.

Mannheim, 1813.

... Ich glaube, Ihnen über *Ponds* Declinationen schon neulich geschrieben zu haben, erinnere mich aber nicht mehr, ob damals meine Vergleichenngen vollendet waren. In der Ungewissheit setze ich die Resultate nochmals her. Ich habe *Piazzi's* Declinationen auf 1812 auf eine doppelte Weise reducirt, einmal mit der von *Piazzi* selbst in dem *Libro sesio* angegebenen jährlichen Variation, das andetemal mit *v. Zach's* Variation aus den *Tables nouvelles d'aberration*. Jene Differenzen bezeichne ich mit *P*, diese mit *Z*; + zeigt an, daß *Ponds* Declinationen um den angegebenen Werth größer, — hingegen, daß sie kleiner sind, als die von *Piazzi*,

	P.	Z.		P.	Z.
γ Pegasi	+ 2,41	+ 2,17	Sirius	— 2,18	— 3,35
α Cassiop.	+ 1,72	...	Castor	+ 0,93	+ 1,05
α Arietis	+ 1,42	+ 1,3	Procyon	— 2,24	— 1,80
α Persei	— 2,73	...	Pollux	+10,90	+10,88
Aldeb.	+ 0,05	— 0,15	α Hydrae	— 2,70	— 1,70
Capella	+11,56	+ 2,15	Regulus	— 0,19	+ 0,25
α Orionis	+ 0,85	+ 0,40	α Urs. maj.	+ 1,93	...
			β Leo-		

P.	Z.	P.	Z.
β Leonis + 8,82	+ 8,70	Wega + 1,20	+ 1,00
γ Urf. maj. + 1,47	γ Aquil. + 0,08	— 0,60
Spica — 0,01	+ 0,30	Athair — 0,47	— 1,30
η Urf. maj. — 0,07	α^1 Capr. + 0,50	— 0,05
Arcturus — 0,24	— 0,45	α^2 Capr. — 1,65	+ 2,03
α^1 Lib. NB + 161,0	+ 161,0	α Cygni + 3,62	+ 0,80
Gemma + 10,01	— 0,25	α Cephei + 5,04
α Serpent. + 1,35	+ 0,05	β Cephei + 2,44
Antares — 3,05	— 2,20	α Aquar. — 1,42	— 0,60
α Herc. — 1,04	— 2,05	α Pegasi + 1,54	+ 0,10
α Ophiu. — 1,00	— 1,50	α Andro. + 4,20	+ 3,90
γ Dracon. + 0,59		

Manche dieser Differenzen sind äusserst beträchtlich, z. B. bey *Pollux*, β *Leonis*, α *Androm.* etc. — Bey α^1 *Librae*, wo gar *P.* und *Z.* übereinstimmend + 161,0 geben, möchte ich indessen annehmen, *Pond* habe α^2 mit α^1 verwechselt, obwohl letzterer Stern nicht nur in Ihrem Briefe, sondern auch in der *Mon. Corr.* Jul. S. 98 gedruckt steht. Berechne ich mit *v. Zach's* Variation α^2 *Librae* für 1812, so erhalte ich 15° 15' 10,1", nur um 2,6 gröfser als *Ponds* Decl. für α^1 .

XXXII.

Gegenschein des Uranus im Jahr 1813.

Beobachtet auf der Sternwarte *a la Capelle* bey Marseille.

Von diesem Planeten erhielten wir zur Zeit seines Gegenscheins folgende Beobachtungen:

1813	Mittel. Zeit à la Capelle	Beobachtete scheinbare gerade Aufsteig. ♂	Beob. durch Parallaxe — 0,4 ver- bessert. süd- l. Abweich.	Beob. durch Aberr. + 13,9 Nutat. — 15,3 verhess. geoc. Länge ♂	Beob. nörd. geocentr. Breite ♂
	U				
14	12 5 50,5	233° 46' 29,7"	19 3 11,7	236 2 29,0	0 14 11,3
19	11 45 19,7	233 33 37,5	19 0 22,7	235 49 59,7	0 14 3,2
20	11 41 13,3	233 31 1,1	18 59 44,7	235 47 27,1	0 14 5,2
21	11 37 7,3	233 28 28,7	18 59 16,7	235 45 0,4	0 13 58,2

Aus unsern Sonnen-Tafeln erhielten wir die hierzu erforderlichen Elemente:

1813	Heliocentrische Länge der Erde vom mittl. Aequi- noctio	Logarithm. der Entf. ☉ von ☿	Schein- bare Schiefe der Eclipt.
May 14	233° 43' 5,6"	0,0049610	23° 27' 43,0"
19	238 30 49,4	0,0053946	
20	239 28 18,8	0,0054782	
21	240 25 47,4	0,0055603	

Aus den *Delambre'schen* Uranus-Tafeln, welche sich in der III. Ausgabe von *La Lande's Astro-
nomie* befinden, berechneten wir die heliocentri-
schen, und mit Anwendung obiger Elemente der
Erdbahn, die geocentrischen Örter dieses Planeten,
wel-

welche mit den beobachteten verglichen, die geocentrische Fehler der Tafeln gaben.

1813	Berechnete geocentr. Länge		Berechnete geoc. Breite nördl.		Geocentr. Fehler der Tafeln	
					in Länge	in Breite
May 14	236°	2'	24,2	0° 14' 17,"6	+ 4,"8	— 6,"4
19	235	49	55,6	0 14 14,7	+ 4,1	— 11,5
20	235	47	26,2	0 14 14,0	+ 0,9	— 8,8
21	235	44	56,8	0 14 13,2	+ 3,6	— 14,9
Mittl. geoc. Fehler der Tafeln					+ 3,4	— 10,4

Nun wurden die heliocentrischen Fehler der Tafeln gesucht, und folgende Resultate erhalten:

1813	log. curr. Dist. der U vom ☉	Beob. heliocentr. Länge	Beob. hel. Br. nördl.	Berechn. helioc. Länge	berechn. hel. Br. nördl.	Helioc. Fehler	
						in Länge	in Breite
May 14	1,2747271	235 54 59,7	0 13 25,5	235 54 55,1	0 13 31,5	+ 4,"6	— 6,"0
19	1,2747456	235 58 34,5	0 13 17,9	235 58 34,7	0 13 28,8	+ 3,8	— 10,9
20	1,2747400	235 59 19,4	0 13 19,8	235 59 18,5	0 13 28,1	+ 4,9	— 8,3
21	1,2747525	236 0 5,8	0 13 13,4	236 0 2,4	0 13 27,4	+ 3,4	— 14,0
Mittlere heliocentrischer Fehler der Tafeln						+ 3,"2	— 9,"8

Die Zeit des Gegenscheins dieses Planeten mit der Sonne, fällt zwischen den 16. und 17. May, und da wir keine Beobachtungen an diesen beyden Tagen haben, so berechneten wir die Oerter aus den Tafeln, und verbesserten sie durch Anbringung der durch unsere Beobachtungen gefundenen mittleren Fehler; auf diese Art erhielten wir

1813	M. Z. à la Capel- lete	Länge d. ☉ + Aberr. vom mittl. Aequin.	Verbesserte helioc. Länge d. ☉	Verbess. helioc. Breite d. ☉ nördl.	Verbess. geoc. Breite d. ☉ nördl.
May 16	0 U 0' 0"	55° 9' 28,"7	235° 56' 4,"3	0° 13' 20,"8	0° 14' 6,"2
17	0 0 0	56 7 11,7	235 56 48,4	0 13 20,3	0 14 5,8

Damit erhalten wir endlich

Zeit des Gegenscheins des Uranus 1813 den 16. May
um 19^U 37' 28,"4 M. Z. à la Capellette

in heliocentrischer Länge 235° 56' 40,"4

— heliocentrischer Breite 0 13 20,4 N.

— geocentrischer Breite 0 14 5,9 N.

Die:

Diese Uranus-Tafeln stimmen demnach noch ganz erwünscht mit dem Himmel, bis auf die etwas beträchtlichere Abweichung in der Breite. Allein dies läßt sich aus der offenbar zu gering angeetzten Neigung der Bahn erklären, denn man hat längst erkannt, daß die von *Delambre* in seinen Tafeln angenommene Neigung um $11,5$ zu klein ist. Vergrößert man sie um diese Quantität, so vermindert sich obiger mittlerer heliocentrischer Breitenfehler um $3''$, und es bleibt nur noch $+ 6,8$, welche vielleicht noch mehr heruntergebracht werden dürften, wenn man die Breiten-Störungen mit in Rechnung nähme, welche *Delambre* ganz außer Acht gelassen hat, und die jedoch, wenn sie alle in einem Sinne wirken, im *Maximo* $4,5$ betragen können. *)

*) Anhaltend ungünstiges Wetter vereitelte hier zur Zeit der Opposition alle Beobachtungen. Erst später wurden folgende erhalten:

		M.Z. Seeberg	AR. app. $\frac{1}{2}$	Decl. app. $\frac{1}{2}$
1813	1 Jun.	10U 53' 53,1	233° 0' 57,3	— 18° 52' 17,0
	7 —	10 29 17,2	232 46 48,5	— 18 49 2,6
	8 —	10 25 11,2	232 44 27,5	— 18 48 32,9
	12 —	10 8 48,6	232 35 22,2	— 18 46 32,0
	14 —	10 0 38,1	232 31 0,2

v. L.

XXXIII.

Anmerkung zur *Mon. Corr.* May-Heft 1812
Seite 426.

Wenn man in der Formel,

$$\sin^2 \phi (16 \sin 2 \phi - 13 \sin 4 \phi)$$

die vielfachen Winkel auf den einfachen reducirt, so wird sie, $84 \sin^3 \phi \cos \phi - 104 \sin^3 \phi \cos^3 \phi$; setzt man deren Differential $= 0$, so erhält man $52 \sin^4 \phi - 50 \sin^2 \phi + 5 = 0$ woraus endlich

$$\sin \phi = \pm \sqrt{\frac{25 \pm \sqrt{365}}{52}} = \pm \begin{cases} 0,3366985 \\ 0,9209628 \end{cases}$$

Diese Sinus gehören innerhalb des ersten Quadranten, zu $19^\circ 40' 33''$ und $67^\circ 4' 2''$; jener gibt den Werth der Formel $= -0,29508$, dieser gibt ihn $= +20,76105$. Der letzte Werth ist offenbar der von dem Recensenten, seiner Absicht gemäß nur ungefähr angegebene; der erste ist *genau der dritte Theil* des von Henry gefundenen Maximi, woraus erhellet, daß Henry's Ansätze richtig gewesen, und nur in dem Lauf des Calculs eine Division mit 3 vergessen worden, deren nähere Veranlassung jedoch nur von einem Besitzer des *Memoires sur la projection des cartes géographiques* aufzufinden seyn möchte. Es ist offenbar, daß die Formel $= 0$ wird für $\phi = 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$, sie wird es aber auch, wenn $16 \sin 2 \phi = 13 \sin 4 \phi$, das ist, wenn $\cos 2 \phi = \frac{8}{13}$, oder auch wenn $\phi = 26^\circ 0' 36''$.
Nimmt

Nimmt man nun noch Rückſicht auf den Zeichen-Wechſel der trigonometriſchen Linien, ſo erhält man für

$$\varphi = \left\{ \begin{array}{ccc} 0^{\circ} & 0' & 0'' \\ 19 & 40 & 33 \\ 26 & 0 & 36 \\ 67 & 4 & 2 \\ 90 & 0 & 0 \\ 112 & 55 & 58 \\ 153 & 59 & 24 \\ 160 & 19 & 27 \\ 180 & 0 & 0 \\ 199 & 40 & 33 \\ 206 & 0 & 36 \\ 247 & 4 & 2 \\ 270 & 0 & 0 \\ 292 & 55 & 58 \\ 333 & 59 & 24 \\ 340 & 19 & 27 \\ 360 & 0 & 0 \end{array} \right\} \begin{array}{c} \text{Den} \\ \text{Werth} \\ \text{der} \\ \text{Formel} \end{array} = \left\{ \begin{array}{l} 0,00000 \\ - 0,29508 \\ 0,00000 \\ + 20,76105 \\ 0,00000 \\ - 20,76105 \\ 0,00000 \\ + 0,29508 \\ 0,00000 \\ - 0,29508 \\ 0,00000 \\ + 20,76105 \\ 0,00000 \\ - 20,76105 \\ 0,00000 \\ + 0,29508 \\ 0,00000 \end{array} \right.$$

Die Reihe der Werthe wird hier abgebrochen, obwohl jedem Sinus unendlich viele Bogen angehören, weil bey der Darſtellung jener Werthe im Raume, die Curve nach dem erſten Umkreiſe in ſich ſelbſt zurückkehrt; es beſteht dieſelbe aus acht Schleifen. Es verſteht ſich, daß Polar-Coordinationen gebraucht wurden.*)

Bey

*) So vollkommen wir die Richtigkeit der vorſtehenden Anmerkung anerkennen, ſo wenig können wir doch dadurch unſere am angezeigten Ort, gegen *Henry's* Angabe gemachte Rüge für beſeitigt halten. In *Henry's Mémoires* (p. 42) iſt davon die Rede, welche Potenzen von *e* in dem Ausdruck für *f* wegen Kleinheit der Coefficienten, vernachläſſiget werden können, und es heiſt dann:

La

Bei Gelegenheit dieser Untersuchung wurden in den großen Sinus-Tafeln des *Pitiscus* (*Theſaurus mathem. Francof. 1613 fol.*) folgende Druckfehler bemerkt, deren Anzeige die höchste Seltenheit dieses Werkes entschuldigen mag:

Sin. 67° 3' 50"	statt 92193	lies 92093
— 67 4 0 —	92195	— 92095
— 67 4 10 —	92197	— 92097
— 67 4 20 —	92199	— 92099

XXXIV.

Le facteur $\sin^2 \phi$ ($16 \sin^2 \phi - 13 \sin 4 \phi$) est le plus grand possible, lorsqu'on a $\operatorname{tg} 4 \phi = 14 \operatorname{tg} \phi$ ou $7 \operatorname{tg}^2 \phi = 40 \operatorname{tg}^2 \phi$, d'où l'on tire $\operatorname{tg}^2 \phi = \frac{20 - \sqrt{365}}{7}$ et il n'est alors que de $-0,88526$, c'est à dire moindre que l'unité.
 Da es nun hier offenbar darauf ankömmt, den wirklich größten Werth des Factors $\sin^2 \phi$ ($16 \sin^2 \phi - 13 \sin 4 \phi$) zu bestimmen, und für ϕ (geograph. Breite) jeder Werth, also eben so gut $19^\circ 40' 33''$ als $67^\circ 4' 2''$ statt finden kann, so ist auch *Henry's* Angabe in jedem Falle irrig, und könnte zu wirklichen Irrthümern führen, wenn man den Ausdruck für größere Excentricitäten gebrauchen und das Glied mit e^6 unter der Voraussetzung vernachlässigen wollte, daß dessen Coefficient nie die Einheit erreichen könnte. v. L.

XXXIV.

Preisfragen auswärtiger Akademien.

Da die Preisfragen auswärtiger Akademien in Deutschland doch nur wenig bekannt werden, so rücken wir die von der Academie zu Lyon und der Academie du Gard, neuerlich uns zugefandten Programme auszugsweise hier ein.

1. Academie du Gard.

L'Académie propose pour le sujet d'un prix à decerner en 1814 la question suivante:

Soumettre à une discussion soigneuse toutes les diverses hypothèses imaginées jusqu'ici pour expliquer l'apparence connue sous le nom de Queue ou de chevelure des comètes? Examiner principalement si parmi les hypothèses, il en est quelqu'une qui, par son exacte conformité, tant avec l'observation qu'avec les principes d'une saine physique, puisse en toute rigueur être admise; ou si au contraire, il est nécessaire pour expliquer cette apparence, de recourir à quelques hypothèse nouvelle? Les concurrens sont non seulement autorisés, mais même invités à comprendre, dans leur examen, les idées qu'ils pourroient personnellement avoir sur ce sujet.

Die Preisschriften müssen portofrey an *Mr. Trelis, Secrétaire perpétuel de l'Académie du Gard à Nismes* vor dem 1. März 1815 eingesandt werden. Der Preis besteht in einer Medaille von Gold, hundert Grammen am Gewicht.

2. Aca-

2. *Académie des sciences belles lettres
et arts de Lyon.*

L'Académie met au concours pour l'année 1814 la question suivante :

La belle expérience de Lyon a prouvé que l'air atmosphérique, subitement et fortement comprimé, laissait échapper une lumière vive, facilement visible dans l'obscurité. D'autres expériences faites dans la même ville ont donné lieu de penser que cette propriété d'être lumineux par la compression, appartient exclusivement au gaz oxygène, et qu'elle ne le manifeste dans quelques autres gaz, qu'autant qu'il est mêlé avec eux en plus ou moins grande proportion; enfin, on sait encore qu'un éclair instantané a été quelquefois aperçu au moment où l'on tirait dans l'obscurité un fusil à vent, fortement chargé. L'académie pour compléter les connaissances acquises sur ce sujet, demande.

- 1° Que l'on détermine quelle est l'altération qu'éprouvent le gaz oxygène et l'air atmosphérique par le dégagement de la lumière.
- 2° Qu'on fasse connaître ce qui arrive dans les gaz azote hydrogène et acide carbonique purs et sans mélange d'air atmosphériques, lorsqu'ils sont vivement comprimés;
- 3°. Enfin qu'on recherche de même ce qui se passe dans tous les gaz, lorsqu'ils éprouvent subitement une grande dilatation.

Der Preis besteht in einer goldnen Medaille 300 Fr. am Werth. Die Preisschriften müssen vor dem 30. Jun. 1814 an *Mr. Mollet* oder *Dumas*, Secrétaire der Académie, gesandt werden.

I N H A L T.

	Seite
XXIV. Geographische Lage von St. Gallen im Thurgau	201
XXV. Verzeichniß von Sternbedeckungen durch den Mond, für das Jahr 1814 berechnet von den Floren- zer Astronomen P. P. <i>dal Rico</i> und <i>Inghirami</i>	211
XXVI. Ueber die Störungen der Vesta. Von Hrn. <i>Burck-</i> <i>hardt</i> , Mitglied des Pariser Instituts.	212
XXVII. Auszug aus einem Schreiben des Rufs. Kaiserl. Kammer-Assessors Dr. <i>U. J. Seetzen</i> , (Fortf. zu S. 182 des Februar-Hefts.)	227
XXVIII. Supplément au second livre du traité de Topo- graphie, contenant la théorie des Projections des Cartes; par <i>L. Puissant</i> , Chef de Bataillon au corps impérial des Ingénieurs Géographes. Paris 1810.	254
XXIX. <i>Georgii Wahlenberg</i> , Med. Doct. de vegetatione et climate in Helvetia septentr. inter flumina Rhe- num et Arolam observatis, et cum summi septentrio- nis comparatis tentamen. Cum tabula altitudinem montium terminosque vegetationis monstrante, et tabula temperaturae, nec non tabula botanica. Tu- rici Helvetorum impensis <i>Orell, Fuessli et Soc</i> 1813	263
XXX. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. <i>Bürg</i>	280
XXXI. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Staatsmini- sters von <i>Ende</i>	286
XXXII. Gegenchein des Uranus im Jahr 1813	288
XXXIII. Anmerkung zur <i>Mon. Corresp.</i> 1812. S. 426	291
XXXIV. Preisfragen auswärtiger Akademien.	294

Sechs Monatsstücke, jedes von sechs bis acht Bogen, machen einen Band aus, der mit einem Sachen- und Namen-Register geschlossen wird; zwey Bände einen Jahrgang. Der Preis eines Jahrgangs ist 6 Thaler Conv. Geld, und man kann zu jeder Zeit in das Abonnement eintreten, muß aber den ganzen laufenden Jahrgang nehmen. Einzelne Monatsstücke kosten 14 ggr.

Man macht die Bestellungen bey den Post-Expeditionen und Buchhandlungen jedes Orts, welche die Exemplare von unterzeichneter Buchhandlung auf dem gewöhnlichen Wege beziehen.

Auch sind bey uns zu haben :

de Lindenau Tables barométr. pour faciliter le Calcul des Nivellements et des mesures des hauteurs par le Baromètre. 4°. 2 Thlr. 12 gl.

Ejusdem Tabulae Veneris novae et correctae. Fol. min. 2 Thlr.
de Zach Tabulae Motuum Solis novae et corr. quibus acced.

Fixar. praecip. Catal. nov. ex observat. astr. ann. 1787-90 in spec. astr. Goth. habitis. 1792 Fol. min. 6 Thlr.

Ejusdem Fixarum praecip. Catal. nov. etc. (*besonders gedruckt*) 3 Thlr.

— Tabulae mot. sol. etc. Supplement 1804. 1 Thl. 12 gl.

— Astronom. Tafeln der mittl. geraden Aufsteig. der Sonne etc. zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc. (*beym Observiren zu brauchen*). Gebund. 6 gl.

— Nachrichten von der k. preuss. trigonom. und astronom. Aufnahme von Thüringen etc. und von der Gotha'schen Gradmessung I. Th. 2 Thlr.

— Tabulae spec. Aberr. et Nutat. una cum insignior. 494 stell. zod. Catalogo novo etc. Vol. I. II. 4° broch. 20 Thlr.

— Tables abrégées et port. du soleil. 1 Thlr. 12 gl.

— Tables abr. et port. de la lune. 2 Thlr. (*Beyde in kl. 4. broch.*)

— Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour 1404 étoiles etc. 8° broch. 3 Thlr. 12 gl.

Beckersche Buchhandlung in Gotha.



MONATLICHE
CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG
DER *LeibRegiment*
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

von

Freyherrn F. von ZACH,
Herzoglichen Sachsen-Gothaischen
Oberhofmeister.

OCTOBER 1813.

G O T H A,
in der Beckerschen Buchhandlung.

Der Zweck dieser *Monatlichen Correspondenz* ist: Die Freunde der *Erd- und Himmels-Kunde* und der dahin einschlagenden Wissenschaften und Künste von den Fortschritten, welche von Zeit zu Zeit in diesen Fächern der Gelehrsamkeit geschehen, frühzeitig zu benachrichtigen. Sie beruht auf einer von dem Herrn Herausgeber mit vielen gründlichen Gelehrten im Fache der Astronomie und Geographie (beydes im weitesten Sinne,) in den verschiedenen europäischen Staaten getroffenen Uebereinkunft, ihm die Resultate ihrer Forschungen, Beobachtungen und Lectüre mitzutheilen, um solche mittelst dieser Zeitschrift sowohl gegenseitig auszuwechseln, als auch durch öffentliche Bekanntmachung gemeinnützig zu machen.

Sie enthält also:

- I. Neue eigene Aufsätze der Herren Correspondenten über Gegenstände der Astronomie, der mathematischen, physischen und politischen Geographie, und der zu diesen Fächern gehörigen Hülfswissenschaften und Fertigkeiten, welchen, wo es zur Erläuterung nothwendig ist, Zeichnungen, Plane und Landkarten beygefügt werden.
- II. Einzelne eigene Beobachtungen, Erfahrungen, Entdeckungen und Erfindungen in diesen Wissenschaften.
- III. Urtheile und Nachrichten von neuen in diese Wissenschaften einschlagenden Schriften, wodurch die Wissenschaft erweitert oder berichtigt wird.
- IV. Beurtheilende Nachrichten von neuen Landkarten, Planen, astronomischen und mathematischen Werkzeugen u. s. w.
- V. Biographische Nachrichten von Männern, die in diesen Fächern viel geleistet haben, mit ihren Bildnissen.
- VI. Berichte von Reisenden, die auf die Länder- und Völkerkunde Bezug haben.

MONÄTLICHE
CORRESPONDENZ
ZUR BEFÖRDERUNG
DER
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

OCTOBER 1813.

XXXV.

Über die geographische Lage der Stadt Bamberg
und der Altenburg, sonst die Baben-
burg genannt.

Wir haben schon im XXV. Bande der *M. C. S.* 328
erwähnt, daß wir im Junius 1807 mit dem sel. Pro-
fessor Schiegg*) in Bamberg zusammen trafen. Er
hatte von der bairischen Regierung den Auftrag, das
Für-

*) *P. Ulrich Schiegg*, Priester aus dem gelehrten Benedi-
ctiner-Orden, unsern Lesern aus gegenwärtiger Zeit-
schrift längst ruhm und ehrenvoll bekannt, ward zu
Gosbach bey Wiesensteig in Schwaben, den 3. May 1752
Mon. Corr. XXVII, B. 1813. V geboh-

Fürſtenthum Bamberg trigonometriſch aufzunehmen, und mit den Meſſungen in Baiern in Verbindung zu bringen. Zu dieſem Ende hatte er einen achtzehn-zolligen Repetitionskreis mit ſtehender Säule, einen zwölfzolligen einfachen Theodoliten, und eine, halbe Secunden ſchlagende, Pendeluhr bey ſich; Inſtrumente, welche ſämmtlich in dem *Reichenbach'schen* mechanischen Inſtitute in München verfertigt waren.

Wir hatten bey uns einen funfzehnzolligen Repetitions-Kreis mit zwey Fernröhren, einen neun-zolligen Spiegel-Sextanten, beyde von *Troughton* aus London; drey *Emery'sche* Chronometer, und einen von *Berthoud*.

Prof. *Schiegg* errichtete ſeine Sternwarte auf der, auſerhalb der Stadt auf einer Anhöhe gelegenen, alten Burg, ſonſt die *Babenburg*, jetzt die *Altenburg* genannt, weil dieſe hoch gelegene, über einen unumſchränkten Geſichtskreis gebietende, mit einem hohen Thurm verſehene, Burg ein trigonometriſcher

Punct

gebohren. Docirte Philoſophie, Mathematik, Aſtronomie in verſchiedenen Stiftern ſeines Ordens zu Ottobeuren, Cremsmünſter, Ochſenhausen. War zuletzt Profeſſor der Mathematik zu Salzburg, von da er 1803 zur baieriſchen Meſſung berufen ward. Als er von einer trigonometriſchen Station zurückkehrte, und in ſeinem mit Inſtrumenten beladenen Wagen einen ſteilen Berg herabfuhr, hatte er das Unglück umzuwerfen; eine ſchwere Kifte fiel ihm auf die Bruſt, und beſchädigte ihn ſehr gefährlich; er ſtarb als Märtyrer ſeines Berufes an den Folgen dieſes Sturzes in München den 15. Sept. 1808.

Punct seines Dreyecks-Netzes war. *) Der Kreis wurde auf der obersten Terrasse dieses alten Thurms aufgestellt.

Wir ließen unsere Instrumente auf dem sogenannten *untern Pfarrthurm* (vormals der Thurm des Jesuiter-Collegium's) bringen, wo sonst die Jesuiten, und zuletzt der Jesuite P. *Johann Jacobs*, **) astronomische Beobachtungen anstellten. Die Breite dieses Thurms haben wir auf der obersten Gallerie, wo die Wohnung des Thürmers ist, aus 162 Circummeridianhöhen der Sonne, mittelst unsers *Trough-tonschen* Kreises bestimmt. Die hierzu gebrauchten Abweichungen der Sonne wurden aus der zweyten Ausgabe (Gotha 1804) unserer Sonnentafeln berechnet.

Wir werden diese berechneten Sonnen-Declinationen wegen der noch etwas zweifelhaften Schiefe der Ecliptik besonders anführen, damit, wenn dieses Element in der Folge mit mehr Sicherheit bestimmt

wer-

*) Auch in *Cassini de Thury, Relation d'un voyage en Allemagne, Paris 1775 p. 120* ist die Altenburg ein Dreyeckspunct; allein da zu diesen Dreyecken eine Basis, oder eine bekannte Seite fehlt, so können sie zu nichts dienen.

**) P. *Johann Jacobs* war aus *Spiesheim* in der Pfalz gebürtig. *Meusel* führt in seinem gelehrten *Deutschland* das Geburtsjahr, aber nicht seinen Geburtsort an. Er starb in Bamberg im December 1800. Seine Papiere bekam Professor *Baz* in Bamberg zur Durchsicht, welcher sie noch besitzt. Wir konnten nicht erfahren, welche astronomische Schätze sie enthalten.

werden sollte, man diese Declinationen, und folglich die Bamberger Breite hiernach verbessern könne. Für die Strahlenbrechung haben wir uns der *Carlini*'schen Tafeln bedient. Hiernach stehen unsere auf dem Jesuiter - Thurm beobachteten Breiten also:

1807	Anzahl der Beobb.	Einzelne Brei- ten	Anzahl der Beobb.	Zusammen- gestellte Brei- ten
Jun. 15	30	49° 53' 40,"88	30	49° 53' 40,"88
- 16	32	40, 13	62	40, 49
- 20	30	38, 68	92	39, 91
- 25	40	41, 17	132	40, 28
- 26	30	40, 77	162	40, 38

Größte Differenz von
einem Tag zum andern = 2,"49

Wahre Breite von Bamberg . . . 49° 53' 40,"38

Prof. *Schiegg* fand auf der Altenburg mit seinem *Reichenbach*'schen Kreife mit stehender Säule aus 172 Sonnen-Beobachtungen, auf dieselbe Art berechnet, folgende Breiten:

1807 19	28	49° 52' 60,"13	28	49° 52' 60,"13
Jun. 20	46	61, 01	74	60, 73
- 25	52	56, 29	126	58, 90
- 26	46	60, 69	172	59, 38

Größte Diff. von einem

Tag zum andern = 4,"72

Wahre Breite der Altenburg . . . 49° 52' 59,"38

Man sieht demnach, was wir am angezeigten Orte der *M. C.* schon erinnert haben, daß die Differenz in den Beobachtungen beym Kreife mit stehender Säule und einem Fernrohre, noch einmal so groß, als beym Kreife mit zwey Fernröhren war.

Die

Die bey obigen Beobachtungen angewandten Declinationen waren mit Innbegriff der Sonnenbreiten folgende:

1807	Nördl. Abweichung der ☉		
Junius 15	23°	17'	48,"66
— 16	23	20	28, 64
— 19	23	26	0, 41
— 20	23	27	1, 52
— 25	23	25	54, 90
— 26	23	24	27, 18

Da wir sowohl als Prof. Schiegg auf unsern Beobachtungsplätzen täglich correspondirende Sonnenhöhen nahmen, um den Stand und Gang unserer Uhren zu kennen, so kamen wir überein, unsere Meridian-Differenz durch Signale zu bestimmen. Von der Altenburg konnte man gerade auf den Jesuiten-Thurm sehen, und da die Entfernung nur 1024 Toisen ist, so bedurften wir keiner Pulver-Signale, und wir gaben uns nach vollbrachten Circummeridian-Beobachtungen der Sonne jedesmal zwölf Signale zur Vergleichung unserer Uhren, blos mittelst eines weissen Tuches. Wir erhielten auf diese sehr einfache Art folgende Mittags-Unterschiede:

	20. Jun.	21. Jun.	25. Jun.
1	4,"30	5,"47	6,"58
2	4, 80	4, 97	6, 58
3	4, 80	5, 22	6, 82
4	5, 10	4, 67	6, 58
5	5, 00	4, 97	6, 58
6	5, 00	4, 97	6, 58
7	4, 80	4, 47	6, 58
8	4, 80	4, 47	6, 58
9	4, 80	4, 47	6, 58
10	4, 80	4, 47	6, 58
11	4, 80	4, 47	6, 58
12	4, 80	4, 47	...
	4, 82	4, 76	6, 61

Da die Meridian - Differenz vom 25. Jun. zu sehr von denen vom 20. und 21. Jun. unter sich harmonirenden abweicht, so scheint in der Zeitbestimmung am 25. Jun. irgendwo eine kleine Anomalie vorgefallen zu seyn; wir schliessen daher die an diesem Tage gefundene Differenz aus, und nehmen das Mittel aus den zwey übereinstimmenden Tagen den 20. und 21. Junius, und finden den Längen - Unterschied zwischen der Altenburg und dem Jesuiter - Thurm in Bamberg $4^{\circ} 79'$ in Zeit, oder $1^{\circ} 11'$ $85''$ im Bogen, Altenburg westlich von Bamberg. Die absolute Länge und Breite dieser Stadt scheint unseres Wissens noch niemals astronomisch bestimmt worden zu seyn. *) Bey unserer Anwesenheit trug sich zwar den 23. Junius eine Bedeckung des Sterns τ im Steinbocke vom Monde zu. Wir waren darauf gut vorbereitet; des Morgens um 3 Uhr sahen wir den Stern noch ziemlich deutlich, allein das zunehmende Tageslicht vertilgte alle Spuhr dieses kleinen Sterns sechster Gröfse noch vor dem Eintritte. Wir zweifeln, dafs diese Stern - Bedeckung irgendwo beobachtet worden ist.

Den 16. Jun. begaben wir uns mit Prof. Schiegg und seinem Reichenbach'schen Theodoliten auf den Jesuiter - Thurm, und beobachteten daselbst auf der steinernen Brustwehr der Gallerie, welche den Thurm umgibt, acht Azimuthe mit der untergehenden Sonne und der Kapelle von *Staffelstein*, welche gleichfalls ein Dreyeckspunct des trigonometrischen Netzes ist. Wir erhielten nachstehende Resultate:

Wahre

*) *Tob. Mayer, Mappa critica Germaniae* setzt die Länge von Bamberg auf $28^{\circ} 37'$ die Breite $49^{\circ} 57'$, folglich über 3 Minuten falsch.

XXXV. Geograph. Lage der Stadt Bamberg. 303

Wahre Zeit oder Stunden-Win- kel	Polar-Dist. des Mittel- puncts der Sonne	Berechnetes Azimuth der ☉ von Nord nach Westen	Winkel zwi- schen dem Mittelpunct der ☉ und der Kapelle von Staffelstein	Azimuth der Kapelle von Staffelstein von Nord nach Ost.
6U 21' 23." 26	66° 38' 56"	70° 39' 48"	94° 51' 24"	24° 11' 36"
27 55, 49	56	69 30 17	93 41 48	31
35 7, 96	55	68 13 6	92 24 31	25
42 20, 69	54	66 55 54	91 7 32	38
48 34, 65	54	65 48 58	90 0 38	40
55 20, 11	53	64 36 9	88 47 36	27
7 2 33, 31	52	63 18 2	87 29 32	30
9 4, 77	51	62 7 7	86 18 32	25

Mittel-Azimuth der Kapelle von Staffelstein von

Nord nach Ost 24° 11' 31." 5
180 0 0

Dasselbe Azimuth vom Standort des Theodo-
liten von Süd nach West 204° 11' 31." 5

Reduction auf den Mittelpunct des Thurms — 6 41, 5

Azimuth von Staffelstein vom Mittelpunct des
Jesuiten-Thurms 204° 4' 50." 0
von Süd nach West.

Den 21. Junius beobachteten wir auf der Alten-
burg auf dieselbe Art sechs Azimuthe der Kapelle auf
dem Staffelstein mit der untergehenden Sonne, wie
hier folgt:

Wahre Zeit oder Stunden-Win- kel	Polar - Dist. der Sonne	Berechnetes Sonnen-Azi- muth von Norden nach Westen	Winkel zwi- schen ☉ und Staffelsteiner Kapelle	Azimuth des Kapelle von Nord nach Ost
5U 27' 1." 37	66° 32' 19"	80° 15' 12"	105° 49' 16"	25° 34' 4"
31, 91	19	78 11 33	103 45 42	34 9
46, 72	19	76 54 17	102 28 0	33 43
47, 52	18	75 7 22	100 41 26	34 4
2, 91	18	72 56 58	98 31 5	34 7
42, 19	18	71 14 18	96 48 18	34 0

Azimuth d. Kapelle von Staffelstein v. Nord n. Ost 25° 34' 1." 2

Dasselbe von Süd nach West gezählt . . . 205 34 1, 2

Nun

Nun war es uns um eine geodätische Verbindung des Jesuiterthurms mit der Altenburg zu thun. Prof. Schiegg theilte uns zu diesem Behufe ein Dreyecks Netz mit, welches er im Sept. 1806 über die ganze Stadt Bamberg verbreitet hatte. In der Gegend der *Wunderburg* hatte er eine kleine Basis von 1531,07 pariser Fuß mit der Kette gemessen, worauf er seine Dreyecke gegründet hatte. Wir zogen daraus folgende vier Dreyecke, welche die Verbindung des Jesuiterthurms mit der Altenburg bewirken:

No.	Namen der Stand - Orte	Winkel	Seiten in Franz. Toisen	
I	a. nördl. Endpunct d. Basis	38° 41' 58"	b S = 459, 38	Siehe die Kupfer- Tafel
	b. südl. Endpunct — —	120 58 39	a S = 629, 93	
	S. St. Stephans-Thurm	20 19 23	a b = 255, 15 Basis	
II	b. südl. Endpunct d. Basis	43 33 58	S J = 310, 10	
	S. St. Stephans-Thurm	49 37 54	b J = 349, 45	
	J. Jesuiter-Thurm	86 48 8	349, 61	
III	a. nördl. Endpunct d. Basis	62 19 58	b J = 349, 77	
	b. südl. Endpunct — —	77 24 56	a J = 385, 44	
	J. Jesuiter-Thurm	40 15 6		
IV	b. südl. Endpunct d. Basis	43 10 44	J A = 1024, 60	
	J. Jesuiter-Thurm	117 15 23	Ab = 1214, 04	
	A. die Altenburg	14 43 53	b J = 349, 61	

Hiernach wäre die Entfernung des Jesuiter-Thurms vom Thurm der Altenburg 1024,60 franzöf. Toisen. Den 16. Junius hatten wir auf dem Jesuiter-Thurm das Azimuth der Kapelle auf dem Staffelstein mit dem Meridian dieses Thurms von Süd

nach West gefunden 204° 4' 50,"0

Auf demselben Thurm ward der Win-

kel zwischen Staffelstein und Altenburg beobachtet 161 20 40, 0

Folglich das Azimuth von Altenburg mit dem Meridian des Jesuiter-

Thurms 42° 44' 10,"0

Mit

XXXV. Geograph. Lage der Stadt Bamberg. 305

Mit diesem Azimuth und der oben gefundenen Entfernung beyder Puncte berechneten wir ferner ihre Längen- und Breiten-Unterschiede, und fanden für die Meridian-Differenz zwischen dem Jesuiter-Thurm und der Altenburg in Bogen . . . 1' 7,"91
Die am 20. und 21. Jun. gegebenen

Signale haben uns gegeben	1	11, 85
Unterschied	3,	94

Die Breiten-Differenz folgt aus dieser

Berechnung	—	47,"49
----------------------	---	--------

Unsere auf dem Jesuiter-Thurm beobachtete Breite war

	49°	53'	40,"38
--	-----	-----	--------

Folglich die wahre Breite von der

Altenburg	49	52	52,"89
---------------------	----	----	--------

Allein Prof. Schiegg hatte sie unmittelbar beobachtet.

	49	52	59, 38
--	----	----	--------

Unterschied	6,"49
-----------------------	-------

Mit der Differenz bey der Länge kann man ganz wohl zufrieden seyn, da dieser Unterschied kaum 0,"3 in Zeit beträgt, eine Gröfse, welche niemand bey zweytägiger Zeitbestimmung durch correspondirende Sonnenhöhen verbürgen, und nur zufällig erreichen kann. Bedeutender ist der Unterschied bey der Breite, welcher $6\frac{1}{2}$ Sec. beträgt, und dasjenige bestätigt, was wir in unserer Zeitschrift über Beobachtungen mit Repetitions-Kreisen schon gesagt haben. Es sey dann, daß man auch hier Lust habe, die Beobachtungsfehler der Ablenkung des Lothes, und verborgenen Dichtigkeiten aufbürden zu wollen.

Da

Da wir zu unsern Breiten-Beobachtungen wegen der Strahlenbrechung auch die meteorologischen nöthig hatten, so benutzten wir diese zugleich zur Bestimmung der Höhen-Differenz unserer Beobachtungs-Orte, wie folgende Darstellung zeigt:

1807	Auf der Altenburg.				Auf dem Jesuiter - Thurm.				Be- rechn. Höhe in franz. Toisf. t
	Barometer		Therm. Réaumur		Barometer		Thermom. Réaumur.		
	Pariser Maß		äußer	inner.	Pariser Maß		äußerer	innerer	
	Zoll	Lin.			Zoll	Lin.			
20	26	11,5	+14,3	+15,5	27	6,00	+21,50	+17,75	81,66
21	27	0,9	+11,8	+13,4	27	7,50	+17,75	+16,00	82,84
25	26	10,1	+11,2	+12,4	27	4,75	+20,25	+17,25	81,77
26	26	8,9	+19,1	+19,4	27	3,25	+23,50	+19,25	82,30

Folglich Höhe der obersten Terrasse des Thurms auf der Altenburg über der Wohnung des Thürmers auf dem Jesuiter-Thurm . . = 82, 14 franzöf. Toisf.
Der Bamberger Fuß ist . . = 280,4865 Millimeter.

Bamberg ist die Geburtsstadt des berühmten Mathematikers und Jesuiten *Christoph Clavius*, vorzüglich bekannt durch seine Arbeiten über die Verbesserung des Julianischen, und Einführung des Gregorianischen Kalenders, und durch seine litterarischen Fehden mit *Joseph Scaliger*, *Michael Mößling*, und *Georg von Wartenberg*. Unsere Absicht ist nicht seine Biographie hier zu geben, diese findet man ziemlich vollständig bey *Jöcher*, *Freher*, *Possevini*, und vorzüglich bey *Ribadeneira*, *Alegambe* und *Sotwell Bibliotheca scriptorum societatis Jesu etc.* . . Romae 1676 fol. p. 139. Wir führen nur noch einige Züge zu seiner Biographie an, welche wir in seiner Vaterstadt gesammelt haben, und welche in den bisher in Druck erschienenen Nachrichten

von

von ihm, theils gar nicht, theils irrig vorkommen.

Clavius Familien-Name war *Schlüssel*, welchen er nach der Sitte seiner Zeit ins Lateinische übersetzte, und sich *Clavius* nannte. Sein Geburtsjahr wird verschieden angegeben. Einige setzen es auf das Jahr 1533 andere auf 1537, allein er war im J. 1538 geboren, und starb zu Rom den 6 Febr. 1612. Auch die tragische Todesart, welche einige von ihm erzählen, daß er nämlich von einem Stiere getödtet worden sey, da er die sieben Kirchen in Rom besuchte, ist falsch und grundlos. Die Nachricht mag von einem mißverstandenen Gedichte herrühren, welches auf *Clavius* nach seinem Tode verfertigt ward, und in welchem der allegorische Ausdruck vorkommt: "*Die Sonne gieng im Stier und ward verdunkelt.*" Bewährte Geschichtschreiber, und das ihm errichtete Denkmal sagen nichts von dieser Todesart. *Clavius* schrieb noch den 1. Jan. 1612 einen Brief an den Fürst-Bischof von Bamberg *Johann Gottfried*, welcher dem vierten Theile der in fünf Folio-Bänden gesammelten, und in Mainz 1612 von seinem Ordensbruder *Ziegler* besorgten Ausgabe seiner Werke vorgedruckt ist, in welchem er sagt, daß ihn sein hohes Alter (75 Jahre) an das Bett heste, (*ingravesceus senectus lecto me affixum detinet*) und schon am 6. Febr. war er eine Leiche. Wie konnte also der schwache bettlägerige Greis *Clavius* den Besuch der sieben Kirchen in Rom machen? Im Collegio romano zu Rom wurde nach seinem Tode seine Büste von Alabastrer aufgestellt, und in seinem Vaterlande liefs ihm der weise Fürst *Johann Gottfried* von

von *Afchhausen* ein von Messing gegossenes Denkmal mit folgender Aufschrift in der ehemaligen St. Martinskirche zu Bamberg errichten :

Deo Trino et Uni, Divisque coelitibus.

*Honori Memoriae R. P. CHRISTOPHORI
CLAVII, Bambergens. Mathematicorum
Scriptorum Principis.*

*In theatro orbis urbe Roma annis amplius XIV publice
docuit. De toto orbe terrarum detegendo Hispaniae
Regibus sciscitantibus respondit. *) Gregorio XIII in
reducendo Faistorum calculo adlaboravit, et ab au-
ctore temporum anno reparatae salutis MDCXII
ad regnum temporibus orbem
evocatus.*

*Joannes Godefridus, Bamberg. et Wirceburg.
Episcopus orientalis Franciae Dux hoc in solo pa-
trio monumentum collocavit.*

P. concives praeceuntem imitamini, aemulamini.

Da die alte St. Martinskirche im Jahre 1805 ra-
stirt, und die Pfarrey in die ehemalige Universitäts-
kirche verlegt wurde, ward dies *Clavius'sche* Monu-
ment abgenommen, und in das Collegium der Phi-
losophie geschafft, von da es Herr Professor *Rüdinger*
in das physicalische Cabinet bringen liefs, wo wir
solches gesehen, und obige Abschrift genommen ha-
ben.

Auf

*) Bezieht sich auf den Briefwechsel, in welchem *Clavius*
mit dem König von Spanien *Philipp II* stand, und die
Entdeckung unbekannter Weltgegenden zum Gegenstand
hatte.

Auf der öffentlichen Bibliothek zu Bamberg befinden sich ein paar chinesische Handschriften, von welchen wenigstens die eine die Aufmerksamkeit der Astronomen verdient. Der Titel ist: Sién vén tã tsching, id est: *Coeli scientiae magnum opus, seu Almagestum*. Zwölf Bändchen. Der Verfasser heisst Poang lô Gän. Es soll ein altes astronomisches Werk der Chinesen seyn, noch ehe die Jesuiten nach China kamen. Es kann vielleicht alte chinesische Beobachtungen enthalten. Das zweyte Werk führt den Titel: Tsong tsching liê Schu, id est: *Curfus dierum, seu Calendarii Liber*. Soll aber nur ein von Jesuiten aus dem *Euclid*, *Clavius* und andern Mathematikern zusammengetragenes Werk seyn. Wir verdanken diese Notizen den gefälligen und gelehrten Herren Bibliothecaren und Custoden Frey und Schmötzer in Bamberg.

XXXVI.

Stern - Verzeichnifs

vom Herrn Profeffor Harding.

Nachstehende Sternbestimmungen wurden zum Behuf meiner Sternkarten gemacht. Meistentheils waren es Differential - Beobachtungen am Göttinger Mauer-Quadranten, aus denen der Ort des Sternes hergeleitet wurde. Da sich diese Sterne in keinem andern Catalog finden, so wird, wie ich mir schmeichle, deren Bekanntmachung den Astronomen angenehm seyn. Die Reduction der beobachteten scheinbaren Oerter auf mittlere verdanke ich der Gefälligkeit des Hrn. Prof. Gerling. Späterhin hoffe ich noch mehr Beyträge dieser Art liefern zu können.

Gr.	R. 1800			Variat. ann.	Decl. 1800			Variatio ann.
				+				
6	80°	10'	2,"3	51,"88	+16°	53'	8,"4	+ 3,"42
6	86	3	29,9	47,93	+ 5	49	10,0	+ 1,38
7	93	35	18,5	46,21	+ 0	54	47,7	— 1,25
7	94	53	34,8	52,01	+17	3	53,4	— 1,71
7	96	3	32,0	52,11	+17	21	9,6	— 2,11
7	96	8	34,2	54,44	+23	14	49,7	— 2,14
7	97	7	52,7	50,53	+13	8	1,4	— 2,48
7	98	16	50,4	55,07	+24	51	52,5	— 2,88
7	99	15	19,9	54,44	+23	24	33,5	— 3,22
	100	49	56,6	48,28	+ 6	55	12,3	— 3,76
	102	53	1,4	50,53	+13	22	8,0	— 4,46
7	103	46	19,6	54,74	+24	27	52,8	— 4,76

Gr.	R. 1800			Variat. ann.	Decl. 1800			Variatio annua
				+				
7	104°	46'	49,"3	55,"63	+26°	43'	18,"6	- 5, 10
7	105	2	4, 3	55, 69	+26	53	8, 0	- 5, 19
	107	10	3, 4	51, 56	+16	30	1, 9	- 5, 91
7	108	55	54, 5	53, 75	+22	31	54, 2	- 6, 49
7	109	31	27, 8	49, 90	+11	58	52, 3	- 6, 69
	110	1	3, 2	49, 75	+11	36	50, 3	- 6, 85
7	110	12	38, 8	53, 98	+23	18	7, 7	- 6, 91
7	111	15	44, 3	47, 33	+ 4	24	44, 3	- 7, 26
7	111	25	56, 5	53, 71	+22	45	42, 1	- 7, 31
	113	11	15, 2	47, 64	+ 5	24	40, 5	- 7, 88
6	115	4	13, 8	47, 09	+ 3	46	39, 2	- 8, 48
7	115	24	22, 0	47, 09	+ 3	46	56, 8	- 8, 59
7. 8	115	33	13, 5	47, 12	+ 3	53	23, 4	- 8, 63
7	117	21	31, 2	48, 87	+ 9	30	35	- 9, 20
6	120	11	17, 3	49, 50	+11	47	7, 6	-10, 06
7	122	48	8, 0	50, 97	+16	47	27, 5	-10, 84
6	128	29	12, 3	47, 54	+ 6	0	3, 6	-12, 45
6	130	27	27, 4	47, 52	+ 6	5	4, 7	-12, 98
7	133	42	46, 7	46, 70	+ 3	12	28, 5	-13, 83
6. 7	136	42	35, 3	46, 56	+ 2	45	39, 0	-14, 57
7	144	25	41, 1	47, 84	+ 9	29	38, 6	-16, 28
7	146	11	23, 5	46, 65	+ 3	53	27, 1	-16, 63
6	203	34	25, 8	42, 38	+23	42	54, 2	-18, 34
7	219	27	11, 3	41, 10	+20	39	4, 1	-15, 45
7	233	42	56, 6	38, 85	+23	34	35, 7	-11, 84
7	239	36	41, 2	41, 94	+12	54	16, 6	-10, 09
7	281	7	56, 6	52, 64	-18	57	21, 0	+ 3, 86
7	281	21	24, 4	50, 88	-14	16	19, 5	+ 3, 94
7	281	27	52, 0	52, 80	-19	23	28, 4	+ 3, 98
7	281	54	38, 2	52, 84	-19	31	56, 0	+ 4, 13
6	281	35	18, 4	54, 12	-22	46	41, 7	+ 4, 07
7	287	37	11, 1	49, 67	-11	11	34, 1	+ 6, 06
7	287	42	19, 5	53, 21	-21	0	1, 7	+ 6, 09
8	289	57	47, 0	48, 74	- 8	35	45, 8	+ 6, 83
7	290	56	24, 3	53, 14	-21	11	51, 9	+ 7, 15
7	292	52	19, 0	49, 64	-11	28	30, 4	+ 7, 78

Gr.	R. 1800			Variat. ann.	Decl. 1800			Variatio ann.	
				+					
7	293°	45'	16,"	46,"	53	- 1°	58'	45,"	8 + 8, 06
7	293	54	34, 7	51, 68	-17	33	11, 3	+ 8, 11	
7	294	2	38, 8	51, 67	-17	32	44, 9	+ 8, 15	
7.8	294	40	23, 0	49, 73	-11	54	0, 0	+ 8, 35	
7.8	294	4	8, 0	46, 49	- 1	51	5, 3	+ 8, 16	
6.7	295	8	30, 9	50, 25	-13	31	33, 3	+ 8, 50	
7.8	295	19	45	49, 70	-11	52	32, 0	+ 8, 56	
7	295	40	53, 0	49, 03	- 9	51	8, 6	+ 8, 67	
7	297	33	46, 0	49, 45	-11	19	44, 1	+ 9, 26	
7.8	299	41	38, 6	52, 21	-19	57	45, 5	+ 9, 91	
7.8	300	10	56, 2	49, 78	-12	39	29, 2	+10, 06	
7	300	46	32, 0	48, 99	-10	12	21, 8	+10, 24	
8	301	58	28, 0	49, 04	-10	29	22, 9	+10, 59	
	302	20	40, 2	46, 39	- 1	41	55, 0	+10, 71	
8	302	23	4, 8	46, 26	- 1	15	23, 0	+10, 72	
7	302	38	31, 2	49, 10	-10	45	40, 7	+10, 79	
8	303	45	21, 8	51, 30	-18	0	44, 9	+11, 12	
7	304	52	14, 3	50, 74	-16	26	1, 4	+11, 44	
8	304	59	18, 6	51, 15	-17	47	29, 0	+11, 47	
6	304	57	42, 7	50, 51	-15	42	44, 1	+11, 47	
7.8	305	22	29, 8	47, 58	- 5	55	4, 7	+11, 58	
7	305	41	38, 5	47, 86	- 6	53	31, 3	+11, 68	
7	306	31	53, 2	49, 87	-13	52	29, 5	+11, 91	
7	306	42	33, 3	46, 45	- 1	59	55, 0	+11, 96	
6.7	308	9	4, 3	49, 34	-12	20	50, 3	+12, 36	
7	308	29	57, 7	50, 54	-16	30	40, 3	+12, 46	
6.7	309	9	44, 5	46, 76	- 3	12	23, 3	+12, 64	
7	309	12	45, 2	50, 66	-17	4	37, 5	+12, 65	
7	309	14	13, 2	50, 70	-17	14	39, 8	+12, 66	
7	309	26	6, 3	47, 34	- 5	21	54, 0	+12, 71	
7.8	309	58	59, 2	50, 63	-17	9	3, 4	+12, 86	
7.8	310	15	57, 2	49, 19	-12	10	45, 2	+12, 93	
7	310	41	4, 4	47, 32	- 5	22	21, 6	+13, 04	
8	310	42	45, 6	48, 48	- 9	39	59, 6	+13, 05	
7	310	47	22, 9	49, 02	-11	40	15, 8	+13, 07	
	312	44	12, 9	46, 77	- 3	25	46, 3	+13, 58	

XXXVII. *Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt. 313*

	R. 1800			Variat. ann.	Decl. 1800			Variatio ann.
Gr.				+				
6. 7	313°	16'	34, 2	46, 68	— 3°	6'	9, 3	+13, 72
6	314	7	15, 7	47, 98	— 8	14	42, 4	+13, 93
7	314	19	52, 0	46, 61	— 2	50	51, 0	+13, 98
7	315	44	58, 8	47, 68	— 7	17	6, 7	+14, 33
	316	33	51, 0	46, 48	— 2	26	33, 6	+14, 53
7	317	11	48, 8	49, 50	— 14	51	11, 5	+14, 68
7	318	0	29, 8	46, 82	— 3	58	20, 6	+14, 87

XXXVII.

Untersuchung

über die größten nördlichen und südlichen
heliocentrischen Abstände der Planeten
von der Ecliptik.

I. *Marsbahn.*

Wiewohl die seit einem halben Jahrhundert in den Sommer- und Winter-Abständen der Erde vom Aequator beobachteten Differenzen die Vermuthung, daß vielleicht auch in den Planetenbahnen etwas ähnliches statt finde, nicht unwahrscheinlich machten, so fehlte es doch noch an bestimmten zu diesem Behuf unternommenen Rechnungen, die ein sicheres Resultat darüber zu liefern vermocht hätten. Die zeitherige Art, die Neigungen der Planetenbahnen zu bestimmen, wo aus einer ganzen Reihe von Beobachtungen, ohne Rücksicht auf nördliche und süd-

liche Breite, nur überhaupt ein mittleres Resultat gesucht wird, verbunden mit dem Umstand, daß nur eine sehr kleine Zahl von Beobachtungen zu einer Untersuchung, wie die vorliegende ist, wo die ganze Differenz wenige Secunden beträgt, gebraucht werden kann, erklärt es leicht, warum dieser Gegenstand zeither unerörtert blieb. Trotz hundertten von Planeten-Örtern, die ich in den letztern Jahren reducirte und berechnete, ließ ich es doch auch unberücksichtigt, eine eigenthümliche Untersuchung über die größten nördlichen und südlichen Breiten anzustellen, und wahrscheinlich würde dies noch länger der Fall gewesen seyn, hätte nicht die letzte Mars- Opposition im Julius 1813 meine Aufmerksamkeit bestimmter auf diesen Gegenstand hingerichtet. Zu Bestimmung des heliocentrischen Tafel-Fehlers war diese Opposition ganz besonders geeignet, da sie in der größten Erdnähe und bey größter südlicher Breite statt fand; vier Secunden im geocentrischen Orte ändern hier den heliocentrischen nur um eine Secunde, so daß also dieser aus den Beobachtungen mit besonderer Schärfe bestimmt werden konnte. Die Opposition wurde von dem Freyherrn v. Zach zu Marseille und von mir auf der hiesigen Sternwarte sehr vollständig beobachtet, und die Resultate unserer Beobachtungen stimmen dahin überein, daß die Correction der heliocentrischen Länge meiner Elemente unmerklich, dagegen die in meinen Tafeln angenommene Neigung um $6''$ vermindert werden müsse. Das darüber von dem Freyherrn v. Zach erhaltene Detail der Beobachtung und Berechnung lasse ich hier mit dessen eigenen Worten folgen:

Beob.

XXXVII. Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt. 315

*Beobachtungen des Planeten Mars zur Zeit seines
Gegenscheins 1813. Auf der Sternwarte de la
Capellette bey Marseille ange stellt.*

Die geraden Aufsteigungen dieses Planeten wurden an einem 2½ füssigen Passagen-Instrumente, die Abweichungen an einem zwölfzölligen *Reichenbach's*chen Repetitions-Kreise beobachtet; damit erhielten wir folgende Stellungen:

1813	Mittel Zeit à la Capellette	Beobachtete gerade Aufsteigung d. s. ♂	Beobacht. südl. schein- bare Abw. des ♂	Höhen Paral- laxe	Wahre südl. Abweich. des ♂
	U				
Julius 28	12 25 49	312 31 17,9	24 38 14,0	-21,2	24 37 52,8
29	12 20 39	312 14 58,8	24 43 52,0	-21,2	24 43 30,8
30	12 15 19	311 58 24,6	24 49 22,3	-21,2	24 49 1,1
Aug. 1	12 4 56,7	311 24 59,1	24 59 44,7	-21,3	24 59 23,4
2	11 59 53,6	311 8 9,2	25 4 23,2	-21,3	25 4 1,9
3	11 54 51,0	310 51 26,0	25 9 6,6	21,3	25 8 45,3
4	11 49 48,6	310 54 45,9	25 13 34,4	-21,3	25 13 13,1

Aus unsern Sonnen-Tafeln (Supplem. 1804) wurden für obige Zeiten nachstehende Elemente berechnet:

1813	Heliocentrische Länge der Erde + 25, "45 vom mitl. Aequi- noctio	Logarithm. der Dift. der Erde von der ☉	Schein- bare Schiefe der Eclipt.
Jul. 28	305° 24' 47,7	0.0065113	25° 27' 43,4
29	306 22 1,0	0.0064559	
30	307 19 14,8	0.0063980	
Aug. 1	309 13 44,7	0.0062748	
2	310 11 0,7	0.0062099	
3	311 8 17,3	0.0061431	
4	312 5 34,9	0.0060748	

Mit diesen Datis erhielten wir endlich folgende geo-
centrische Orte:

1813	Beobachtete geoc. Länge des ♂			Nut. und Aber.	Wahre beob. geocentr. Län- ge des ♂			wahre beob. geoc. Breite des ♂			Aber.
Jul. 28	308°	12'	28." 1	+ 12." 6 - 2." 1	308°	12'	38." 6	6°	38'	13." 9	0." 0
29	307	56	33." 8		307	56	44." 3	6	39	38." 9	
30	307	40	29." 0		307	40	39." 5	6	40	54." 4	
Aug. 1	307	8	16." 9		307	8	27." 4	6	42	48." 0	
2	306	52	13." 9		306	52	24." 4	6	43	15." 6	
3	306	36	16." 4		306	36	26." 9	6	43	50." 2	
4	306	20	26." 3		306	20	36." 8	6	44	12." 0	

Diese Beobachtungen verglichen wir nun ferner mit den von Hrn. v. *Lindenau* letzthin (1811) herausgegebenen Mars-Tafeln, und zwar auf die von ihm selbst *M. C.* XXII. Bd. S. 312 vorgeschlagene Art, indem man die beobachteten geocentrischen Orte des Planeten, mit Zuziehung der aus den Tafeln berechneten curtirten Distanz, in heliocentrische verwandelt; auf diese Art erhielten wir folgende heliocentrische Fehler der Tafeln:

1813	Beob. heliocentr. Länge des ♂	Berechnete helioc. Länge des ♂	Fehler in der Länge	Beob. helioc. Breite des ♂	Berechnete heliocentr. füdl. Br des ♂	Fehler in der Breite	Logar. der curt. Distanz des ♂ von d. ☉ aus den Tafeln
Jul. 28	308° 10' 21.9	308° 10' 25.3	- 3.4	0° 48' 36.5	0° 48' 41.6	- 5.1	o. 1439998
29	308° 47' 42.3	308° 47' 43.7	- 1.4	1° 48' 51.1	1° 48' 57.2	- 6.1	o. 1438207
30	307° 25' 2.9	307° 25' 4.1	- 1.2	1° 49' 5.3	1° 49' 11.0	- 5.7	o. 1436444
Aug. 1	308° 39' 50.1	308° 39' 50.6	- 0.5	1° 49' 30.4	1° 49' 30.2	- 0.2	o. 1433061
2	309° 17' 15.9	309° 17' 16.3	- 0.4	1° 49' 39.2	1° 49' 47.7	- 8.5	o. 1431426
3	309° 54' 43.2	309° 54' 43.6	- 0.4	1° 49' 51.9	1° 49' 58.3	- 6.4	o. 1419829
4	310° 32' 11.9	310° 32' 12.8	- 0.9	1° 50' 3.5	1° 50' 8.1	- 4.6	o. 1428278
Mittlerer Fehler in der Länge			- 1." 17	in der Breite			- 6." 17

Bringt man diese mittleren Fehler der Tafeln an die aus diesen Tafeln berechneten heliocentrischen Längen und Breiten für den 30. Julius und den 1. August an, zwischen welchen Tagen der Gegenschein eintritt, so hat man:

1813

XXXVII. *Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt.* 317

1813	Mittl. Zeit à la Capelle	Helioc. Länge der Erde	Helioc. Länge des Mars
Jul. 30	12 ^U 15' 1."9	307° 19' 14."8	307° 25' 2."9
Aug. 1	12 4 56, 7	309 13 44, 7	308 39 49, 4

Hieraus ergibt sich ferner, daß der Gegenschein des Mars eingetreten war

den 30. Jul. 1813 um 19^U 14' 11."3 Mittl. Z. à la Capell.

in der heliocentr. Länge = 307° 35' 58."2

in südl. helioc. Breite = 1 49' 8, 5.

Es ist ganz gut, daß man den heliocentrifchen Fehler der Planeten-Tafeln ausfindig mache, um solche hiernach verbessern zu können; allein dies ist nicht genug, man muß auch ihren geocentrifchen Fehler kennen, denn der geocentrifche Ort ist es doch zuletzt, den wir bedürfen, wenn wir von Planeten-Tafeln einen *nützlichen* Gebrauch machen, und z. B. eine Zeitbestimmung, eine Breite, oder eine geographische Länge aus dessen Abständen vom Monde berechnen wollen. Der geocentrifche Fehler der *v. Lindenau'schen* Mars-Tafeln stehet demnach bey obigen Beobachtungen also:

1813	Berechnete geocentr. Länge des Mars	Berechn. südl. geocentr. Breite des Mars	Geocentr. Fehler in	
			Länge	Breite
Jul. 28	308° 12' 51."0	6° 38' 41."3	— 12."4	— 27."3
29	307 56 49, 8	6 40 2, 6	— 5, 5	— 23, 5
30	307 40 44, 3	6 41 22, 1	— 4, 8	— 27, 6
Aug. 1	307 8 30, 0	6 43 6, 6	— 2, 6	— 18, 5
2	306 52 24, 5	6 43 49, 4	— 0, 1	— 33, 7
3	306 36 27, 9	6 44 14, 3	— 1, 0	— 24, 1
4	306 20 40, 5	6 44 28, 4	— 3, 7	— 16, 4
Mittlerer geocentr. Fehler . . .			— 4."3	— 24."4

* * *

Druckfehler in den v. Lindenau'schen Mars-Tafeln:

Pag. XXVI Arg. Tab. XXI. A. VI — A. III

corrige A. VI — A. IV.

Pag. XXVII Arg. Tab. XXIII. 2 A. XII — A. V

corrige 2 A. XII — 3. A. V.

Die Reſultate meiner hieſigen Beobachtung waren nachſtehende:

Jahr und Tag	Mittl. Zeit Seeberg	AR. app. ♂ i. R.	Decl. appar. ♂ Unt. R.
1813 Jul. 16	12 ^h 35' 8."1	313° 3' 20."7	24° 26' 17."7
29	12 20 7. 0	312 14 51. 6	24 43 58. 3
30	12 15 4. 7	311 58 12. 9	24 49 28. 3
Aug. 3	11 54 54. 1	310 51 17. 7	25 9 19. 3
11	11 15 0. 7	308 44 25. 5	25 36 33. 8
12	11 10 7. 7	308 30 6. 1	25 38 40. 1
Sept. 1	9 41 41. 4	306 2 40. 5	25 17 37. 2
3	9 34 1. 9	306 5 45. 3	25 9 32. 7
9	9 12 24. 3	306 35 18. 7	24 39 35. 3
10	9 9 0. 0	306 43 4. 8	24 33 54. 7

Hieraus:

Beobachtete *)		Berechnete		Correction	
heliocentr. Länge	heliocentr. füdl. Br.	heliocentr. Länge	heliocentr. füdl. Br.	in der Läng.	in der Breit.
304° 55' 17."7	1° 48' 10."3	304° 55' 19."4	1° 48' 13."7	-1."7	-3."4
306 47 6. 9	48 50. 9	306 47 10. 3	48 57. 4	-3. 4	-6. 5
307 24 28. 4	49 3. 4	307 24 30. 6	49 11. 1	-2. 2	-7. 7
309 54 8. 0	49 52. 2	309 54 8. 6	49 58. 8	-0. 6	-6. 6
314 54 46. 9	50 50. 6	314 54 46. 5	50 56. 3	+0. 4	-5. 7
315 32 27. 7	50 54. 7	315 32 27. 1	50 60. 0	+0. 6	-5. 3
328 9 40. 3	49 19. 6	328 9 43. 5	49 23. 6	-3. 2	-4. 0
329 25 37. 5	48 52. 4	329 25 41. 4	48 56. 0	-3. 9	-3. 6
333 13 39. 7	47 10. 5	333 13 40. 1	47 14. 7	-0. 4	-4. 2
333 51 39. 0	46 51. 1	333 51 39. 5	46 54. 9	-0. 1	-3. 8

Aus den ſechs erſten Beobachtungen folgt:

Correct. der helioc. Länge — 1."15

— — — Breite — 5. 60

und damit ferner

♂ ♂ ⊙ 1813. 30. Jul. 19^h 34' 27."9 M. Z. Seeberg.

Wahre beob. ♂ Länge 307° 35' 55."0

Heliocentr. füdl. Breite 1 49 9. 1

Bey

*) Bey allen Mars-Oertern liegen meine im Jahre 1811 herausgegebenen *Tabulae Martis* zum Grunde. Die Sonnen-Oerter ſind meißtentheils aus gleichzeitigen Beobachtungen hergeleitet. v. L.

Bey der Sorgfalt, mit der ich bey Bestimmung der Elemente der Marsbahn verfahren zu seyn mir bewußt war, schien mir eine wenn auch nur 5 bis 6" betragende Correction der Neigung doch zu groß, um nicht eine weitere Untersuchung zu erfordern, und ich suchte daher alle Beobachtungen auf, die hierüber zuverlässige Resultate zu liefern vermochten. Leider waren diese nicht in so reicher Anzahl vorhanden, als ich wohl gewünscht hätte, und ich hatte vollkommen Ursache, auf die schon einmal anderwärts gemachte Klage zurück zu kommen, daß practische Astronomen nicht immer darauf aufmerksam waren, die Planeten in wichtigen Puncten ihrer Bahnen zu beobachten; und ich füge in dieser Hinsicht am Schluß dieses Aufsatzes die Angabe der Epochen bey, zu denen in den Jahren 1814 und 15 Mars vorzüglich beobachtet zu werden verdient. Vorzüglich war der Mangel an Beobachtungen in Hinsicht der größten südlichen Marsbreite sehr fühlbar, indem ich zu deren Bestimmung nur zwey Reihen von Beobachtungen aus den Jahren 1751 und 1766 zu benutzen vermochte. Dankbar werde ich es erkennen, wenn Astronomen mir anderweite, zu diesem Behuf brauchbare, zuverlässige Beobachtungen nachweisen oder mittheilen wollen.

Die erhaltenen Resultate für die größten südlichen Breiten waren folgende:

I. 1751.

I. 1751. Bradley.

Jahr und Tag	M. Z. zu Greenwich	AR. appar. ♂	Decl. appar. ♂
1751 Sept. 13	12 ^h 8' 27." 1	354° 43' 12." 6	— 8° 22' 34." 1
14	12 3 23, 8	354 26 20, 5	8 26 40, 3
16	11 53 17, 1	353 52 29, 4	8 34 21, 5
19	11 38 10, 9	353 2 45, 3	8 44 20, 1
21	11 28 11, 1	352 39 39, 8	8 49 44, 8

Beob. hel. Länge	berech. hel. Länge	Corr. tab.	beob. hel. Breite	berechn. hel. Br.	Corr. tab.
351 3 33,6	351 3 31,6	+ 2,0	— 1 32 42,0	— 1 32 46,0	— 4,0
351 41 7,8	351 41 9,8	— 2,0	32 58,7	32 65,0	— 6,3
352 56 8,3	352 56 11,2	— 2,9	30 37,8	30 44,1	— 6,3
354 48 33,9	354 48 35,7	— 1,8	28 29,7	28 35,3	— 5,6
356 3 20,3	356 3 22,4	— 2,1	27 3,1	27 6,8	— 3,7

II. 1766. Maskelyne.

Jahr und Tag	Mittl. Zeit in Greenwich	AR. appar. ♂	Decl. appar. ♂
1766 Aug. 10	12 ^h 16' 33." 8	326° 6' 33." 6	— 20° 53' 44." 6
11	12 21 35, 3	325 50 51, 3	20 59 2, 3
12	12 16 36, 1	325 34 59, 8	21 4 12, 7
13	12 11 36, 3	325 18 59, 8	21 9 10, 2

Beob. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beob. hel. Breite	berechn. hel. Breite	Corr. tab.
319 4 27,4	319 4 26,1	+1,3	— 1 51 2,0	— 1 51 4,7	— 2,7
319 42 18,2	319 42 16,1	+2,1	50 59,2	50 62,4	— 3,2
320 20 8,0	320 20 4,5	+3,5	50 55,2	50 59,1	— 4,2
320 58 0,1	320 57 57,0	+3,1	50 53,2	50 55,6	— 2,4

Wegen Ungewissheit des Collimations-Fehlers lege ich auf diese vier Beobachtungen gerade keinen sehr grossen Werth. Das Resultat, welches ich unmittelbar aus den gleichzeitig beobachteten Sonnen-Zenith-Distanzen erhielt, war folgendes: Sechs am zweyten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebenten August zu Greenwich beobachtete Sonnen-Län-

Längen gaben Correction der Sonnen-Tafeln — 7,"1, und damit Correction der Zenith-Distanzen für diese Tage — 4,"3, — 3,"9, — 3,"1, — 3,"1, — 3,"8, — 5,"0, im Mittel — 3,"9. Mit diesem Collimationsfehler werden die eben angegebenen Resultate erhalten. Aus spätern Beobachtungen aber, wo die Sonne dieselbe Zenith-Distanz, wie hier Mars hatte, folgt der Collimations-Fehler + 6", und damit alle Declinationen um 10" gröfser. Wir werden zu einer andern Zeit diesen Gegenstand noch einmal berühren, da es beynahe scheint, als hänge die Gröfse des Collimations-Fehlers mit von der Temperatur ab.

Zwey Beobachtungen von *Fixmiller* (*Decennium astronom.* p. 106), geben für 1766 dasselbe, wie die vorherigen *Maskelyu'schen* Beobachtungen:

Jahr und Tag		Mittl. Zeit in Krems	AR. appar. ♂	Declinat. app. ♂
1766	12 Aug.	12 ^h 16' 47"	325° 35' 51,"0	— 21° 3' 35,"3
	14 —	12 5 42	325 3 36,5	21 13 24,6

Beob. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beobacht. hel. Breite	berechn. hel. Breite	Corr. tab.
320 18 44,9	320 18 40,7	+ 4,2	— 1 50 55,2	— 1 50 59,4	— 4,2
321 34 22,0	321 34 21,5	+ 0,5	1 50 50,1	1 50 53,3	— 3,2

Fünf Beobachtungen von *Bliss*, 16. September, 25. Sept., 7. Oct., 24. Oct., 27. Oct. 1764, die ich anfangs mit zu diesem Behuf in Rechnung nahm, mußten verworfen werden, da die daraus erhaltenen Resultate allzu discrepant unter einander waren. Die daraus folgenden Correctionen der heliocentrischen Länge variirten zwischen — 10" und + 19", die der Breite von — 11" bis + 8", und waren

ren demnach zu einer Untersuchung, wie die vorliegende ist, ganz untauglich. Ueberhaupt kann ich, durch mehrmalige Erfahrung belehrt, nicht rathen, die Beobachtungen von *Blifs* zu feinen astronomischen Bestimmungen zu brauchen, da es vorzüglich in Hinsicht der Declinationen schwer, ja oft unmöglich ist, mit Sicherheit die wahre Zenith-Distanz zu erhalten. Da *Blifs* nur sehr wenige Stern-Zenith-Distanzen beobachtete, und die Annahme desselben Collimations-Fehlers für längere Perioden durchaus unzulässig ist, so bleibt kein anderes Mittel übrig, als sich der Sonne zu diesem Behufe zu bedienen. Allein wie unbefriedigend die daraus erhaltenen Resultate sind, mag folgende Übersicht zeigen:

1764	Beob. Zenith-Dist. der Sonne	Collim. Fehler	Barom.	Therm.
Sept. 14	$\begin{cases} 48^{\circ} 34' 47,0 & \text{U.R.} \\ 48 & 2 & 59,0 & \text{O.R.} \end{cases}$	$- 8,1$	29,40	58
Sept. 15	$\begin{cases} 48 & 25 & 51,0 & \text{O.R.} \\ 48 & 57 & 44,0 & \text{U.R.} \end{cases}$	$+ 8,1$	29,72	59
Sept. 17	$\begin{cases} 49 & 12 & 25,0 & \text{O.R.} \\ 49 & 44 & 26,0 & \text{U.R.} \end{cases}$	$- 0,6$	29,82	55
Sept. 25	$\begin{cases} 52 & 51 & 32,0 & \text{U.R.} \\ 52 & 19 & 30,0 & \text{O.R.} \end{cases}$	$- 2,8$	30,44	48
Octob. 5	$\begin{cases} 56 & 12 & 42,0 & \text{O.R.} \\ 56 & 44 & 51,0 & \text{U.R.} \end{cases}$	$- 5,8$	30,10	49
Octob. 6	$\begin{cases} 56 & 35 & 48,0 & \text{O.R.} \\ 57 & 7 & 54,0 & \text{U.R.} \end{cases}$	$- 5,0$	30,06	54
Octob. 14	$\begin{cases} 60 & 9 & 17,7 & \text{O.R.} \\ 59 & 37 & 9,0 & \text{U.R.} \end{cases}$	$- 0,1$	29,86	47

XXXVII. *Helio. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt.* 323

	1764	Beob. Zenith-Dist. der Sonne	Collim. Fehler	Barom.	Therm.
Octob. 15	$\begin{cases} 59^{\circ} 59' 14,0 \\ 60 \quad 31 \quad 28,0 \end{cases}$	$\begin{cases} \text{O.R.} \\ \text{U.R.} \end{cases}$	$+ 4,8$	30,14	50
Octob. 26	$\begin{cases} 63 \quad 54 \quad 7,0 \\ 64 \quad 26 \quad 26,0 \end{cases}$	$\begin{cases} \text{O.R.} \\ \text{U.R.} \end{cases}$	$- 6,9$	29,58	40,5
Octob. 28	$\begin{cases} 65 \quad 6 \quad 45,0 \\ 64 \quad 34 \quad 26,0 \end{cases}$	$\begin{cases} \text{U.R.} \\ \text{O.R.} \end{cases}$	$- 2,2$	29,89	40

Die große Differenz der Resultate aus den Beobachtungen vom 14. und 15. Sept. ergibt sich sogleich aus der bloßen Ansicht der beobachteten Zenith-Distanzen, indem deren Differenz (corrigirt wegen Refraction) $= 22' 56,4$, während die 24stündige Aenderung der Sonnen-Declination $= 23' 11,6$ ist; eben dies ist der Fall für den 14. und 15. October: beobachtete Differenz der Zenith-Dist. $= 22' 9''$, wahre Differenz $= 22' 14''$. Eine Bemerkung über die mindere Zuverlässigkeit der Beobachtungen von *Bliss* scheint mir um so nothwendiger, da man als einem Nachfolger von *Bradley*, und bey der Vereinigung der Beobachtungen beyder in einem Bande, auch wohl beyden gleiche Schärfe zuzutrauen veranlaßt seyn könnte, was denn aber durchaus der Fall nicht ist.

Ich gehe nach dieser Abschweifung auf den eigentlichen Gegenstand dieses Aufsatzes wieder zurück.

Die Beobachtungen zu Bestimmung der größten nördlichen Marsbreiten sind zahlreicher, als die für die südliche Hälfte der Bahn. Die hierfür erhaltenen Resultate waren folgende:

I. 1758

I. 1758. Bradley.

Jahr und Tag	Mittl. Zeit Greenwich	AR. appar. ♂	Declin. appar. ♂
1758. Febr. 9	11 ^h 41' 53."8	135° 27' 19."5	+21° 39' 21."3
10	11 36 24.1	135 3 51.6	21 45 9.7
11	11 30 56.3	134 40 45.6	21 50 37.5
13	11 20 4.8	133 55 27.6	22 0 47.7
18	10 53 27.7	132 11 2.3	22 21 49.4
25	10 17 56.4	130 10 43.5	22 39 58.7
März 2	9 54 3.3	129 7 9.9	22 45 14.1
8	9 27 8.2	128 17 9.5	22 43 53.0
13	9 6 12.3	127 57 58.8	22 36 53.3
27	8 14 14.2	128 44 14.8	21 54 5.5
30	8 4 14.0	129 11 12.3	21 41 5.5
31	8 0 58.7	129 21 22.6	21 36 28.8
April 5	7 45 14.2	130 20 19.5	21 11 29.4
8	7 36 12.7	131 1 59.2	20 54 53.7

Beobacht. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beobacht. hel. Breite	berechn. hel. Breite	Corr. tab.
137 21 45.5	137 21 45.3	+ 0.2	+1 51 3.6	+1 51 5.8	- 2.2
137 48 3.1	137 48 1.3	+ 1.8	51 4.3	51 6.0	- 1.7
138 14 20.4	138 14 17.8	+ 2.6	51 8.3	51 5.5	+ 2.8
139 6 48.8	139 6 47.7	+ 1.1	51 2.1	51 3.9	- 1.8
141 17 58.6	141 17 55.4	+ 3.2	50 52.0	50 51.3	+ 0.7
144 21 11.7	144 21 10.8	+ 0.9	50 21.4	50 21.2	+ 0.2
146 31 58.4	146 31 59.5	- 1.1	49 50.2	49 47.0	+ 3.2
149 8 49.2	149 8 51.2	- 2.0	48 54.7	48 54.4	+ 0.3
151 19 36.4	151 19 31.9	+ 4.5	47 59.2	47 58.8	+ 0.4
157 25 40.6	157 25 41.1	- 0.5	44 35.0	44 35.2	- 0.2
158 44 15.8	158 44 15.4	+ 0.4	43 42.9	43 42.4	+ 0.5
159 10 29.1	159 10 25.7	+ 3.4	43 24.7	43 23.8	+ 0.9
161 21 30.1	161 21 28.2	+ 1.9	41 48.1	41 46.6	+ 1.5
162 40 12.6	162 40 11.6	+ 1.0	40 44.3	40 43.6	+ 0.7

II. 1759. Bradley.

Jahr und Tag	Mittl. Zeit Greenw.	AR. appar. ♂	Decl. appar. ♂
1759. Dec. 10	17 ^h 53' 52."1	168° 5' 59."6	+ 7° 41' 16."7
15	17 41 35.7	169 57 5.1	7 1 17.6
17	17 36 32.6	170 39 22.5	6 46 10.4

Beob-

XXXVII. *Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt.* 325

Beobacht. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beob. hel. Breite	ber. hel. Breite	Corr. tab.
129 33 52,0	129 33 55,4	- 3,4	+1 49 59,5	+ 49 59,0	+ 0,5
131 46 29,9	131 46 32,6	- 2,7	50 28,4	50 30,0	- 1,6
132 39 27,4	132 39 30,0	- 2,6	50 38,6	50 38,9	- 0,3

III. 1761. *Bradley.*

Jahr und Tag	Mittl. Zeit Greenw.	AR. appar. ♂	Declin. appar. ♂
1761 Nov. 18	19 ^u 39 10,6	173° 19' 24,6	+ 4° 44' 4,0
Dec. 3	19 10 29,0	180 54 56,4	+ 1 35 16,5
Dec. 23	18 29 38,4	190 23 22,5	- 2 18 52,9

Beob. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beob. hel. Breite	berechn. hel. Breite	Corr. tab.
139 26 9,7	139 26 12,5	- 2,8	+1 51 2,7	+1 51 3,3	- 0,6
145 54 1,0	145 53 58,0	+ 3,0	50 2,0	49 58,6	+ 3,4
154 37 43,4	154 37 39,2	+ 4,2	46 18,1	46 17,9	+ 0,2

IV. 1790. *v. Zach.*

(*Berliner Jahrbuch 1794 pag. 189.*)

Jahr und Tag	Mittl. Zeit Seeberg	AR. appar. ♂	Declin. appar. ♂
1790 März 2	10 ^u 20' 2,1	138° 56' 5,7	+20° 16' 45,5
6	10 1 15,6	137 55 46,5	20 25 56,9
9	9 58 18,5	137 18 28,8	20 29 44,5
20	9 9 55,6	136 1 12,8	20 25 15,8
21	9 5 50,0	135 58 50,7	20 23 25,8
22	9 1 47,6	135 57 13,0	20 21 23,5

Beob. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beob. hel. Breite	berechn. hel. Breite	Corr. tab.
151 4 23,1	151 4 28,1	- 5,0	+1 48 13,1	+1 48 11,6	+ 1,5
152 48 52,3	152 48 57,5	- 5,2	47 22,8	47 22,0	+ 0,8
154 7 36,5	154 7 33,1	+ 3,4	46 38,8	46 41,6	- 2,8
158 55 8,6	158 55 6,8	+ 1,8	43 42,2	43 42,7	- 0,5
159 21 20,4	159 21 17,4	+ 3,0	43 26,2	43 25,4	+ 0,8
159 47 29,3	159 47 27,4	+ 1,9	43 4,8	43 7,4	- 2,6

V. 1805.

V. 1805. a. Bouvard.

Jahr und Tag			Mittl. Zeit Paris			AR. appar. ♂			Decl. appar. ♂		
1805	Jan.	18	13 ^u	16'	30,9	137°	6'	39,5	+21°	2'	38,1
		23	12	49	14,7	135	12	11,7	21	40	29,4
	Febr.	8	11	20	34,2	128	44	40,5	23	19	29,2
		10	11	9	47,5	128	0	48,5	23	27	59,7
		23	10	3	39,8	124	14	59,1	23	58	2,2
	März	1	9	36	2,6	123	14	23,0	23	58	37,0
		3	9	27	17,1	123	0	54,9	23	57	7,5
		5	9	18	45,7	122	50	59,4	23	59	50,2
		8	9	6	31,8	122	41	55,8	23	50	8,5
		9	9	2	20,4	122	40	32,5	23	48	11,3
		11	8	54	26,6	122	40	4,2	23	43	54,6
		12	8	50	34,4	122	40	59,4	23	41	35,1
		17	8	31	57,8	122	56	46,5	23	27	25,6
		22	8	14	30,5	123	29	54,5	23	10	10,1
		23	8	11	8,3	123	38	19,5	23	6	9,4
		24	8	7	48,9	123	47	31,8	23	2	8,3
		26	8	1	17,8	124	7	45,9	22	53	46,4

Beob. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beobacht. hel. Breite	berechn. hel. Breite	Corr. tab.
124 34 15,4	124 34 12,5	+ 2,9	+1° 48' 2,3	+1° 48' 3,3	- 1,0
126 47 40,9	126 47 38,7	+ 2,2	48 57,2	48 59,0	- 1,8
133 51 48,1	133 51 48,0	+ 0,1	50 46,7	50 48,9	- 2,2
134 44 37,7	134 44 34,1	+ 3,6	50 56,6	50 55,5	+ 1,1
140 26 27,1	140 26 28,4	- 1,3	50 59,8	50 60,0	- 0,2
143 3 45,2	143 3 48,3	- 3,1	50 41,7	50 40,5	+ 1,2
143 56 7,9	143 56 10,8	- 2,9	50 30,8	50 30,7	+ 0,1
144 48 35,0	144 48 34,3	+ 0,7	50 19,6	50 19,5	+ 0,1
146 7 6,8	146 7 10,4	- 3,6	49 59,6	49 60,0	- 0,4
146 33 15,0	146 33 13,9	+ 1,1	49 52,5	49 52,3	+ 0,2
147 25 32,4	147 25 34,2	- 1,8	49 35,4	49 36,6	- 1,2
147 51 40,0	147 51 43,5	- 3,5	49 27,5	49 28,3	- 0,8
150 2 28,5	150 2 30,1	- 1,6	48 37,4	48 40,4	- 3,0
152 13 13,6	152 13 15,1	- 1,5	47 47,6	47 44,1	+ 3,5
152 39 19,2	152 39 21,8	- 2,6	47 29,6	47 30,3	- 0,7
153 5 29,3	153 5 31,5	- 2,2	47 16,6	47 17,3	- 0,7
153 57 48,8	153 57 50,0	- 1,2	46 50,6	46 50,1	+ 0,5

*) Druckfehler in der *Conn. des Temps* 1809, p. 311 muß
statt 25° 46' 43" gelesen werden 25° 47' 43".

1805.

XXXVII. *Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt.* 327

1805. b. v. Lindenau.

Jahr und Tag	Mittl. Zeit Seeberg			AR. appar. ♂			Declin. appar. ♂		
1805 Febr.	15	10 ^u	43' 33."6	126°	20'	34."4	+23°	44'	19."6
	18	10	28 15.9	125	27	57.1	23	51	18.8
	19	10	23 15.5	125	11	46.4	23	53	2.5
	20	10	18 19.2	124	56	38.4	23	54	40.7
	21	10	13 24.8	124	41	59.6	23	55	59.7
März	12	8	50 39.7	122	40	56.4	23	41	42.9
	13	8	46 50.5	122	42	3.4	23	39	5.8
	14	8	43 4.3	122	45	3.4	23	36	29.3
	16	8	35 40.2	122	52	0.1	23	30	34.1
	17	8	32 2.5	122	56	34.7	23	27	49.4
	18	8	28 28.3	123	2	0.4	23	24	16.2
	19	8	24 55.7	123	7	51.3	23	21	1.1

Beob. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beob. hel. Breite	berechn. hel. Breite	Corr. tab.
136° 55' 42.6"	136° 55' 39.3"	+ 3.3"	+1° 51' 2.0"	+1° 51' 4.9"	- 2.9"
138 14 37.1	138 14 35.1	+ 2.0	51 3.8	51 5.9	- 2.1
138 40 50.9	138 40 48.5	+ 2.4	51 1.4	51 3.4	- 2.0
139 7 8.7	139 7 5.5	+ 3.2	51 2.2	51 5.0	- 2.8
139 33 21.8	139 33 24.6	- 2.8	51 1.6	51 2.4	- 0.8
147 51 4.4	147 51 6.9	- 2.5	49 28.6	49 28.1	+ 0.5
148 17 15.6	148 17 13.5	+ 2.1	49 18.3	49 19.6	- 1.3
148 43 26.0	148 43 25.0	+ 1.0	49 10.0	49 10.1	- 0.1
149 35 42.3	149 35 42.7	- 0.4	48 51.7	48 50.6	+ 1.1
150 1 48.6	150 1 52.0	- 3.4	48 45.3	48 40.5	+ 4.8
150 28 4.0	150 28 1.7	+ 2.3	48 28.7	48 29.5	- 0.8
150 54 10.8	150 54 10.0	+ 0.8	48 19.2	48 18.7	+ 0.5

VI. 1807. Bouvard

Jahr und Tag	Mittl. Zeit Paris			AR. appar. ♂			Decl. appar. ♂		
1807 Febr.	21	13 ^u	14' 45."5	169°	42'	21."0	+ 8°	59'	34."5
	28	12	37 36.8	167	17	35.5	9	59	58.8
März	1	12	32 13.6	166	55	43.6	10	8	35.7
	2	12	26 49.6	166	33	39.2	10	17	14.1
	3	12	21 24.9	166	11	23.4	10	25	43.6
	5	12	10 33.8	165	26	26.5	10	42	35.5
	6	12	5 8.4	165	4	1.2	10	50	45.4

Beob.

Beobacht. hel. Länge	berechn. hel. Länge	Corr. tab.	beob. hel. Breite	berechn. hel. Br.	Corr. tab.
158 27 42.4	158 27 41.1	+ 1,3	+ 1 44 6.0	+ 1 44 7.6	- 1,6
161 30 45.6	161 30 45.4	+ 0,2	41 54,1	41 55,1	- 1,0
161 56 58.5	161 56 57.4	+ 1,1	41 33,2	41 35,2	- 2,0
162 23 7.0	162 23 6,9	+ 0,1	41 14,2	41 13,9	+ 0,3
162 49 22,1	162 49 18,7	+ 3,4	40 51,1	40 53,1	- 2,0
163 41 43,9	163 41 42,4	+ 1,5	40 9,0	40 9,6	- 0,6
164 7 58,8	164 7 55,3	+ 3,5	39 45,6	39 47,4	- 1,8

Nachfolgende Uebersicht enthält die mittleren Resultate aus den hier discutirten Beobachtungen :

Epöche der Beob- achtungen	Correct der Taf. in hel. Länge	hel. Breite	helioc. Länge
1751 5 Beob. <i>Bradley</i>	- 1, 32	- 5, 12	353
1758 7 Beob. <i>Bradley</i>	+ 1, 24	+ 0, 33	140
1758 7 Beob. <i>Bradley</i>	+ 1, 25	+ 0, 43	158
1759 3 Beob. <i>Bradley</i>	- 2, 90	- 0, 47	131
1761 3 Beob. <i>Bradley</i>	+ 1, 47	+ 1, 00	146
1766 4 Beob. <i>Maskelyne</i>	+ 2, 50	- 3, 22	320
1766 2 Beob. <i>Fixmiller</i>	+ 2, 35	- 3, 70	321
1790 6 Beob. <i>v. Zach</i>	- 0, 10	- 0, 47	156
1805 17 Beob. <i>Bouvard</i>	- 0, 86	- 0, 31	144
1805 12 Beob. <i>v. Lindenau</i>	+ 0, 67	- 0, 42	147
1807 7 Beob. <i>Bouvard</i>	+ 1, 30	- 1, 24	162
1813 6 Beob. <i>v. Lindenau</i>	- 1, 15	- 5, 86	308
1813 4 Beob. <i>v. Lindenau</i>	- 1, 90	- 3, 90	332
1813 7 Beob. <i>v. Zach</i>	- 1, 17	- 6, 17	308

Nennt man i , β , L , Ω , Neigung, heliocentrische Breite, Länge in der Bahn und Knoten, so ist bekanntlich

$$d\beta \cos \beta - di \cos i \sin (L - \Omega) = 0;$$

und hiernach bey gehöriger Substitution der numerischen Werthe

I. Für

I. Für die größten südlichen Breiten:

1. 1751 + 5,"12 + 0,819 $di = 0$; Bradley
2. 1766 + 3, 47 + 0,999 $di = 0$; Maskel. Fixmiller
3. 1813 + 5, 86 + 0,985 $di = 0$; v. Lindenau
4. 1813 + 3, 90 + 0,970 $di = 0$; v. Lindenau
5. 1813 + 6, 17 + 0,985 $di = 0$; v. Zach

hieraus *per methodum minimorum quadratorum*

$$+ 23,"914 + 4,551 \text{ di} = 0;$$

$$di = - 5,"25$$

II. Für die größten nördlichen Breiten:

1. 1758 + 0,"33 - 0,999 $di = 0$; Bradley
2. 1758 + 0, 43 - 0,939 $di = 0$; Bradley
3. 1759 - 0, 47 - 0,993 $di = 0$; Bradley
4. 1761 + 1, 00 - 0,990 $di = 0$; Bradley
5. 1790 - 0, 47 - 0,951 $di = 0$; v. Zach
6. 1805 - 0, 31 - 0,995 $di = 0$; Bouvard
7. 1805 - 0, 42 - 0,988 $di = 0$; v. Lindennau
8. 1807 - 1, 24 - 0,985 $di = 0$; Bouvard

$$+ 1,"467 + 7,688 \text{ di} = 0;$$

$$di = - 0,"19.$$

Da bey meinen Mars-Tafeln die Neigung = $1^{\circ} 51' 6,"2$ angenommen ist, so folgt, vermöge der soeben gefundenen Werthe von di ,

$$\text{größte nördliche Mars-Breite} = 1^{\circ} 51' 6"$$

$$\text{größte südliche Mars-Breite} = 1 \ 51 \ 1$$

Für nördliche Breiten bedürfen also meine Tafeln und die darinnen angenommene Neigung der Mars-Bahn keiner Correction, allein für südliche Breiten

oder für $\text{VIS} - \text{XIIS}$ Arg. Latit., muß der Corrections-Factor

$$+ 5,^{\circ}25 \sin. \text{Arg. latit.}$$

angebracht werden, dessen Werthe in folgender Tafel enthalten sind:

Argumentum: Argum. Latit. = $L - \Omega$.

Gr.	VIS	VIIS	VIIIS	Gr.
0	— 0, 0	— 2, 6	— 4, 5	30
5	— 0, 5	— 3, 0	— 4, 7	25
10	— 0, 9	— 3, 4	— 4, 9	20
15	— 1, 4	— 3, 7	— 5, 1	15
20	— 1, 8	— 4, 0	— 5, 2	10
25	— 2, 2	— 4, 3	— 5, 2	5
30	— 2, 6	— 4, 5	— 5, 3	0
	XIIS	XS	IXS	

Der Werth dieser Tafel muß mit seinem Zeichen an die aus meinen Tafeln berechneten südlichen Breiten angebracht werden. In wiefern freylich die hier angenommene dem $\sin(L - \Omega)$ proportionale Abnahme der Differenz zwischen den größten südlichen und nördlichen Breiten wirklich in dieser Art statt findet, darüber läßt sich aus Mangel behufliger Beobachtungen keine bestimmte Behauptung beybringen. Doch wird es durch die Opposition von 1811 wenigstens sehr wahrscheinlich, daß auch in der Nähe des Knotens die südliche Breite vermöge einer eigenthümlichen, nicht vom Knoten abhängigen, Ursache aus meinen Tafeln zu groß folgt. Sieben Beobachtungen geben dort (Tab. ♂ pag. 23) die Correction der heliocentrischen Tafelbreite = — 3, 46, was

was einen Fehler von 2' im Knoten anzeigen würde, wenn die Neigung fehlerfrey wäre. Allein eine solche Correction des Knotens ist höchst unwahrscheinlich, da zehn im November und October 1768 zu Greenwich beobachtete Mars-Breiten keine merkliche Verbesserung meiner Knoten-Bestimmung geben.

Dafs ich bey meinen frühern Untersuchungen über die Neigung der Marsbahn die Differenz zwischen den gröfsten südlichen und nördlichen Breiten nicht wahrgenommen habe, davon liegt der Grund theils darinnen, dafs mit Ausnahme der Beobachtungen von 1753 und 1766 alle andere, zu diesem Behuf von mir in Rechnung genommene, nördliche Breiten waren, und dann auch, weil die Reduction der Zenith-Distanzen für diese beyden Jahre nicht ganz genau richtig war. Bey den Beobachtungen von 1753 hatte ich den Theilungsfehler des Quadranten vernachlässiget, und bey den letztern trat die oben bemerkte Ungewifsheit über die wahre Gröfse des Collimations-Fehlers ein.

Die jährliche Aenderung der Neigung der Marsbahn ist nach *La Place* (*Méc. cél.* T. III. p. 90)

$$= - 0,01298 + 0,13190 \mu'.$$

Nun ist in Gemäfsheit meiner neuern Untersuchungen über die Mercur-Theorie, $\mu' = + 0,097$; hiernach jährliche Aenderung:

$$= - 0,01298 + 0,1319 \cdot 0,097 = + 0,00016,$$

eine Gröfse, die für den Zeitraum, den die vorliegenden Beobachtungen umfassen, ganz vernachlässiget werden konnte.

Die periodischen Breiten-Störungen wurden, ungeachtet solche nicht ganz 0,"5 betragen, doch bey dieser Untersuchung mit berücksichtigt. Es sind solche (*Méc. cél.* Tom. III. p. 119) -

$$+ 0,"094 \sin (2\varphi - 3^{\circ} 35') = + 0,"094 \sin. 2\varphi - 0,"006 \cos 2\varphi \\ + 0,"403 \sin (2\varphi - \sigma - 3^{\circ} 35') = + 0,"403 \sin (2\varphi - \sigma) - 0,"025 \cos (2\varphi - \sigma)$$

Da die oben gefundene Differenz von 5" zwischen den größten südlichen und nördlichen Breiten allerdings ganz von den Beobachtungen und den dabey gebrauchten Reductions-Elementen abhängt, so verdient es noch untersucht zu werden, in wiefern wahrscheinliche Fehler in diesen, das gefundene Resultat zu ändern vermögen.

Unter die hier Einfluss habenden Reductions-Elemente gehört hauptsächlich der aus den Tafeln zu suchende Abstand des Planeten von Sonne und Erde, welcher von Richtigkeit der elliptischen Elemente abhängt. Dafs dieser aus meinen Tafeln richtig erhalten worden ist, wird durch die oben gefundenen Correctionen der heliocentrischen Tafellänge documentirt. Die mittlern Fehler für jede Beobachtungs-Reihe waren folgende:

	Mittl. Anom.	Correct. der hel. Länge		Mittl. Anom.	Correct. der hel. Länge
1751	6 ^S 21°	— 1, 32	1790	0 ^S 4°	— 0, 10
1758	11 27	+ 1, 24	1805	11 24	— 0, 12
1759	11 10	— 2, 90	1807	0 12	+ 1, 30
1761	11 24	+ 1, 47	1813	5 14	— 1, 35
1766	5 18	+ 2, 50			

Hiernach mittlere Correction der helioc. Länge:

für 5^S 28° mittl. Anomalie = — 0, 12

— 11 27 — — = + 0, 17.

Dafs

Dafs diese Fehler weder in der Epoche, noch mittlern Bewegung ihren Grund haben können, zeigt die blofse Ansicht der vorherigen Resultate. Es bleibt also blofs Aphelium und Excentricität zu deren Erklärung übrig; die bekannte Form der Bedingungs-Gleichungen gibt:

$$\begin{aligned} - 0, "12 &= - 0, "070 \, de & - 0, "186 \, dP \\ + 0, 17 &= + 0, 105 \, de & + 0, 186 \, dP \\ de &= - 1, "43; & dP = - 0, "11 \end{aligned}$$

beydes Werthe, die geradezu für Null zu halten sind, so dafs also dadurch die Richtigkeit der elliptischen Elemente meiner Tafeln, und der daraus zur Reduction der geocentrischen Breiten auf heliocentrische berechneten Abstände zur Genüge begründet wird. Ausserdem können die hier gefundenen heliocentrischen Breiten noch irrig seyn

- 1) wegen Fehler in der beobachteten Declination,
- 2) wegen Fehler in der angenommenen Schiefe der Ecliptik,
- 3) wegen irriger Refraction.

Nro. 1 und 3 kann man als gemeinschaftlich und in einem Sinne wirkend annehmen. Sey ϵ , b , l , α , δ , Schiefe, geocentrische Breite, Länge, R . und Abweichung, $tg. \zeta = \frac{tg. \delta}{\sin \alpha}$, β heliocentrische Breite; $d\delta$ wird die Fehler von 1 und 3 in sich fassen, und man hat

$$1. \quad \left(\frac{db}{d\epsilon} \right) = - \frac{\sin l \cos b^2}{\cos (\zeta - \epsilon)^2}$$

2. db

$$2. \quad \left(\frac{db}{d\delta} \right) = \sin E$$

$$3. \quad \left(\frac{d\beta}{db} \right) = \frac{\sin 2\beta}{\sin 2b}$$

Folglich

$$d\beta = - \left(\frac{\sin 2\beta}{\sin 2b} \right) \frac{\sin l \cos b^2}{\cos(\zeta - \epsilon)^2} d\epsilon + \left(\frac{\sin 2\beta}{\sin 2b} \right) \sin E d\delta$$

der Winkel E wird aus dem Ausdrucke

$$\cos E = \frac{\sin \epsilon \cos l}{\cos \delta} \quad (\text{Gaußs Theor. mot. p. 65})$$

berechnet.

Werden für die mittlern Epochen der vorherigen Beobachtungen die gehörigen numerischen Werthe substituirt, so folgt:

1751.	$d\beta = +0,044 d\epsilon + 0,255 d\delta$	*) $= 23^\circ 28' 16,8$
1758.	$d\beta = -0,309 d\epsilon + 0,391 d\delta$	28 14, 1
1759.	$d\beta = -0,170 d\epsilon + 0,722 d\delta$	28 13, 3
1761.	$d\beta = -0,018 d\epsilon + 0,897 d\delta$	28 12, 5
1766.	$d\beta = +0,175 d\epsilon + 0,257 d\delta$	28 10, 5
1790.	$d\beta = -0,293 d\epsilon + 0,387 d\delta$	28 0, 5
1805.	$d\beta = -0,351 d\epsilon + 0,396 d\delta$	27 54, 1
1807.	$d\beta = -0,119 d\epsilon + 0,373 d\delta$	27 53, 2
1813.	$d\beta = +0,217 d\epsilon + 0,264 d\delta$	27 50, 6

Bey der Berechnung dieser mittlern Obliquitäten liegt die von *Bessel* für 1755 aus *Bradley's* Beobachtungen bestimmte $= 23^\circ 28' 15,44$, und die von *v. Zach* für 1809 $= 23^\circ 27' 52,5$ zum Grunde; jährliche Aenderung $= -0,424$.

Bey

*) = Mittlere Obliquität für die Epoche der Beobachtungen.

Bey der leider noch immer statt findenden Ungewissheit über die wahre Ursache der Verschiedenheit der Sommer- und Winter-Obliquitäten läßt sich etwas bestimmtes über die Gränze der Genauigkeit der hier gebrauchten nicht angeben. Nach meiner Ueberzeugung kann keine um 2" irrig seyn. Allein wollte man auch annehmen, daß alle diese mittlern Obliquitäten für die sechs Winter-Monate einer Correction von $-5''$, für die Sommer-Monate von $+5''$ bedürften, so würden dadurch die vorherigen Resultate nur unbedeutend geändert werden. Die Correctionen der gefundenen heliocentrischen Breiten würden dann seyn:

1751		$-5,3$		1761		$+0,9$		1805		$+1,1$
1758		$-1,2$		1766		$-4,0$		1807		$-0,6$
1759		$-1,2$		1790		$-1,9$		1813		$-6,7$

und hiernach mittlere Correction der südlichen Breite $-5,3''$, der nördlichen $-0,5''$, während die vorherigen Bestimmungen $-5,2''$ und $-0,2''$ geben.

Es faßt, wie wir vorher bemerkten, den Beobachtungsfehler und den der gebrauchten Refraction zu gleicher Zeit in sich. Da das Resultat nie aus einer einzigen, sondern immer aus mehreren Beobachtungen hergeleitet wurde, auch ein Fehler in der beobachteten Zenith-Distanz hier meistens nur zum dritten oder vierten Theil auf die heliocentrische Breite influirt, so wird man diesen, den Regeln der Wahrscheinlichkeit zu Folge, für Null ansehen können. Dasselbe gilt in Hinsicht der gebrauchten Polhöhen, da die von Greenwich, Paris, Marseille und Seeberg wol schwerlich die Ungewissheit einer Secunde zulassen.

Eine

Eine Aenderung der Refraction könnte die Resultate allerdings wesentlich ändern, so dass man dadurch die südlichen und nördlichen Breiten zur Noth zur Uebereinstimmung bringen könnte. Allein da die Beobachtungen von 1751 bey einer Zenith-Distanz von 60° die Correction stärker geben, als die von 1766 bey einer Zenith-Dist. von 72° , ferner für 1813 Herr v. Zach bey einer um 7° kleinern Zenith-Distanz die Correction noch grösser fand, als solche aus meinen Beobachtungen bey 75° Zenith-Distanz folgt, so sieht man leicht, dass jene Differenz wahrscheinlicher Weise nicht in der Refraction gesucht werden kann. Die Refractionen wurden durchgängig aus *Delambre's* Tafeln gerechnet, deren Resultate mit denen von *Bessel* für Zenith-Distanzen unter 80° fast genau übereinstimmen. Wollte man die aus den Beobachtungen folgenden Correctionen der Mars-Neigung für die Epochen 1751, 1766 und 1813 verschwinden machen, so würde die dazu erforderliche Aenderung der Refraction folgende seyn:

$$R = \varphi \operatorname{tg.} Z; dR = d\varphi = d\varphi \operatorname{tg.} Z;$$

es ist für 1751 Zenith-Dist. $= 60^\circ$

-	1766	-	-	72
-	1813	-	-	69 v. Zach in Marseille
-	1813	-	-	76 v. Lindenau Seeberg.

Hiernach

1751	$d\beta = 0,255$	$d\delta = 0,255$	$d\varphi.1,732$
1766	$d\beta = 0,257$	$d\delta = 0,257$	$d\varphi.3,078$
1813	$d\beta = 0,264$	$d\delta = 0,264$	$d\varphi.2,605$
1813	$d\beta = 0,264$	$d\delta = 0,264$	$d\varphi.4,011$

und

XXXVII. *Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt.* 337

und mit Substitution der vorherigen Werthe für $d\beta$

$$\left. \begin{array}{l} - 5, "12 = 0,442 d_{\varrho} \\ - 3, "12 = 0,791 d_{\varrho} \\ - 6, "17 = 0,688 d_{\varrho} \\ - 5, "86 = 1,059 d_{\varrho} \end{array} \right\} - 15, "182 - 2,415 d_{\varrho} = 0$$

folglich Correction der Refraction bey 45° oder

$$d_{\varrho} = - 6, "29,$$

die durchaus unzulässig und unstatthaft ist.

Es läßt sich hiernach die aus 90 Beobachtungen abgeleitete Differenz der größten nördlichen und südlichen Marsbreiten auf keine Art befriedigend erklären, und ich bin um so mehr geneigt, diese Differenz für reell zu halten, da auch aus den frühern Bestimmungen anderer Astronomen dasselbe folgt.

So fand *Méchain* (*Lalande Astronom.* Tom. II. S. 105) aus der Conjunction von δ mit χ Leonis am 18. Oct. 1778 die größte nördl. Breite $1^{\circ} 51' 8''$, und aus der Conjunction mit λ Aquarii am 10. Oct. 1779 die größte südliche Breite $1^{\circ} 50' 55''$. *Le Gentil*, der für die Neigung der Marsbahn eine Menge älterer und neuerer Beobachtungen discutirt, giebt zuletzt als Resultat seiner Untersuchung folgendes Tableau (*Mémoires de l'Acad. des sciences de Paris* 1757 S. 277):

” *Table des différentes inclinaisons de l'orbite de Mars au plan de l'écliptique, tant du côté du terme austral que du côté du terme boréal, telles que les observations les ont données:*”

terme

terme austral		terme boréal	
Observations	inclinaison		
de Tycho	1° 50' 33"	1° 51' 3":	Tycho
Cassini	1 50 50	1 51 14	Flamsteed
Bouillaud	1 50 32	1 51 12	Flamsteed
Bouillaud	1 50 47	1 51 54	Bouillaud
Bouillaud	1 50 50	1 51 31	Le Gentil
Le Gentil	1 50 53	1 51 10	
		1 51 20	

Da es gewiss höchst wünschenswerth ist, eine so merkwürdige Erscheinung, wie die einer Differenz der grössten südlichen und nördlichen Marsbreiten, ausser allen Zweifel gesetzt zu sehen, so füge ich hier die Angabe von einigen Epochen bey, wo gute Mars - Beobachtungen besonders wünschenswerth sind ;

1. für Bestimmung des Knotens 1814. 5 - 30. Jan.
2. grösste nördliche Breite . . . 1814. 10 - 30. Jul.
3. für Bestimmung des Knotens 1815. 20 Jan. - 10 Feb.
4. grösste südliche Breite . . . 1815. 1 - 20. Jul.

Beynahe scheint es, als finde eine solche Verschiedenheit der grössten nördlichen und südlichen Breiten bey allen Planeten statt.

Bey der Erde ist dies bekanntlich in Hinsicht der grössten nördlichen und südlichen Abstände vom Aequator der Fall.

Für die Venus geben Rechnungen von Bugge dasselbe Resultat. Aus einem Aufsatze dieses Astronomen in *Philos. Transact.* 1790 p. 28 finde ich 6 Beob. im Jul. 1781 geben grösste nörd. Breite der ♀ 3° 23' 36"

4	—	—	Sept. 1783	—	—	südl.	—	—	47
4	—	—	Jul. 1786	—	—	nörd.	—	—	36
3	—	—	Mai 1788	—	—	nörd.	—	—	37

Für die Jupitersbahn fand *Lalande* (*Astronom. Tom. II. p. 105*) aus einer Beobachtung am 6. April 1768 die grösste nördliche Breite $1^{\circ} 19' 4''$, und aus dem Gegenschein von 1785 die grösste südliche Breite $1^{\circ} 18' 44''$. Ich bin allerdings noch weit entfernt, die Differenzen, welche ich hier nach *Bugge's* und *Lalande's* Rechnungen in den Neigungen von Venus und Jupiter angebe, schon als ganz constatirt anzusehen; allein immer schien es mir der Mühe werth, wenigstens vorläufig auf einen Umstand aufmerksam gemacht zu haben, der gewiss sehr interessant ist, und über den ich in den folgenden Abschnitten dieser Untersuchung etwas bestimmtes beizubringen hoffe.

Besonders merkwürdig war es mir nämlich, daß bey Mars, Erde, Venus und Jupiter das Maximum der grössten Breite oder Abweichung bey der größern Distanz, das Minimum bey der kleinern Distanz eintritt;

bey ♂	grösste nörd. Br.	$1^{\circ} 51' 6''$	Abst. von d. ☉	1,6616
-	südl.	$1^{\circ} 51' 1''$	-	1,3875
bey ♀	nörd.	$3^{\circ} 23' 36''$	-	0,7193
-	südl.	$3^{\circ} 23' 46''$	-	0,7274
bey ♃	nörd.	$1^{\circ} 19' 4''$	-	5,4464
-	südl.	$1^{\circ} 18' 44''$	-	4,9462
bey ♂	Sommer-Solstitium		-	1,0168
-	Winter-Solstitium		-	0,9832

(Die Fortsetzung folgt.)

XXXVIII.

Berechnung
der
Opposition der Juno im Jahre 1810
von
Bernhard Nicolai.

Wenn es überhaupt bey den neuen Planeten von der größten Wichtigkeit ist, so viel als möglich sichere Data zur Begründung einer genauen Theorie derselben zu besitzen, so ist dieses ganz besonders bey der *Pallas* und *Juno* der Fall. Von der letztern hatte man seit ihrer Entdeckung alle Oppositionen observirt, ausgenommen die des Jahres 1810, welche weder in Deutschland noch in Frankreich beobachtet worden ist. Sehr angenehm war es mir daher, diese Lücke durch einige Beobachtungen von *Carlini*, die bey Gelegenheit der Anzeige der *Mailänder Ephemeriden* für 1811, 12 und 13 im letzten May-Hefte der *Monatl. Corresp.* S. 451 mit abgedruckt sind, ausgefüllt zu sehen. Nachdem sie mir bekannt geworden waren, säumte ich nicht, selbige sofort in Rechnung zu nehmen, und aus ihnen die Opposition herzuleiten. — Des Zusammenhanges wegen setze ich die Beobachtungen nochmals hier, wobey jedoch die Declinationen durch Parallaxe corrigirt sind:

1810

XXXVIII. Opposition der Juno im Jahre 1810. 341

	Mittlere Zeit in Mailand	R. appar.	Declin. bor. appar.
1810 Jan. 28	12 ^U 3' 10," 7	128° 21' 14," 3	3° 14' 48," 49
29	11 58 22, 2	128 8 2, 6	3 23 50, 37
30	11 53 33, 9	127 54 52, 3	3 32 53, 35
Febr. 1	11 43 58, 8	127 28 57, 4	3 51 29, 91

Die Vergleichung dieser Beobachtungen geschah mit den Elementen, welche Herr Professor *Gauss* aus den Oppositionen von 1806, 1807, 1808 und 1811 hergeleitet hat (*Mon. Corr.* Bd. XXIV. S. 188). Gewöhnlich verwandelt man die beobachteten Rectascensionen und Declinationen gleich in Längen und Breiten, und bestimmt dann hiernach den Fehler der Elemente. Bey den oftmals eintretenden, Fällen aber, wo nur der eine Theil der Beobachtung gut ausgefallen ist, würde man durch Anwendung jenes Verfahrens offenbar auch den andern Theil derselben verschlimmern, und also in der Bestimmung des Fehlers der Elemente nicht den Grad von Genauigkeit erlangen, den man doch in dergleichen Fällen zu erreichen im Stande ist. Um also durch Vergleichung der aus den Elementen hergeleiteten geocentrischen Oerter mit den beobachteten den Werth der letztern gehörig kennen zu lernen, führte ich die Berechnung der erstern bis auf die Rectascension und Declination hinunter. Das Resultat dieser Vergleichung ist folgendes:

	Berechnete AR.	Fehler der Elemente	Berechn. nördl. Decl.	Fehler d. Elem.
Jan. 28	128° 2' 36," 13	-18' 58," 17	3° 14' 47," 11	-1," 38
29	127 49 26, 16	36, 44	3 23 47, 19	-3, 18
30	127 36 21, 10	31, 2	3 32 55, 83	+2, 48
Feb. 1	127 10 30, 69	26, 71	3 51 36, 64	+6, 73

Die-

Dieses Schema zeigt deutlich, daß man sämtliche Beobachtungen ohne Ausschluß zur Berechnung der Opposition benutzen kann. Nachdem ich mich auf diese Weise hiervon überzeugt hatte, verwandelte ich nunmehr die beobachteten Rectascensionen und Declinationen vernüttelt der scheinbaren Schiefe der Ecliptik $= 23^{\circ} 27' 42",26$ in Längen und Breiten, und erhielt so folgende Bestimmungen:

	Beobacht. geoc. Läng.	Berechn. geoc. Läng.	Fehler d. Elem.	Beobacht. geoc. Br.	Berechnete geoc. Br.	Fehler d. Elem.
Jan. 28	129 54 25,41	129 35 47,72	-18' 37,09	15 3 20,91	15 8 6,92	-4' 26,01
29	129 38 5,03	129 20 15,80	35,23	14 57 58,63	15 2 44,39	45,76
30	129 23 18,77	129 4 47,53	31,24	14 52 33,65	14 57 11,05	37,40
Feb. 1	128 52 34,97	128 34 7,06	27,29	14 41 3,77	14 45 32,83	29,11

Man sieht aus dieser Vergleichung, wie stark obige Elemente von *Carlini's* Beobachtungen abirren, obgleich letztere zwischen die Oppositionen fallen, aus denen erstere hergeleitet sind; ein unverkennbarer Beweis von der mächtigen Einwirkung Jupiters, und gerade deshalb *diese* Opposition eine sehr wichtige. — Da die Differenz zwischen der Rechnung und Beobachtung hier so groß ist, so begreift man leicht, daß dieselbe für einen Zeitraum von einigen Tagen nicht als constant angesehen werden darf, und wirklich zeigt sich auch an obiger Vergleichung die merkliche Aenderung des Fehlers. Da man indess diese Aenderung als der Zeit proportional ansehen kann, so folgt für die Differenz zwischen Rechnung und Beobachtung folgender mittlere Werth:

$$\begin{aligned} \text{Januar 30. } 6^u \quad & \text{in der Länge} = - 18' 32",86 \\ & \text{in der Breite} = - 4 39,57 \end{aligned}$$

Zieht

XXXVIII. Opposition der Juno im Jahre 1810. 343

Zieht man diesen mittlern Werth von dem einer jeden einzelnen Beobachtung entsprechenden ab, so erhält man mit gehöriger Rücksicht auf die Zwischenzeiten nachfolgende vier Bestimmungen für die tägliche Aenderung des Fehlers:

	in der Länge	in der Breite
	— 2,"76	— 3,"68
	3, 16	8, 25
	6, 48	8, 68
	2, 48	4, 65
Mittl. tägl. Aend.	— 3,"72	— 6,"31

Aus den obigen beobachteten Längen der Juno und den ihnen entsprechenden Sonnenlängen ergab sich beyläufig die Zeit des Gegenscheins am 29. Jan. 15^U, und es konnte also nunmehr jener mittlere Fehler der Elemente auf das Oppositions-Moment übertragen werden, wofür man demnach die Correction der berechneten geocentr. Länge = + 18' 35,"18, und Correction der Breite = + 4' 43,"51 erhält. — Aus diesen Datis ergibt sich nun das Resultat für die Opposition folgendermaßen:

Zeit des Gegenscheins 1810 Jan. 29. 14^U 55' 21"
M. Z. in Göttingen

Wahre Länge = 129° 36' 45,"2
Geoc. Breite = — 14 57 18, 5

Außerdem ist für diese Zeit

Log. Dist. δ a \odot = 9.9936244
Breite der Erde = — 0,"81

Es ist hierbey noch zu bemerken, daß man durch eine bloße Interpolation zwischen den beyden Beobach-

achtungen vom 29. und 30. Januar *durch Zufall* fast genau dasselbe Resultat erhält. Größtentheils ist dieses im gegenwärtigen Falle der besondern Güte der Beobachtungen zuzuschreiben. Immer aber bleibt das Verfahren (dessen sich freylich die Astronomen häufig bedienen), auf diese Art ohne weitere Prüfung der Beobachtungen die Opposition herzuleiten, etwas unsicher, theils, weil man sich doch nie *ganz fest* auf die Genauigkeit der Beobachtungen verlassen kann, theils aber auch, weil der Zwischenraum von ungefähr Einem, ja zuweilen zwey Tagen für die einfache Interpolation oft schon etwas zu groß ist.

Der Vollständigkeit und des Interesses wegen habe ich diese Opposition mit denen von 1808, 1811 und 1812 verbunden, und folgende Elemente durch sie erhalten:

Epoche 1813 Meridian von Göttingen	343° 3' 11,"0
Länge des Perihels 1813	53 4 39, 1
Länge des aufsteig. Knotens 1813	171 9 23, 7
Neigung der Bahn	13 4 2, 2
Excentricitäts - Winkel	14 45 23, 9
Tägliche tropische Bewegung	813" 4075
Logarithmus der halben großen Axe	0.4265144

XXXIX.

Fortgesetzte Nachrichten über die
Pallas.*)(Vergl. *Mon. Corr.* Bd. XXVI. p. 199.)

Die schöne Bestätigung, welche die auf die Störungs-Rechnungen gegründete Vorausbestimmung der Bewegung der *Pallas* durch die Beobachtungen des vorigen Jahres erhielt, und von der wir damals *M. C.* Bd. XXVI. p. 199 Rechenschaft gegeben haben, erhöhte das Interesse, womit die Astronomen die Wiedererscheinung dieses Planeten im gegenwärtigen Jahre erwarteten. Auf der hiesigen Sternwarte wurde der Planet zum erstenmale den 1. September beobachtet, und genau auf dem Platze der schon zwey Jahre zuvor durch Hrn. *Nicolai* berechneten Ephemeride gefunden. Höchst ungünstiges Wetter machte es uns hier unmöglich, auch nur eine einzige Beobachtung in der Nähe der Opposition zu erhalten, so wie auch die große Lichtschwäche des Planeten, der kaum als ein Stern 10ter Grösse erschien, eine Beobachtung am Quadranten nicht gestattete.

Glücklicher war Herr Prof. *Gauss* in Göttingen und Herr *Burchardt* in Paris; die Beobachtungen des

*) Aus den Göttinger gelehrten Anzeigen Nr. 176.

des Erstern, zwar nur am Kreis-Micrometer gemacht, sind vorzüglich scharf ausgefallen.

I. *Meridian-Beobachtungen auf der Seeberger Sternwarte:*

1813	Mittl. Zeit	Gerade Aufst.
Sept. 1	10 ^U 25' 16,"6	316° 58' 15,"9
3	10 16 9, 6	316 39 25, 5
4	10 11 35, 4	316 29 48, 7

II. *Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte:*

1813	Mittl. Zeit	Gerade Aufst.	Nördl. Abw.
Junius 28	11 ^U 37' 2"	327° 2' 13, 3	14° 5' 43, 4
Aug. 16	10 36 23	319 50 54, 7
19	9 31 0	319 17 10, 6	10 0 8, 4
26	9 23 7	317 59 52, 0	8 44 35, 3

III. *Meridian-Beobachtungen auf der Sternwarte der Militär-Schule in Paris:*

1813	Sternzeit	Gerade Aufst.	Nördl. Abw.
August 4	21 ^U 28' 30,"5	322° 7' 38,"0	12° 11' 58,"5
9	21 24 42	11 32 38, 4
11	11 15 28, 1
15	21 20 7, 2	320 1 48, 0	10 38 48, 2
17	21 18 35, 2	319 38 48, 5	10 19 29, 3
19	21 17 4, 3	319 16 4, 5	9 59 18, 3
26	21 11 56, 1	317 59 1, 8	8 43 23, 4

Herr Nicolai, dieser geschickte junge Astronom, welcher jetzt als Gehülfe auf der hiesigen Sternwarte angestellt ist, übernahm die Berechnung dieser Beobachtungen. Er verglich sie zuvörderst mit den zuletzt verbesserten Elementen auf das sorgfältigste, und fand folgende schöne Uebereinstimmung:

Unter-

Unterschied der Rechnung:

1813	Ger. Aufst.	Abweich.	Beobachter
Junius 28	+ 23, "6	+ 22, "4	Gauß
August 4	+ 36, 9	— 5, 9	Burckhardt
9	. . .	— 5, 1	—
11	. . .	+ 6, 2	—
15	+ 26, 9	+ 3, 7	—
16	+ 35, 6	. . .	Gauß
17	+ 28, 2	— 6, 6	Burckhardt
19	+ 28, 5	+ 4, 5	Gauß
19	+ 24, 8	— 7, 4	Burckhardt
26	+ 22, 4	— 4, 3	Gauß
26	+ 18, 3	+ 11, 1	Burckhardt
Septbr. 1	+ 22, 8	. . .	v. Lindenau
3	+ 20, 9	. . .	—
4	+ 49, 9	. . .	—

Aus den Beobachtungen vom 15. 17. und 19. August leitete Herr *Nicolai* folgendes Resultat für die Opposition ab:

Neunte beobachtete Opposition der Pallas:

1813 Aug. 18. $8^{\text{U}} 41' 5''$ Mittl. Zeit in Göttingen
 Wahre Länge der Pallas . . . $325^{\circ} 23' 56, "5$
 Wahre geocentr. Breite . . . $24 \ 37 \ 36, 1 \text{ N.}$
 Man vergleiche damit die Vorausbestimmung in der *Mon. Corr.* Bd. XXVI. S. 203.

Eine neue Verbesserung der Elemente, um sie auch dieser Opposition noch besser anzupassen, schien dem Herrn Prof. *Gauß* unter diesen Umständen nicht der Mühe werth zu seyn.

* * *

Z z

Zu

Zu diesen Nachrichten hat Herr Nicolai selbst noch folgenden Nachtrag geliefert:

Da noch nirgends die Elemente abgedruckt sind, die meiner im vorstehenden Berichte angeführten Vergleichung der Pallas-Beobachtungen zum Grunde liegen, so füge ich solche hier bey:

Epoche 1813 Aug. 18. 0^u in Götting.	331° 41' 18." 45	} mittlere Nachtgl.
Länge des Perihels für dieselbe Zeit	121 4 46. 55	
Länge des Ω	172 33 0. 37	
Neigung der Bahn	34 35 8. 31	
Excentricitäts-Winkel	13 58 31. 72	
Tägl. mittl. tropische Bewegung . . .	768." 3934	
Logarithmus der halben großen Axe . .	0.4430003	

Dieselben Elemente habe ich, sowohl zur *Voraus*-Bestimmung der künftig-jährigen Opposition, als auch zur Berechnung des geocentrischen Laufes der Pallas bey ihrer nächsten Wieder-Erscheinung, beybehalten.

Die bevorstehende *zehnte* Opposition wird hier nach eintreten:

1814 Octob. 25. 13^u 13' 13" M. Z. in Göttingen	
Wahre Länge	31° 59' 53." 3 *)
Geoc. südl. Breite	37 21 55. 9

Geo-

*) Der zu dieser Bestimmung erforderliche Sonnen-Ort ist aus des Freyherrn v. Zach neuern Sonnentafeln (Gotha 1804) genommen. Für diejenigen, welche sich dieser Tafeln zur Berechnung der Sonnen-Oerter für das kommende Jahr bedienen wollen, bemerke ich bey dieser Gelegenheit, daß die in Tab. III. für Arg. I. angegebene Epoche 4988.82 unrichtig ist, und dafür 4993.47 gesetzt werden muß.

Geocentrischer Lauf der Pallas

vom 26. May 1814 bis zum 3. April 1815:

Mittlere Mitternacht in Göttingen	R.	Declin.	Log. der Entfernung v. d. Erde
1814 May 26	18° 35'	1° 34' N.	0.5452
30	19 56	1 40	0.5388
Jun. 3	21 18	1 45	0.5321
7	22 38	1 48	0.5251
11	23 58	1 49	0.5179
15	25 17	1 49	0.5104
19	26 36	1 47	0.5026
23	27 53	1 43	0.4944
27	29 9	1 37	0.4860
Jul. 1	30 25	1 29	0.4774
5	31 38	1 18	0.4685
9	32 51	1 5	0.4593
13	34 2	0 49	0.4499
17	35 11	0 31	0.4402
21	36 18	0 9 N.	0.4303
25	37 22	0 15 S.	0.4201
29	38 25	0 43	0.4098
Aug. 2	39 25	1 14	0.3993
6	40 22	1 48	0.3887
10	41 16	2 25	0.3779
14	42 7	3 7	0.3671
18	42 54	3 52	0.3562
22	43 37	4 40	0.3453
26	44 15	5 32	0.3345
30	44 50	6 28	0.3238
Sept. 3	45 19	7 28	0.3132
7	45 44	8 31	0.3029
11	46 2	9 37	0.2928
15	46 16	10 47	0.2832
19	46 23	11 58	0.2740
23	46 24	13 12	0.2654
27	46 19	14 28	0.2575

Mitt-

Mittlere Mitternacht in Göttingen	R.	Declin.	Log. der Entfernung v. d. Erde
1814 Octob. 1	46° 7'	15° 44'	S. 0. 2502
3	45 59	16 22	0. 2469
5	45 50	17 0	0. 2438
7	45 39	17 38	0. 2409
9	45 26	18 16	0. 2382
11	45 12	18 53	0. 2358
13	44 57	19 30	0. 2336
15	44 40	20 6	0. 2316
17	44 22	20 41	0. 2299
19	44 3	21 16	0. 2284
21	43 42	21 49	0. 2272
23	43 21	22 22	0. 2262
25	42 59	22 53	0. 2255
27	42 36	23 23	0. 2250
29	42 12	23 52	0. 2248
31	41 48	24 19	0. 2248
Novbr. 2	41 23	24 45	0. 2251
4	40 58	25 9	0. 2256
6	40 33	25 31	0. 2263
8	40 8	25 52	0. 2272
10	39 43	26 11	0. 2284
12	39 19	26 28	0. 2298
14	38 54	26 44	0. 2313
16	38 31	26 58	0. 2331
18	38 7	27 10	0. 2350
20	37 45	27 20	0. 2371
22	37 24	27 28	0. 2393
24	37 3	27 35	0. 2417
26	36 44	27 40	0. 2442
28	36 26	27 43	0. 2469
30	36 9	27 45	0. 2496
Decbr. 4	35 40	27 44	0. 2554
8	35 16	27 36	0. 2616
12	34 59	27 24	0. 2681
16	34 49	27 6	0. 2747
20	34 45	26 43	0. 2815
24	34 48	26 17	0. 2883
28	34 58	25 46	0. 2952

Mitt-

Mittlere Mitternacht in Göttingen	R.	Declin.	Log. der Entfernung v. d. Erde.
1815 Jan. 1	35° 15'	25° 13' S.	0.3021
5	35 38	24 36	0.3089
9	36 7	23 57	0.3157
13	36 42	23 16	0.3224
17	37 23	22 33	0.3289
21	38 9	21 48	0.3353
25	39 1	21 2	0.3416
29	39 58	20 14	0.3477
Febr. 2	41 0	19 26	0.3536
6	42 6	18 37	0.3594
10	43 16	17 47	0.3650
14	44 31	16 57	0.3704
18	45 50	16 7	0.3756
22	47 12	15 16	0.3807
26	48 38	14 26	0.3855
Marz 2	50 7	13 36	0.3902
6	51 39	12 46	0.3948
10	53 15	11 56	0.3992
14	54 53	11 8	0.4034
18	56 34	10 19	0.4074
22	58 18	9 32	0.4114
26	60 4	8 46	0.4151
30	61 53	8 0	0.4188
April 3	63 44	7 16	0.4223

Nimmt man die Lichtstärke der Pallas in der Entfernung 1 von Sonne und Erde zur Einheit an, so war diese Lichtstärke

in der Opposition von 1812 = 0,01666

— — — 1813 = 0,01475

und in der nächsten vorhin angekündigten Opposition von 1814 wird sie seyn = 0,05476, also beynahe 4mal größer, als in der diesjährigen; doch dürfte vielleicht dieses stärkere Licht durch den ziemlich tiefen Stand des Planeten wieder etwas geschwächt werden.

XL.

XL.

Ueber

Seetzen's aſtronomiſche Beobachtungen
in Arabien.

Bey Anzeige der letzten in meine Hände gekommenen Sendung von *Seetzen* (M. C. Bd. XXVI. S. 382) versprach ich, die Berechnung der dabey befindlichen aſtronomischen Beobachtungen in Arabien in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift zu liefern. Auch eilte ich, diese Berechnung zu unternehmen, da jene in sehr wenig und zum Theil noch gar nicht bereiteten Theilen Arabiens angestellten Beobachtungen höchst interessante Resultate für die Geographie jener Gegenden versprochen. Meine Hoffnung ward aber leider getäuscht, indem die daraus erhaltenen Bestimmungen theils unter sich, theils von früher bekannten so abwichen, daß ein reeller Nutzen für Geographie schwerlich daraus gezogen werden konnte. Ich legte die Arbeit damals auf die Seite, in der Absicht, zu einer andern Zeit, bey gehöriger Muße, noch eine anderweite Discussion zu versuchen. Da sich aber dieser Zeitpunkt durch Verhältnisse, von denen unsere Leser am Schlusse dieses Jahrganges umständlicher unterrichtet werden sollen, noch auf längere Zeit entfernt, so glaube ich den Geographen einen Dienst zu erweisen, wenn ich sämtliche *Seetzen's*che Original-Beobachtungen hier so abdrucken

drucken lasse, wie ich solche in des Letztern eigner Handschrift erhielt. Gewiß findet sich ein Astro-
nom, deres versucht, doch vielleicht etwas brauch-
bares zum Besten der Astronomie daraus herzulei-
ten.

Zum Behuf meiner angefangenen Berechnungen
hatte ich mir aus zwey zu *Valentin's* Reise gehörigen Karten

1. *Chart of the red Sea, on which is delineated the coast of Abyssinia, from the straits of Babel-Mandel to Salaka, in latit. 20° 29' N., and the Island adjacent, forming the western Channel, 1804 — 5,*
2. *Chart of the red Sea, on which is delineated the African and Arabian coast from Salaka and Jidda to Suez, 1804 — 5,*

die Längen und Breiten der *Seetzen'schen* Beob-
achtungs-Orte abgetragen, und da jene Karten doch
nur in weniger Händen sich befinden, so lasse ich
die daraus erhaltenen Bestimmungen hier folgen;

	Nördliche Breite	Länge östlich v. Green- wich
<i>Sana</i> . .	15° 21'	44° 25'
<i>Damâr</i> . .	14 32	44 30
<i>Abb</i> . . .	13 58	44 19
<i>Lâhak</i> . .	12 57	44 52
<i>Aden</i> . .	12 47	45 5
<i>Hodêde</i> .	14 48	42 59
<i>Bêt-el-Fakih</i>	14 32	43 24
<i>Sebîd</i> . -	14 12	43 23

v. L.

Astro-

*Astronomische Beobachtungen in Arabien,
nämlich in Hedschâs und Jemen, gemacht
von U. J. Seetzen in Mochâ
1810.*

*Astronomische Beobachtungen in Mekka, den 15.
März 1810, oder den 9. Széffar 1225. —
Nachmittags.*

107°	40'	1 ^U	32'	54"	Diese Beobachtungen wurden auf der Terrasse des Hauses meines Freundes, <i>Seïd Mohammed</i> , eines Specereyhändlers und Gelehrten, angestellt. Dieses Haus liegt in der Nähe der öffentlichen Waage, zwischen den zwey Gassen <i>El Küschaschije</i> und <i>Müdda</i> , dritthalbhundert Schritte nordwärts vom <i>Harram</i> oder der grossen <i>Moschee</i> . <i>Seïd Mohammed</i> zählte die Uhr. Damit wir kein Aufsehen erregten, gab er vor, daß er mich in der Astronomie unterrichtete.
	20		33	47	
	0		34	44	
106	40		35	39	
	20		36	34	
	0		37	29	
105	40		38	26	
	20		39	17	
	0		40	12	
95	0	2	5	16*	
94	20		7	56	Mit mir kein Aufsehen erregten, gab er vor, daß er mich in der Astronomie unterrichtete.
	0		8	45	
93	40		9	35	
	20		10	27	
78	0		46	34	
77	40		47	23	
	20		48	11	
	0		48	56	

Nach den ersten Beobachtungen von 107° 40' bis 105° 0' fand ich die Collimation

innerh. 15' 45", aufserh. 49' 40".

Nach den allerletzten Beobachtungen der Mond-Abstände war sie innerh. 15' 20", aufserh. 50' 10".

Mond-

(*) Etwa 6' 16"?

Mond-Distanzen von der Sonne; der Mond stand links und war im Zunehmen.

115°	44' 30"	2 ^U 16' 52"	So viel ich mich von mei-
	46 30	19 20	nen vorigen in Syrien ange-
	48 20	22 39	stellten Beobachtungen erin-
	49 0	25 6	nere, so ist obige Collimation
	50 15	28 21	ganz verschieden von der da-
	51 20	30 59	maligen, wovon ich die Ur-
	53 20	35 2	sache noch nicht anzugeben
	54 25	38 18	weiss.
	55 30	40 15	
	59 40	51 27	
116	0 30	54 7	Obgleich ich den kleinen
	1 50	57 3	Spiegel, der nicht genau senk-
	2 20	59 53	recht auf der Ebene des Sextanten stand, am vorigen

Abend berichtet zu haben glaubte, indem ich das Fernrohr nach dem Sirius richtete, bis die beyden Bilder sich genau deckten; so fand ich doch heute, daß ich die beyden Sonnenbilder noch nicht genau zur Bedeckung bringen konnte. Indessen blieb nur wenig vom Rande übrig, welches nicht bedeckt wurde. Die Luft war glücklicherweise heute ziemlich wolkenleer, und nur zweymal hinderte mich eine leichte Wolke auf etliche Minuten.

Astronom. Beobachtungen in Mekka, d. 16. März 1810, oder den 10. Széffar 1225.

Corresp. Sonnen - Höhen				Anmerkung :
112°	0'	10 ^U 19' 12"	1 ^U 38' 53"	Bey den nachmittägi-
	20	20 8	36 58	gen Beobachtungen von
	40	21 10	35 59	113° 20' bis 109° 40' ist
113	0	22 9	35 1	von dem Uhrzähler ein
	20	23 6	34 0	beträchtlicher Fehler be-
				gangen. Ich vermuthe,
				er

er

Einzelne vormittägige Höhen

113°	40	10 ^U	24	6"
114	0		25	5
	20		26	5
123	40		57	56
124	0		59	11
	20	11	0	32
	40		1	52
125	0		3	13
	20		4	31
	40		5	54
126	0		7	25
	20		8	52
	40		10	23
127	0		11	52
131	0		34	29 ⁸
	20		37	17 ⁸

Einzelne nachmittägige Höhen

111°	40	1 ^U	39	49"
	20		40	46
	0		41	45
110	40		42	44
	20		43	37
	0		44	34
109	40		45	31
83	40	2	50	5
	20		50	51
	0		51	38
82	40		52	27
	20		53	14
	0		54	1
81	40		54	48
	20		55	34
	0		56	22
80	40		57	9
	20		57	55
	0		58	43
78	0	3	4	26

er liegt darinn, daß in den ersten vier Höhen die Zeit um eine Minute zu wenig angegeben ist, und daß also statt 34' stehen müsse 35', statt 35 , 36' u. s. w.; dies vorausgesetzt, trifft alles richtig zu. Ich durfte *Scid Mohammed* nicht neben mir sitzen lassen, weil ich befürchtete, das Dach möchte einbiegen; sonst hätte ich alsdann die Uhrzeit selbst sehen können.

Die Witterung war heute im Ganzen genommen sehr ungünstig; die Luft war düstlich und wolkig, weswegen ich in der Frühe keine Beobachtungen machen konnte, und weswegen auch keine Mondsabstände gemessen werden konnten. Wenn einige meiner heutigen Beobachtungen nicht genau genug sind, so muß es diesem Umstande zugeschrieben werden.

Zu meinem Mißvergnügen bemerkte ich heute in der Terrasse eine geringe Beweglichkeit, hoffe aber, dem daher zu befürchtenden Irrthume dadurch abgeholfen zu haben, daß

Einzelne nachmit-
tägige Höhen

77°	40'	30	5'	10"
	20		6	0
	0		6	44
69	0		24	16
68	40		25	0
	20		25	45
	0		26	32
55	0		57	52
54	40		58	30*
	20		59	22
	0	4	0	7

dafs ich auf der nämlichen Seite sitzend nivellirte, wo ich beobachtete. Müfste ich hier nicht verfohlen beobachten, so würde es mir sehr leicht gewesen seyn, die trefflichsten Stellen zu meinen Beobachtungen zu finden, und ich würde keinen Augenblick angestanden haben, das platte

Dach von *Bêt Allâh* oder der *Kâba* zum Observatorium zu wählen, wozu dies Gebäude, welches einem abgestumpften viereckigen Thurme gleicht, besser geeignet zu seyn scheint, als zu einer Wohnung der Gottheit. Aber — — —

Da wir aus der Wohnung des *Scherifs* von *Mekka* wegen einer Lücke in der Mauer unserer Terrasse beobachtet werden konnten, und er die Gewohnheit haben soll, mit einem Fernrohre die Nachbarschaft zu mustern, so machten wir dort einen Vorhang von Dattelmatten.

Die Versehen, welche mein Freund beym Zählen begieng, rührten vom Minutenzeiger her, der nicht genau die Zeit angab, weswegen ich ihn berichtigte.

Vor dem Anfange der vormittägigen Beobachtungen fand ich die Collimation

innerhalb 15' 0"
aufserhalb 50 25.

Nach

*) Etwa 36?

Nach der Beobachtung von $140^{\circ} 20'$ fand ich ſie innerhalb $15' 20''$, auſerhalb $50' 0''$.

Nach der Beobachtung von $127^{\circ} 0'$ war ſie innerhalb $14' 50''$, auſerhalb $50' 40''$.

Nach der nachmittägigen Beobachtung von $109^{\circ} 40'$ innerhalb $15' 45''$, auſerhalb $49' 40''$.

Nach der Beobacht. von $77^{\circ} 0'$ innerhalb $15' 45''$, auſerhalb $49' 40''$.

Aſtronomiſche Beobachtungen in Mekka, d. 17. März 1810, oder d. 11. Széffar 1225.

Correspondirende Sonnen-
Höhen

Einzelne vormittägige
Höhen

56° 40'	8 ^U 18 9"	4 ^U 7 3"
57 0	18 54	6 17
20	19 38	5 33
40	20 23	4 48
58 0	21 10	4 3
20	21 54	3 20
40	22 38	2 34
59 0	23 26	1 48
20	24 10	1 5
40	24 55	0 19
60 0	25 40	3 59 85
20	26 26	58 48
67 20	42 14	43 3
68 40	45 18	40 0
69 0	46 4	39 15
20	46 49	38 28
40	47 35	37 43
70 0	48 22	36 59
20	49 8	36 12
40	49 53	35 25
71 0	50 40	34 41
20	51 26	33 57
88 20	9 31 7	2 54 18
40	31 55	53 30

107° 20'	10 ^U 18 52"
40	19 45
108 0	20 40
20	21 33
40	22 28
109 0	23 23
20	24 20
40	25 14
121 0	59 9
20	11 0 17
40	1 25
122 0	2 34
20	3 45
40	4 53

Collimation nachher
innerhalb $15' 20''$
auſerhalb $49' 30''$

Einzelne nachmitt. Höhen

119° 40'	1 ^U 30 49"
20	31 52
0	32 57
118 40	34 2
105 20	2 11 57
83 0	55 5
68 20	3 40 43
0	41 31
67 40	42 17
0	43 46

Correspondirende Sonnen-Höhen				Die Collimation betrug vor den vormittägigen Höhen von 56° bis 60°
89° 0'	9 ^U 32' 43"	2 ^U 52' 42"		innerhalb 15' 0"
20	33 32	51 54		aufserhalb 49 45.
40	34 22	51 6		nach jenen Höhen aber
90 0	35 8	50 19		innerhalb 14' 50"
20	35 56	49 30		aufserhalb 50 0.
40	36 46	48 41		Nach 91° 20' fand ich sie
91 0	37 34	47 51		innerhalb 15' 20"
20	38 24	47 4		aufserhalb 49 50.
110 0	10 26 10	1 59 23		
20	27 5	58 28		

Collimation vor der Höhe von 107° 20' innerhalb 15' 40", aufserhalb 50' 0"; nachher aber nach 110° 20' innerhalb 16' 0", aufserhalb 50' 0". Collimation nach den nachmittägigen correspondirenden Höhen von 67° — 71° innerhalb 15' 0", aufserhalb 50' 0"; nach den nachmittägigen Höhen von 88° — 91° aber innerhalb 15' 0", aufserhalb 50' 20".

Der Vormittag war äußerst günstig zu astronomischen Beobachtungen, indem die Luft rein und klar war. Der Nachmittag war es weniger des Windes und der Wolken wegen, doch besser als gestern, weswegen ich viele correspondirende Höhen erhielt. Auch der Mond kam endlich gut zum Vorschein, sobald er den Berg *Abu Kobès* überstiegen hatte; allein unglücklicherweise fand ich den Sextanten mehrere Grade zu klein, um die Distanzen zwischen Sonne und Mond zu messen. Gestern wäre es vielleicht noch möglich gewesen, wenn nur der Mond sichtbar gewesen wäre. Es würde mich sehr schmerzen, wenn man die am ersten Tage gemessenen Distanzen zur Längenbestimmung eines so wichtigen Ortes nicht hinreichend finden sollte. Doch hoffe ich es, weil ich

ich mir alle Mühe gab, den Gang der Uhr durch die Beobachtungen des zweyten und dritten Tages zu bestimmen.

*Astronomische Beobachtungen zu Hodêde, am arabischen Meerbusen in Jemen, den 11. April 1810
oder den 7. Rabia el Aûal 1225.*

Mond-Entfernungen
von der Sonne. Der D
war im Zunehmen.

85°	5'	0"	2U	22'	57"
	5	30		27	2
	6	40		29	31
	7	30		30	57
	8	0		32	18
	8	40		33	48
	9	20		36	20
	10	0		38	40
	10	25		40	44
	11	0		42	33
	11	30		44	5
	11	50		46	12

Obgleich der heutige Tag astronomischen Beobachtungen nicht vorzüglich günstig war, so glückte es mir doch, eine hinlängliche Zahl von einzelnen u. correspondirenden Höhen, so wie von Monds-Distanzen, zu erhalten. Ich hatte *Schech Hamse* bewogen, die Uhr zu zählen, mit dem Versprechen, ihm an jedem

Beobachtungstage ein gewisses Geschenk zu geben. Die erste Probe fiel glücklich aus, und er leistete mit in der Folge in diesem Stücke nützliche Dienste. Die Luft war oft bezogen, und die vielen kleinen Wolken störten mich bisweilen in der Beobachtung. Wir hatten eine Hütte zu unserm Logis erhalten, und ich stellte meine Observationen in dem kleinen Hofe vor derselben an. Da dieser aber eine hohe Einfassung von Baumästen und Schilf hatte, so verbarg sich die Sonne zu früh dahinter, und hinderte mich, nach den Monds-Distanzen mehr als fünf Sonnenhöhen zu nehmen.

Die

Die Collimation fand ich vor den vormittägigen Höhen von $103^{\circ} 40'$ innerhalb $13' 50''$, außerhalb $50' 40''$. Nach der Höhe von $113^{\circ} 20'$ innerhalb $14' 10''$, außerhalb $50' 30''$.

Nach der nachmittägigen Höhe von $103^{\circ} 40'$ innerhalb $14' 0''$, außerhalb $50' 40''$; nach der Höhe von $122^{\circ} 40'$ aber, innerhalb $14' 0''$, außerhalb $50' 20''$.

Correspondirende Sonnenhöhen					Einzelne vormittägige Höhen		
103° 40'	8 ^U	37' 36"	1 ^U	43' 16"	110° 40'	8 ^U	52' 24"
104 0		38 20		42 35	111 0		53 6
20		38 54?		42 52	20		53 48
40		39 40		41 13	40		54 30
105 0		40 25		40 32	112 0		55 15
110 0		50 59		30 9?	20		55 55
20		51 40		29 23	40		56 37
122 40	9	17 46?		3 28	113 0		57 21
123 0		18 29?		2 47	20		58 2
124 40		22 0	12	59 14	132 20	9	38 15
125 0		22 43		58 32	40		38 56
20		23 23?		57 47	133 0		39 39
40		24 6		57 8			
126 0		24 47		56 25			
20		25 30		55 41			
40		26 14?		54 59			
127 0		26 55		54 15			
129 20		31 54		49 17			
130 0		33 20		47 53			
20		34 2		47 11			
40		34 43		46 29			
131 0		35 25		45 47			
20		36 7		45 4			
40		36 50		44 20			
132 0		37 32		43 39			

Einzelne nachmittägige Höhen		
70° 0'	2 ^U	53' 17"
69 20		54 39
0		55 20
68 40		56 4
20		56 46

Astronomische Beobachtungen zu Bêt el Fakih in Jemen, den 16. April 1810, oder d. 12. Rabia el aual 1225, in dem Hofe unserer Wohnung, nahe am Basar.

Einzelne vormittägige Höhen			Noch einzelne vormittägige Höhen		
92°	0'	8 ^U 50' 5"	125°	20'	9 ^U 59' 51"
	20	50 48		40	10 0 32
	40	51 28	126°	0'	1 13
93°	0'	52 9		20	1 54
	20	52 50		40	2 40?
	40	53 32	127°	0'	3 18
94°	0'	54 15		20	3 58
	20	54 56		40	4 41
	40	55 36	128°	0'	5 22
95°	0'	56 19		20	6 5
Collimat. vor der Beobachtung:				40	6 45
Innerhalb 14' 0"			129°	0'	7 27
Aufserhalb 50 40			Collimat. nach der Beobachtung:		
Collimation nach derselben:			Innerhalb 14' 30"		
Innerhalb 14' 0"			Aufserhalb 50 30		
Aufserhalb 50 20					

Seit meiner Abreise von *Hodde* und den dort angestellten Observationen zog ich die Uhr täglich regelmäfsig auf, und dies setzte ich nachher immer fort. Ich wünsche, dafs es möglich seyn möge, aus ihrem Gange auch die Länge von dieser Stadt zu bestimmen. Der Mond war schon zu fern von der Sonne, um diese Entfernung messen zu können. Die Luft war mittelmäfsig gut; doch gab es leichte weisse Wolken. — Die Höhe von 126° 40' wurde durch Verzögerung meines Freundes im Zählen falsch beob-

beobachtet, wird aber durch die folgenden Höhen leicht berichtigt werden können.

Anmerkung: Ich muß hier ein für allemal bemerken, daß ich bey dem Höhennehmen bey dem directen Sonnenbilde immer das hintere rothe Glas vorschiebe; bey der Bestimmung des Collimations-Fehlers aber mich der grünen Gläser bediene, weil das rothe Glas zu sehr blendet, und das indirecte Sonnenbild zu blaß macht.

Astronomische Beobachtungen zu Sebä in Jemen, in der Nähe der großen Moschee im Hofe unseres Chān's, den 24. April 1810, oder den 20. Rabia el dual 1225.

Correspondirende Sonnen-Höhen

58° 20'	8 ^U 43' 7"	5 ^U 4' 14"
40	43 48	3 32
59 0	44 30	2 50
20	45 12	2 11
40	45 54	1 28
60 0	46 34	0 48
20	47 16	0 6
40	48 0	4 59 24
61 0	48 40	58 43
20	49 23	58 0
Collimat. nachher:	Collimat. nachher:	
Innerh. 13' 40"	Innerh. 13' 10"	
Außerh. 50 30	Außerh. 51 0	

Während diesen nachmittägigen correspondirenden Höhen war die Luft klar, und ich hoffe, daß diese weit vom Mittage genommenen Höhen den Gang der Uhr genau angeben werden.

Wolkiger Luft wegen war es mir nicht möglich, zu den vormittägigen Höhen von 112° bis 116° correspondirende zu erhalten.

Vormittägige einzel- ne Höhen				Mond - Distanzen von der Sonne. Der Mond rechts, im Abnehmen.			
112°	0'	10 ^U	34' 25"	119°	15'	30"	7 ^U 51' 1"
	20		35' 8"		15'	30"	52' 57"
	40		35' 49"		14'	50"	57' 5"
113	0		36' 31"		13'	20"	8' 43"
	20		37' 13"		11'	30"	4' 9"
	40		37' 54"		10'	10"	7' 8"
114	0		38' 34"		9'	0"	10' 47"
	20		39' 17"		8'	20"	13' 9"
	40		39' 59"		7'	0"	16' 12"
115	0		40' 39"		6'	30"	18' 34"
	20		41' 20"		4'	50"	21' 19"
	40		42' 2"		4'	0"	24' 7"
116	0		42' 41"	118	40'	30"	9' 18' 18"
Nachmittägige einzel- ne Höhen					39'	30"	20' 18"
61°	40'	4 ^U	57' 20"		38'	30"	22' 25"
62	0		56' 39"		37'	10"	24' 18"
72	0		35' 51"		36'	20"	26' 24"
71	20		37' 13"		35'	0"	28' 38"
	0		37' 52"				
70	40		38' 35"				
	20		39' 16"				

Die Luft war ziemlich klar, und ich fand heute, daß der zwanzigste Tag des Mond-Alters sehr bequem zur Beobachtung seiner Entfernungen von der Sonne sey.

*Astronomische Beobachtungen zu Szannâ (Sana),
der Hauptstadt Jemen's, auf der Terrasse des Sim-
serét Mohammed Ibn Häffan *) d. 23. Jun. 1810,
oder 21. Dschemmâd el âual 1225.*

Vormittägige einzel-
ne Sonnen-Höhen

55°	20'	9 ^U	14	56"
	40		15	40
56	0		16	25
	20		17	10
	40		17	53
57	0		18	38
72	0		51	35
	20		52	19
	40		53	3
73	0		53	47
	20		54	29
	40		55	13
74	0		55	59
	20		56	42
	40		57	26
124	20	11	47	14
	40		47	59
125	0		48	43
	20		49	30?
	40		50	12
126	0		50	59?
	20		51	45
	40		52	30
127	0		53	14
	20		53	57

Die lange verzögerte Wie-

derherstellung meiner Gefund-
heit nach der gefährlichen
Krankheit zu *Dorân* machte
es, daß ich die astronomischen
Beobachtungen zu *Szannâ* bis
kurz vor unserer Abreise von
dort verschob. Die zwey vor-
hergehenden Tage waren trü-
be, und dies mußte ich sehr
bedauern, weil es heute we-
gen des hohen Standes des
Mondes schon nicht mehr
möglich war, Mond - Distan-
zen zu messen. Ueberhaupt
war der heutige Tag den Ob-
servationen ungünstig; zwar
hatte der Vormittag eine klare
Luft, allein des Nachmittags
wurde sie bezogen, weswe-

gen ich keine correspondirende Sonnenhöhen erhal-
ten konnte. Seit unserer Ankunft in *Dorân* war die
Uhr nicht aufgezogen worden, weil durch einen
Zufall, durch meine Krankheit veranlaßt, das Uhrglas
zerbrach. Vom Anfange dieser Beobachtungen aber
gieng

*) Mitten im Bafâr.

gieng die Uhr bis jetzt ununterbrochen fort, welches ich hier zum Voraus erinnere, damit diejenigen, welche etwa diese Beobachtungen berechnen, sich darnach richten können.

Es that mir sehr leid, keine Observationen zur Bestimmung der Länge einer so berühmten Stadt machen zu können, und ich bedauere dies um so mehr, da der verdienstvolle Justizrath *Niebuhr*, so viel ich weifs, die Länge davon nicht bestimmt hat. Sollte ich indessen *Szannâ* zum zweytenmale besuchen, wie noch jetzt meine Absicht ist, so hoffe ich diesem Mangel abzuhelpen.

Astronomische Beobachtungen in Damâr, auf dem Dache unsers Logis in der Nähe des Basar d. 3. Julius 1810, oder den 1. Dschemmâd el tâny 1225.

Vormittägige einzelne Sonnen-Höhen

80° 0'	12 ^U 4' 6"	Collimation: 1) Vorher, innerh. 13' 40" 30 0 20 ausserh. 50 2) Nachher, innerh. 14 ausserh. 50	119° 40'	1 ^U 31' 44"	Collimation nachher: Innerhalb 13' 20" Ausserhalb 50 40
20	4 50		120 0	32 36	
40	5 33		20	33 14	
81 0	6 17		40	33 58	
20	7 1		121 0	34 42	
40	7 44		20	35 27	
82 0	8 28		40	36 12	
20	9 11		122 0	36 57	
40	9 54		20	37 40	
83 0	10 38		40	38 24	
			123 0	39 10	

Der Mond war nicht sichtlich.

Astronomische Beobachtungen zu Äbb, in einem
Chân, den 10. Jul. 1810, oder den 8. Dschem-
mâd el tâny 1225.

Correspondirende Sonnen-Höhen

83° 20'	1 ^U	11'	11"	7 ^U	52'	51"
40		11	55		52	8
84 0		12	37		51	23
20		13	22		50	40
40		14	4		49	58
85 0		14	46		49	16
20		15	32		48	31
40		16	15		47	48
86 0		16	58		47	3
40		18	25		46	37
87 0		19	7		45	55

Collimation nachher:
Innerhalb 13' 20"
Außerhalb 30 30

 Einzelne vormittägige
Höhen

86° 20'	1 ^U	17'	40"
108 20	2	5	42
40		6	25
109 0		7	10
20		7	53
40		8	38
110 0		9	21
20		10	4
40		10	47
111 0		11	31
20		12	24
40		13	0
112 0		13	40
20		14	26
40		15	9
113 0		15	53
Collim. innerh.	13'	30"	
aufserh.	50	30	
124° 40'	2 ^U	41'	32"
125 0		42	14
20		42	59
40		43	42

Anmerkung:

Da die Uhr immer seit den
Beobachtungen in Szannâ auf-
gezogen, so wird man aus ih-
rem Gange sehen können, daß
sie sehr stark voreilte. — Ich
hatte mir heute geschmei-
chelt, auch Mond-Distanzen
von der Sonne messen zu
können; allein die Luft wur-
de des Nachmittags, wo er
zum Vorschein kommen muß-
te, ganz mit Wolken bezogen,
weil es in dieser Jahrszeit fast
täglich regnet. Während den
vormittägigen Beobachtungen
von 108° bis 113° fand ich
nachher, daß sich der künst-
liche

Einzelne vormittägige Höhen				liche Horizont um $1\frac{1}{2}$ Linien von der Horizontalfläche ge-
126°	0	2 ^U	44' 28"	senkt hatte, und bey den
	20		45' 14"	correspondirenden nachmittä-
	40		45' 58"	gigen Höhen fand ich auch
127	0		46' 41"	eine kleine Abweichung. Ich
	20		47' 25"	hatte gerade diesmal den höl-
	40		48' 10"	zernen Horizontträger genom-
128	0		48' 55"	

men, statt dessen ich mich sonst immer des zinnernen bediene. Da die Sonne nicht sehr heiss schien, so sieht man daraus, daß hölzerne Horizontträger in dem Klima der Tropik nicht anwendbar sind.

Astronomische Beobachtungen in dem Hofe unsers Logis zu Lähhak oder Häuta, Residenz des sogenannten Sultans von Aden, den 21. Jul. 1810, oder 19. Dschemmäd el tany 1225.

Einzelne vormittägige Sonnenhöhen			
118° 20'	4 ^U	24' 26"	
40		25' 11"	
119	0	25' 55"	
20		26' 39"	
40		27' 23"	
120	0	28' 6"	
20		28' 50"	
40		29' 34"	
121	0	30' 17"	
20		31' 0"	
127	20	44' 6"	
40		44' 50"	
128	0	45' 32"	
20		46' 19"	
40		47' 2"	

Anmerkung:

Da ich wußte, daß heute am neunzehnten Tage des Mondalters der Mond eine vortheilhafte Lage haben mußte, um seine Distanz von der Sonne zu messen: so freute ich mich schon im Voraus darauf, daß aus meinen Beobachtungen die Länge dieses Orts hervorgehen werde. Allein zu meinem großen

Leide umwölkte sich des Morgens die Luft so sehr mit leichten Wolken, daß der Mond nicht sichtlich war,

war. Es war mir nur erlaubt, etliche einzelne vormittägige Sonnenhöhen zu nehmen. Man muß sich durch die Angabe der Zeit nicht irre machen lassen, indem die Uhr sehr stark voreilt,

Astronomische Beobachtungen in A'den, im Hofe unsers Hütten-Logis, den 23. Julius 1810, oder

21. Dschemmâd el tany 1225.

Mond-Distanzen von der Sonne; der Mond rechts im Abnehmen.

91° 49' 20"	1 ^U	28' 50"	90° 54' 30"	4 ^U	23' 33"
48 40		31 30	54 0		27 0
47 0		35 32	50 40		32 42
47 20		39 10	49 30		35 54
45 0		44 24	48 0		39 37
44 40		48 33	46 40		42 56
43 20		52 30	46 30		45 35
42 30		56 5	44 20		49 44
41 20	2	0 5	42 30		53 30
40 0		4 17	40 0		59 11

Correspond. Sonnen-Höhen

49° 0'	2 ^U	15' 31"	11 ^U	21' 18"
20		—		20 35
40		16 56		19 52
50 0		17 41		19 10
20		18 23		18 27
40		19 6		17 43
51 0		19 48?		17 1
20		20 34		16 19
40		21 15		15 36
52 0		21 58		14 53
20		22 40		14 10
40		23 24		13 27
53 0		24 5		12 44

Collimat. nachher: Coll. nachh.

innerhalb 13' 0" inner. 13' 20"
außerhalb 50 30 auß. 50 50

Anmerkung:

Die Luft war diesen Morgen sehr rein, gestern aber bezogen und der Mond nicht zu sehen. Ich zweifelte, daß es mir möglich seyn würde, Mond-Distanzen zu nehmen; aber es glückte mir, obgleich vormittags mit Mühe, indem der Mond fast

Einzelne vormittägige Höhen				fast senkrecht über mir stand.
129	0	5 ^U	7' 25"	Ich nahm gleich darauf mehrere Sonnenhöhen. Die spä-
	20		8 8	tern Mond - Distanzen wurden mir sehr leicht zu nehmen,
	40		8 53	obgleich jetzt der Mond weit blässer war, als vorhin,
130	0		9 37	und also sein Rand weniger deutlich. Bey den ersten Beobachtungen der Mond - Distanzen sahe ich nicht nach
	20		10 20	der Uhr, welches ich aber bey
	40		11 4	den andern that. Indessen
131	0		11 45?	hoffe ich, daß mein Freund die Zeit immer richtig angegeben habe.
	20		12 31	
	40		13 16	
132	0		14 0	
	20		14 44	
	40		15 27	
Collim. innerh. 13' 30"				
nachh. außerh. 50 30				

Da die Hütten - Wohnungen gewöhnlich einen kleinen eingeschlossenen Hof vor sich haben, wo man für die zudringliche, hindernde und oft gefährliche Neugierde der Einwohner eines Orts gesichert ist, so empfehle ich sie allen künftig im Orient Reisenden. Die platten Dächer oder Terrassen der Häuser müssen ihnen oft nachgesetzt werden, weil sie nicht immer fest und unbeweglich genug sind, statt daß man diesen übeln Umstand nie bey dem bloßen Erdboden jener Höfe zu befürchten hat.

Ich wünsche, daß die astronomische Bestimmung der geographischen Lage einer so alten und vormals so hoch berühmten Handelsstadt den Geographen willkommen seyn möge.

XLI.

Auszug aus einem Briefe,

— Mit Vergnügen habe ich im vorletzten Hefte die Anzeige von Herrn Gerling's Dissertation über die Anwendung der orthographischen Projections-Methode auf die parallactischen Rechnungen gelesen; und bin dadurch auf die nähere Kenntniß der Schrift selbst begierig gemacht worden. Als Lehrer der Mathematik interessirte mich die Bemerkung, wie es dem berühmten Göttingischen Lehrer in wenigen Jahren gelungen wäre, mehrere so ausgezeichnete Schüler zu bilden. Gewiß wirkt das Beyspiel eines in irgend einem Fache grossen Mannes auf fähige Gemüther, und mancher wird vielleicht dadurch zu einem Studium geweckt, dem er sich sonst nicht gewidmet hätte. Aber es ist auch nicht zu läugnen, daß eben ein solcher Mann von denenjenigen *aufgesucht* wird, die Lust und Neigung fühlen, sich durch ihn bilden zu lassen; und daher ist es möglich, daß sich in kürzerer Zeit eine grössere Zahl fähiger Schüler um ihn versammle, als da, wo nicht die Wahl, sondern der Zufall die Schüler dem Lehrer zuführt. Und der Umstand, daß die genannten Schüler lauter Nord-Deutsche sind, hat wol seinen Hauptgrund in der geographischen Lage jener Universität, und in den politischen Verhältnissen, die seit einigen Jahren Deutschland getheilt haben. Sonst möchte wol die
bey

bey dieser Stelle gemachte Anmerkung, die Sie vielleicht übersehen haben, da sie Ihren sonstigen liberalen Gesinnungen ganz entgegen ist, noch ihre große Einschränkung leiden. Denn ich brauche Sie nicht an die Namen eines *Triesnecker*, *Bürg*, *Wurm*, *Bohnenberger*, *Pfleiderer*, *Pfaff*, *Kramp* u. a. zu erinnern, die den Credit der Süd-Deutschen in der Astronomie und Mathematik rühmlichst unterhalten. Und wann hätten wir wol mehr Ursache gehabt als jetzt, zu wünschen, daß der gehässige Unterschied zwischen Nord- und Süd-Deutschen aufhörte die Gemüther zu entzweyen, und die Bewohner Germaniens, so wie durch eine gemeinschaftliche Sprache, so durch ein gemeinschaftliches Interesse sich zu *Einer Nation* vereinigten! *)

*) Auf das verbindlichste danke ich dem Verfasser des vorstehenden Briefes für die passende Berichtigung einer die Gränzen des Wahren überschreitenden Bemerkung. Ich stimme dem hier ausgesprochenen Wunsche allgemeiner deutscher Einigkeit um so lebhafter bey, je lebendiger meine Theilnahme an *Aufrichtung* und *Erhaltung* unseres deutschen Vaterlandes ist.

XLII.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Professor Buzengeiger.

Ansbach, den 23. April 1812.

... Jetzt habe ich auch die schöne Abhandlung von Herrn Bessel, *Untersuchung der durch das Integral $\int \frac{dx}{1x}$ ausgedrückten Function*, im ersten Stücke des Königsberger Archivs gelesen, und dabey den Hallischen Recensenten von Hrn. Soldner's Schrift erkannt. Zu dem, was ich dabey bemerkt habe, gehört noch folgendes:

Herr Bessel kömmt pag. 20 auf die Gleichung

$$\frac{1}{n} - \frac{z}{1.(n+1)} + \frac{z^2}{1.2.(n+2)} - \frac{z^3}{1.2.3.(n+3)} + \text{etc.} = e^{-z} \left(\frac{1}{n} + \frac{z}{n(n+1)} + \frac{z^2}{n(n+1)(n+2)} + \text{etc.} \right)$$

Er sagt darüber: "Es schien mir interessant, diese bemerkenswerthe Gleichung allgemeiner, und unabhängig von der Bedingung, daß n , wie hier, eine ganze Zahl ist, herzuleiten." Diese Ableitung ist nun zwar sehr interessant, aber man sieht, daß es ihm entgangen ist, zu bemerken, daß dieser Satz nur ein besonderer Fall von einem sehr allgemeinen Satze ist. Euler giebt im 2ten Theile seiner Differenzen-

renzial-Rechnung Cap. II. §. 27 denselben an. Es ist nämlich

$$A + \frac{Bx}{1} + \frac{Cxx}{1.2} + \frac{Dx^3}{1.2.3} + \text{etc.} =$$

$$e^x \left(A + \frac{x \Delta A}{1} + \frac{xx \Delta^2 A}{1.2} + \frac{x^3 \Delta^3 A}{1.2.3} + \text{etc.} \right)$$

wo $\Delta A = B - A$, $\Delta^2 A = C - 2B + A$ u. s. w. Man kommt unmittelbar dazu, wenn man

$$A + \frac{Bx}{1} + \frac{Cxx}{1.2} + \text{etc.} \text{ mit } e^{-x} \text{ multiplicirt.}$$

Euler leitet ihn aber aus einem noch allgemeinem Theoreme ab.

Nachher kommt Herr Bessel auf den Satz

$$\frac{4}{\pi} = \frac{lix - lix^{-1}}{lix} \cdot \frac{(lix - lix^{-1})(lix^3 - lix^{-3}) \dots}{(lix^2 - lix^{-2})} \dots$$

den Sie früher schon mir mitzutheilen die Güte hatten. Wenn er ihn aber als eine Verbindung der Integral-Logarithmen mit der Quadratur des Kreises ansieht, so ist dieses ein Irrthum, wenn der Satz selbst auch wahr wäre; denn man erhält ihn für jede beliebige Function. Allgemein kann man jede Function $f(x)$ in eine Reihe verwandeln, die nach den Potenzen von lx fortgeht. Man setze daher

$$f(x) = A + A'lx + A''(lx)^2 + A'''(lx)^3 + \text{etc.}$$

so ist, wenn $\frac{1}{x}$ für x gesetzt wird,

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = A - A'lx + A''(lx)^2 - A'''(lx)^3 + \text{etc.},$$

also

$$\frac{f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right)}{2A'lx} = 1 + \frac{A'''}{A'}(lx)^2 + \frac{A^{iv}}{A'}(lx)^4 + \text{etc.} = F(x).$$

Nimmt

Nimmt man also den Logarithmen von $F(x)$, und setzt

$$l F(x) = B'(lx)^2 + B''(lx)^4 + B'''(lx)^6 + etc.$$

so ist, wenn man nach und nach xx , x^3 u. f. w. statt x setzt,

$$l F(xx) = 2^2 B'(lx)^2 + 2^4 B''(lx)^4 + 2^6 B'''(lx)^6 + etc.$$

$$l F(x^3) = 3^2 B'(lx)^2 + 3^4 B''(lx)^4 + 3^6 B'''(lx)^6 + etc.$$

u. f. w.,

woher durch Anwendung des Satzes

$$1 - 2^{2n} + 3^{2n} - 4^{2n} + etc. = 0$$

folgt

$$l F(x) - l F(xx) + l F(x^3) - l F(x^4) + etc. = 0.$$

Und so folgt

$$\frac{4}{\pi} = \frac{f(x) - f(\frac{1}{x})}{A' lx} \cdot \frac{[f(x) - f(\frac{1}{x})][f(x^3) - f(\frac{1}{x^3})] \dots}{[f(xx) - f(\frac{1}{xx})]^2}$$

$$\left(A' = \frac{df(x)}{dx} \text{ für } x = 1 \right)$$

Für $f(x) = x$ kommt

$$\frac{4}{\pi} = \frac{x - \frac{1}{x}}{lx} \cdot \frac{(x - \frac{1}{x})(x^3 - \frac{1}{x^3})}{(xx - \frac{1}{xx})^2} \cdot \frac{(x^3 - \frac{1}{x^3})(x^5 - \frac{1}{x^5})}{(x^4 - \frac{1}{x^4})^2} \dots$$

$$= \frac{xx-1}{x lx} \left(1 - \frac{xx(xx-1)^2}{(x^4-1)^2} \right) \left(1 - \frac{x^6(xx-1)^2}{(x^8-1)^2} \right) \left(1 - \frac{x^{10}(xx-1)^2}{(x^{12}-1)^2} \right) \dots,$$

welcher Satz aber offenbar nicht wahr ist. Der Satz

$$1 - 2^{2n} + 3^{2n} - 4^{2n} + etc. = 0$$

muss mit der größten Vorsicht angewandt werden; er führt hundertmal irre, bis er ein einzigesmal Wahrheit giebt. Die Summe

I —

$$1 - 2^{2n} + 3^{2n} - 4^{2n} + \text{etc.} = 0$$

ist eine analytische Summe. Die Reihe

$$1 - 2^n x + 3^n x x - 4^n x^3 + \text{etc.}$$

entspringt aus der Entwicklung der GröÙe

$$\frac{{}^n C^1}{1+x} - \frac{{}^{n-1} C^2 x}{(1+x)^2} + 1.2. \frac{{}^{n-2} C^3 x x}{(1+x)^3}$$

$$- 1.2.3. \frac{{}^{n-3} C^4 x^3}{(1+x)^4} \dots$$

$$= 1.2.3. \dots n \frac{x^n}{(1+x)^{n+1}}$$

${}^r C^m$ bedeutet hier allgemein die r te Classe der Combinationen mit Wiederholungen aus m Elementen des Index 1, 2, 3, 4, u. f. w. Für $x=1$ verschwindet dieser Ausdruck für jedes gerade n ; für ein ungerades n , z. B. für $n=2m-1$ wird er

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left({}^{2m-1} C^1 - \frac{1}{2} {}^{2m-2} C^2 + \frac{1.2}{2^2} {}^{2m-3} C^3 \right. \\ & \quad \left. - \frac{1.2.3}{2^3} {}^{2m-4} C^4 \dots \pm \frac{1.2.3 \dots (2m-1)}{2^{2m-1}} \right) \\ & = \pm \frac{2^{2m-1}}{2^{2m}} \mathfrak{B}^M, \end{aligned}$$

wo \mathfrak{B}^M die m te Bernoulli'sche Zahl bedeutet. Und so läßt sich also jede der Bernoulli'schen Zahlen unabhängig von den vorhergehenden aus den Combinationen mit Wiederholungen für den Index 1, 2, 3, 4, u. f. w. berechnen. Auch aus den Combinationen ohne Wiederholungen für denselben Index lassen sich die Bernoulli'schen Zahlen finden. So ist

wo

$$\begin{aligned} \pm \frac{B^m}{2m} &= \frac{1}{4m} {}^{2m}C^{4m-1} - \frac{1}{4m-1} \left[\frac{4m}{1} \right] {}^{2m}C^{4m-2} \\ &+ \frac{1}{4m-2} \left[\frac{4m}{2} \right] {}^{2m}C^{4m-3} \dots \\ &- \frac{1}{2m+1} \left[\frac{4m}{2m-1} \right] {}^{2m}C^{2m}, \end{aligned}$$

wo allgemein nach Euler's Bezeichnung $\left[\frac{p}{r} \right]$ den r ten Binomial-Coëfficienten der p ten Potenz bedeutet.

$+$ oder $-$ gilt, je nachdem m gerade oder ungerade ist.

XLIII.

Beobachtungen der Venus, in der Nähe ihrer Zusammenkunft mit der Sonne.

Auf der Sternwarte à la Capelle bey Marseille angestellt.

Die obere Zusammenkunft der Venus mit der Sonne ereignete sich den 25. May 1813. Es war wenig Hoffnung, daß wir diesen Planeten mit unsern lichtschwachen Instrumenten, insonderheit mit dem 12zolligen Kreife, bis zu seiner Conjunction würden verfolgen können. Erstlich gieng der Planet der Sonne zu nahe vorbey, zweytens war sein scheinbarer Durchmesser nicht gröfser als 10". Indessen liefsen wir es nicht unversucht, den Planeten so nahe als möglich an die Sonne zu begleiten. Auch mit dem kleinen Fernrohre des Kreifes gelang es uns, den Planeten zu erblicken; allein es war nicht sowohl das *Sehen*, als ein anderer Umstand, welcher die Beobachtungen am Kreife erschwerte und unzuverlässig machte. Die allzusehnelle Erwärmung dieses Werkzeuges durch die Sonne brachte eine solche Wandelbarkeit und Verschiedenheit im Collimations-Fehler hervor, daß wir es für rathsaamer hielten, uns an die am Mittags-Fernrohre beobachteten geraden Aufsteigungen allein zu halten, als solche durch zweifelhafte Declinationen zu verderben. Wir haben daher diese

diese geraden Aufsteigungen mit den neuesten v. *Lindenau'schen* Venus-Tafeln verglichen, und folgende gut übereinstimmende Resultate erhalten :

1813	Mittl. Z. à la Ca- pelle	Beobach- tete scheinba- re gerade Aufsteig. der ♀	Aber- rat. +	Nut. +	Beobacht. wahre gerade Aufsteig. der ♀	Berechn. wahre gerade Aufsteig. der ♀	Fehler der Tafeln in gerader Aufst.
May 8	23 39 58,7	41 54 40,5	43,6	11,1	41 55 35,2	41 55 40,0	— 4,8
9	23 41 2,5	42 7 19,2	43,7	11,2	43 8 14,1	43 8 21,0	— 7,8
15	23 46 40,6	50 29 18,3	44,2	11,6	50 30 6,2	50 30 19,7	— 10,5
16	23 47 51,4	51 43 48,4	44,3	11,7	51 44 44,4	51 44 54,4	— 10,0
Mittlerer Fehler							— 8,5

XLIV.

N a c h t r a g

zur Untersuchung über *Maldonado's*
Schiffahrt.

Aus einem frühern Hefte dieser Zeitschrift sind unsere Leser mit Hrn. *Amoretti's* und unserer Ansicht über *Maldonado's* angebliche Umschiffung des nord-westlichen Continents von Amerika bekannt geworden. Die von uns angefochtene Authenticität jener Umschiffung hat *Amoretti* neuerlich durch einen, im *Journal de Paris* eingerückten, Brief zu vertheidigen gesucht, und wir waren schon im Begriff, die, eben keine Nachforschungen oder besonderes Nachdenken und Mühe erfordernde, Beantwortung jener, nicht auf Gründen, sondern nur auf bloßen Voraussetzungen und ganz unbestimmten Annahmen beruhenden, Behauptungen hier abdrucken zu lassen, als das 63te Heft von *Malte-Brun's* interessanten

Annales des voyages in unfere Hände kam. Das geographiſche Urtheil eines *Malte-Brun* gilt uns zu viel, als daß wir irgend davon abweichen möchten, und wir begnügen uns daher, das dort (S. 393) über dieſen Gegenſtand Gefagte hier wörtlich abdrucken zu laſſen :

Note ſur une réplique de M. Charles Amoretti.

Nous avons annoncé dans le *Bulletin* N°. 57, pag. 390, le *Voyage de Ferrer Maldonado*, publié par M. Amoretti, et la ſavante réfutation que M. le Baron de Lindenau a donnée, des opinions de l'éditeur italien ſur la réalité de la prétendue navigation de ce marin. M. Amoretti a fait iſſuer dans un journal une lettre où il prétend répliquer victorieuſement aux argumens de M. de Lindenau. Si Maldonado a mal calculé les latitudes et les longitudes de manière à faire paſſer ſon vaiſſeau par-deſſus le continent, c'eſt, ſelon M. Amoretti, une petite erreur pardonnable à un marin du ſeizième ſiècle. Si ce marin a évidemment copié des cartes antérieures à ſon voyage, avec toutes les fautes, c'eſt une preuve de la réalité de ſon voyage. Si, par malheur, ſa deſcription phyſique des lieux qu'il prétend avoir vus eſt contraire à tout ce qu'en diſent les navigateurs modernes, c'eſt parce qu'apparemment un tremblement de terre en a changé l'état ! — Tout cela eſt, comme on voit, totalement étranger à la géographie critique de nos jours ; une ſemblable manière d'argumenter n'admet et n'exige aucune réponſe.

XLV.

XLV.

Nachricht von einer Sonnenfinsternis
im Jahre 1239.

Im Dorfe *Mirabeau* *) in der Provence, zwischen den Städtchen *Pertuis* und *Manosque*, befindet sich auf der Thür einer Kapelle, welche am Fusse der Durance auf einem senkrechten Felsen erbauet ist, eine Inschrift, welche besagt, *dass im Jahre 1239 aux Nones de Fevrier eine totale Sonnen-Finsternis eintrefften sey*. Nun findet, nach *Pingré's Chronologie des Eclipses* in der *Art de vérifier les dates*, keine solche Finsternis um diese Zeit statt; wie lässt sich daher diese Inschrift rectificiren oder commentiren? oder ist sie wirklich nur eine Geburt der Unwissenheit? Eine Sonnenfinsternis, und zwar eine totale, in einem Lande, wo der Himmel so selten bewölkt ist, ist eine zu auffallende Erscheinung, als dass hierinn ein so grober Irrthum statt finden könnte.

*) Stammhaus des berühmten *Riqueti Comte de Mirabeau*.

LXVI.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Professors Gerling.

Cassel, den 4. Jul. 1813.

... Nach der Dissertation von dem verstorbenen Professor *Matsko*, deren Ew. Hochwohlgeb. in Ihrem Schreiben erwähnen, habe ich auf hiesiger Bibliothek gesucht. Ich finde aber nur zwey Programme bey dem Prorektorats-Wechsel am ehemaligen hiesigen *Carolino* (von 1770 und 1781), welche astronomische Beobachtungen enthalten. Alles, was darin auf die geographische Lage von Cassel Beziehung hat, ist folgendes:

1770 d. 26. Jun. Emerfion des I. ♄ Trab. ... 10^h 23' 7,"6 w. Z.
 28. Jul. 9 54 25, 4

Bey beyden ist die Zeitbestimmung nicht ganz sicher.

1778 d. 11. Jun. Meridianhöhe von β Urs. min. 66° 12' 30"
 α Coronae 66 6 0,

woraus ich die Polhöhe = 51° 19' 26,"5 finde.

1779 d. 4. Jan. Morgens, Immerf. γ Cancr. ... 4^h 1' 17" w. Z.
 Emerf. 5 55 40

Hier ist doch wol einmal die Stunde verschrieben.

28. Feb. Morgens, Immerf. γ Cancr. ... 1^h 7' 26" w. Z.
 Emerf. 2 0 35

25. März Abends, Emerf. des I. ♄ Trab. ... 8^h 13' 27,"2
 Dabey ist angegeben *Stockholm*: 8^h 47' 22"

1. April Abends, Emerf. des I. ♄ Trab. ... 10^h 9' 51"
 Dabey findet sich *Paris*: 9^h 41' 32"; *Kopenhagen*: 10^h 22' 17"

14. Jun. Morg., Sonnenfinsterniß Anf. 8^h 7' 27,"3
 Ende 9 20 59, 5

XLVII.

Anzeige und Berichtigung
einiger

Druck- und Schreibe-Fehler

von

B. Nicolai.

I. In den vor kurzem herausgekommenen v. Lindenau'schen Merkurs-Tafeln.

Dasselbst ist S. 6 der Vorrede die Z. 10 v. u. befindliche Differential-Formel aus dem unmittelbar vorhergehenden Ausdrucke $\sin D = \frac{\tan \beta}{\tan i}$ nicht ganz richtig abgeleitet worden. Statt

$$dD = d\beta \frac{\tan D}{\sin \beta} - di \tan D \cotg i$$

muß es heißen:

$$dD = d\beta \frac{2 \tan D}{\sin 2\beta} - di \frac{2 \tan D}{\sin 2i}$$

Da hier von den Durchgängen des Merkurs durch die Sonne die Rede ist, wo also β (heliocentrische Breite) immer einen ziemlich kleinen Werth hat, so ist in so fern der Factor von $d\beta$ in der letztern Formel mit dem in der erstern identisch. Diese wird daher nur in Ansehung ihres zweyten Theils einer Correction bedürfen. Man erhält sie dadurch, daß man zu der Formel noch das Glied $- di \tan D \tan i$ hinzu-

hinzufügt (weil $\frac{2}{\sin 2i} = \cotg i + \tang i$). Da nun aber beym Mercur $i = 7^\circ$, und D bey den Durchgängen ebenfalls eine kleine Gröſſe iſt, ſo ſieht man leicht, daſs jene Correction von $- di \tang D \tang i$ zu unbedeutend iſt, um die nach Hrn. v. Lindenau's Ausdrücke berechneten numerifchen Werthe merklich zu ändern. Hieraus geht hervor, daſs die daraus abgeleiteten, auf S. 9 befindlichen, Resultate für Knoten, Neigung und Venus-Maſſe in dieſer Rückſicht keine Aenderung erleiden.

Auſſerdem iſt S. 6 Z. 17 v. o. ſtatt d zu ſetzen λ .

II. In der Monatl. Correſp. Bd. XXVI.

1. S. 210 iſt die letzte Columnne, welche die Epochen der Sonne von 1796 bis 1827 enthält, unrichtig, und es muſs ſtatt ihrer folgende ſubſtituirt werden:

Jahre	☉ Epoche	Jahre	☉ Epoche
1796 B.	100, 3	1812 B.	48, 5
1797	86, 0	1813	34, 1
1798	71, 6	1814	19, 8
1799	57, 3	1815	5, 5
1800 C.	43, 0	1816 B.	50, 3
1801	28, 6	1817	36, 0
1802	14, 3	1818	21, 6
1803	0, 0	1819	7, 3
1804 B	44, 8	1820 B.	52, 1
1805	30, 5	1821	37, 8
1806	16, 2	1822	23, 5
1807	1, 8	1823	9, 1
1808 B.	46, 6	1824 B.	54, 0
1809	32, 3	1825	39, 6
1810	18, 0	1826	25, 3
1811	3, 7	1827	11, 0

Auch

Auch sind außerdem die Epochen für 1741 und 1780 zu verbessern, von denen bey der erstern 60, 2 statt 70, 2, bey der andern 92, 9 statt 32, 9 zu setzen ist.

2. S. 212 muß die Epoche des Mond-Knotens für 1811, $5^S 28^\circ 4', 5$ in $5^S 28^\circ 14', 5$ abgeändert werden. Derselbe Irrthum findet sich bey den beyden, auf S. 209 unter Nro. 2. und 3. aufgeführten, Beyspielen, wo man also den Ort des Mond-Knotens für den 1. October 1811 aus Nro. 2. $5^S 16^\circ 1', 9$, aus Nro. 3. $5^S 16^\circ 2', 0$ erhält. Mithin fällt nun auch die unmittelbar darauf folgende Behauptung weg, daß die *Conn. des tens* den Ort des Mond-Knotens in dem Jahrgange 1811 durchgehends um 10' zu groß angäbe, welches keinesweges der Fall ist.

Eben so ist statt der Epoche für 1793, $5^S 16^\circ 9', 0$, zu substituiren $5^S 16^\circ 19', 0$.

III. In der Monatl. Corresp. Bd. XXVIII.

(Angezeigt vom Herrn Prof. Gauß)

S. 40 ganz unten, statt *und dessen*, lese man: *und deren*.

S. 42 Z. 12 v. o. statt *je nachdem der Cosinus spitzig oder stumpf ist* lese man: *je nachdem man den Cosinus eines spitzen oder stumpfen Winkels hat*.

Dasselbst Z. 12 v. u. statt *Gleichheit der Glieder* lese man: *gerader Anzahl der Glieder*.

S. 45 Z. 12 und 13 v. o. statt *gleich oder ungleich* lese man: *gerade oder ungerade*.

S. 51 Z. 3 v. o. fehlt zwischen *seyn müssen*, und *Da* folgender Satz: „In diesem krummen Theile ist
Mon. Corr. XXVIII. B. 1813. C c aber

aber $d\Sigma$ mit $d\Sigma$ einerley, und $\theta = 180^\circ - MX$; hieraus geht hervor, daß das Integral $-\int d\Sigma \cos MX$, über die halbe Kugelfläche ausgedehnt, $= -J$ wird."

Dasselbst Z. 9 v. o. statt Π setze man π .

Dasselbst Z. 5, 11, 12, 16 v. o. und 2, 4 v. u. setze man überall QX statt MX .

S. 52 Z. 6 v. o. statt MY , MZ setze man: QY , QZ .

Dasselbst Z. 9 und 10 v. o. ist ebenfalls statt MX , MY , MZ zu substituiren: QX , QY , QZ .

S. 54 Z. 8 und 9 v. u. statt $r \sin MZ$, $r \sin MY$ lese man: $r \cos MZ$, $r \cos MY$.

S. 55 Z. 6 v. u. statt *Da aber* lese man: *Wenn nun*.

S. 56 Z. 2 v. o. statt *Außerdem* lese man: *Im entgegengesetzten Falle*.

S. 128 Z. 4 v. o. statt *inner- oder auferhalb* lese man: *aufser- oder innerhalb*.

S. 129 Z. 9 v. o. statt $-\frac{4\pi\alpha\beta\alpha}{\alpha\beta\gamma}$ lese man: $-\frac{4\pi\alpha\beta\alpha}{\alpha\beta\gamma}$.

Dasselbe ist Z. 12 zu verbessern.

S. 130 Z. 5 und 8 v. u. muß abermals statt α substituirt werden a .

* * *

Im gegenwärtigen *October*-Hefte muß S. 326 bey der *Bouvard*'schen Beobachtung am 5. März 1805 in der Declination statt $59'$ gelesen werden $54'$.


I N H A L T.

Seite

XXXV. Ueber die geographische Lage der Stadt Bamberg und der Altenburg, sonst die Babenburg genannt	297
XXXVI Stern-Verzeichniß vom Hrn. Prof <i>Harding</i>	310
XXXVII. Untersuchung über die größten nördlichen und südlichen heliocentrischen Abstände der Planeten von der Ecliptik	313
XXXVIII. Berechnung der Opposition der Juno im Jahre 1810 von <i>Bernhard Nicolai</i>	340
XXXIX Fortgesetzte Nachrichten über die Pallas, (Vergl. <i>Mon. Corresp.</i> Bd. XXVI. p. 199)	345
XL. Ueber <i>Seetzen's</i> astronomische Beobachtungen in Arabien	352
XLI. Auszug aus einem Briefe	371
XLII. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Professor <i>Buzengeiger</i>	373
XLIII. Beobachtungen der Venus in der Nähe ihrer Zusammenkunft mit der Sonne. Auf der Sternwarte à la Capelle bey Marseille angestellt	378
XLIV. Nachtrag zur Untersuchung über <i>Maldonado's</i> Schiffahrt	379
XLV. Nachricht von einer Sonnenfinsterniß im Jahre 1239	381
XLVI. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Professor <i>Gerling</i>	382
XLVII. Anzeige und Berichtigung einiger Druck- und Schreibfehler von <i>B. Nicolai</i>	383



(Hierzu eine Kupfertafel.)



Für d. Monatl. Corresp. Octobr. 1803.

Sechs Monatsstücke, jedes von sechs bis acht Bogen, machen einen Band aus, der mit einem Sachen- und Namen-Register geschlossen wird; zwey Bände einen Jahrgang. Der Preis eines Jahrgangs ist 6 Thaler Conv. Geld, und man kann zu jeder Zeit in das Abonnement eintreten, muß aber den ganzen laufenden Jahrgang nehmen. Einzelne Monatsstücke kosten 14 ggr.

Man macht die Bestellungen bey den Post-Expeditionen und Buchhandlungen jedes Orts, welche die Exemplare von unterzeichneter Buchhandlung auf dem gewöhnlichen Wege beziehen.

Auch sind bey uns zu haben:

de Lindenau Tables barométr. pour faciliter le Calcul des Nivellements et des mesures des hauteurs par le Baromètre. 4°. 2 Thlr. 12 gl.

Ejusdem Tabulae Veneris novae et correctae. Fol. min. 2 Thlr.

de Zach Tabulae Motuum Solis novae et corr. quibus acced. Fixar. praecip. Catal. nov. ex observat. astr. ann. 1787-90 in spec. astr. Goth. habitis. 1792 Fol. min. 6 Thlr.

Ejusdem Fixarum praecip. Catal. nov. etc. (besonders gedruckt) 3 Thlr.

— Tabulae mot. sol. etc. Supplement 1804. 1 Thl. 12 gl.

— Astronom. Tafeln der mittl. geraden Aufsteig. der Sonne etc. zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc. (beym Observiren zu brauchen). Gebund. 6 gl.

— Nachrichten von der k. preuss. trigonom. und astronom. Aufnahme von Thüringen etc. und von der Gotha'schen Gradmessung I. Th. 2 Thlr.

— Tabulae spec. Aberr. et Nutat. una cum insignior. 494 stell. zod. Catalogo novo etc. Vol. I. II. 4° broch. 20 Thlr.

— Tables abrégées et port. du soleil. 1 Thlr. 12 gl.

— Tables abr. et port. de la lune. 2 Thlr. (Beyde in kl. 4. broch.)

— Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour 1404 étoiles etc. 8° broch. 3 Thlr. 12 gl.

Beckersche Buchhandlung in Gotha.



MONATLICHE
CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

vom

Freyherrn F. von ZACH,

Herzoglichen Sachsen-Gothaischen
Oberhofmeister.

NOVEMBER 1813.

G O T H A,

in der Beckerschen Buchhandlung.

Der Zweck dieser *Monatlichen Correspondenz* ist: Die Freunde der *Erde- und Himmels-Kunde* und der dahin einschlagenden Wissenschaften und Künste von den Fortschritten, welche von Zeit zu Zeit in diesen Fächern der Gelehrsamkeit geschehen, frühzeitig zu benachrichtigen. Sie beruht auf einer von dem Herrn Herausgeber mit vielen gründlichen Gelehrten im Fache der Astronomie und Geographie (beydes im weitesten Sinne,) in den verschiedenen europäischen Staaten getroffenen Uebereinkunft, ihm die Resultate ihrer Forschungen, Beobachtungen und Lectüre mitzutheilen, um solche mittelst dieser Zeitschrift sowohl gegenseitig auszuwechseln, als auch durch öffentliche Bekanntmachung gemeinnützig zu machen.

Sie enthält also:

- I. Neue eigene Aufsätze der Herren Correspondenten über Gegenstände der Astronomie, der mathematischen, physischen und politischen Geographie, und der zu diesen Fächern gehörigen Hilfswissenschaften und Fertigkeiten, welchen, wo es zur Erläuterung nothwendig ist, Zeichnungen, Plane und Landkarten beygefügt werden.
- II. Einzelne eigene Beobachtungen, Erfahrungen, Entdeckungen und Erfindungen in diesen Wissenschaften.
- III. Urtheile und Nachrichten von neuen in diese Wissenschaften einschlagenden Schriften, wodurch die Wissenschaft erweitert oder berichtigt wird.
- IV. Beurtheilende Nachrichten von neuen Landkarten, Planen, astronomischen und mathematischen Werkzeugen u. s. w.
- V. Biographische Nachrichten von Männern, die in diesen Fächern viel geleistet haben, mit ihren Bildnissen.
- VI. Berichte von Reisenden, die auf die Länder- und Völkerkunde Bezug haben.

MONATLICHE
CORRESPONDENZ
ZUR BEFÖRDERUNG
DER
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

NOVEMBER 1813.

XLVIII.

Ueber

die relative Lage
der

Planetenbahnen unter sich.

Einige planetarische Breitenstörungen, deren ich neuerlich zu einem andern Behuf bedurfte, nöthigten mich, die in *La Place's Mécanique céleste* bey diesen Entwicklungen mit II bezeichnete Gröſſe (Länge des aufsteigenden Knotens der einen Planetenbahn in der andern) numerisch zu berechnen. Um bey ähnlichen Fällen für die Zukunft dieser Mühe überhoben zu seyn, machte ich die Rechnung

Mon. Corr. XXVIII. B. 1813. D d für

Letzte Seite

für alle, paarweise combinirte, Planetenbahnen; anfangs für 1800, und bestimmte dann zugleich auch die Saecular-Aenderungen der Knotenpunkte und Neigungen. Da diese Resultate auch für andre Astronomen wieder nützlich werden können, so scheint mir deren Bekanntmachung hier nicht am unrechten Orte zu seyn.

Die Ausdrücke dazu werden durch die *Neper'schen* Analogieen oder durch die von *Gaußs* in seiner *Theoria motus* pag. 51 gegebenen Relationen leicht erhalten. Man bezeichne durch Ω , Ω' die aufsteigenden Knoten-Längen zweyer Planetenbahnen, i , i' deren Neigungen gegen die Ecliptik, D , D' Abstände der Knoten von dem aufsteigenden Knoten einer Bahn in der andern, N relative Neigung der beyden Planetenbahnen. Hiernach ist:

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} (D + D) = \frac{\sin \frac{1}{2} (i + i')}{\sin \frac{1}{2} (i - i')} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (\Omega - \Omega')$$

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} (D' - D) = \frac{\cos \frac{1}{2} (i + i')}{\cos \frac{1}{2} (i - i')} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (\Omega - \Omega')$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{1}{2} N &= \frac{\sin \frac{1}{2} (D' - D)}{\sin \frac{1}{2} (D' + D)} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (i + i') \\ &= \frac{\cos \frac{1}{2} (D' - D)}{\cos \frac{1}{2} (D' + D)} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (i - i') \end{aligned}$$

Außerdem können noch folgende identische Ausdrücke für N zur Controlle dienen:

$$\sin \frac{1}{2} N = \frac{\sin \frac{1}{2} (\Omega - \Omega')}{\sin \frac{1}{2} (D' + D)} \sin \frac{1}{2} (i + i')$$

$$= \frac{\cos \frac{1}{2} (\Omega - \Omega')}{\cos \frac{1}{2} (D' + D)} \sin \frac{1}{2} (i - i')$$

$$\cos \frac{1}{2} N = \frac{\sin \frac{1}{2} (\Omega - \Omega')}{\sin \frac{1}{2} (D' - D)} \cos \frac{1}{2} (i + i')$$

$$= \frac{\cos \frac{1}{2} (\Omega - \Omega')}{\cos \frac{1}{2} (D' - D)} \cos \frac{1}{2} (i - i')$$

$$\sin N = \frac{\sin (\Omega - \Omega')}{\sin D} \sin i$$

$$= \frac{\sin (\Omega - \Omega')}{\sin D} \sin i'$$

Es sind dann $\Omega \pm D$, $\Omega' \pm D'$ die aufsteigenden Knoten-Längen der einen Planetenbahn in der andern. Welches Zeichen hierbey anzunehmen ist, läßt sich leicht aus folgenden Regeln finden: Ist $\Omega > \Omega'$, und $i > i'$, so erfolgt der Durchschnitt beyder Bahnen *nördlich* von der Ecliptik, *südlich* in entgegengesetzten Fällen; im erstern hat man $\Omega + D$, im letztern $\Omega - D$. Dieselbe Bestimmung läßt sich auch auf folgende Art finden: Nimmt man i als größere Neigung an, welches immer so eingerichtet werden kann, so liegen $\frac{D' + D}{2}$, $\frac{D' - D}{2}$, beyde in einem Quadranten; ob man sie nun mit $\frac{1}{2} (\Omega - \Omega')$ ebenfalls in einem Quadranten, oder in dem entgegengesetzten annehmen will, ist völlig einerley.

Mit Zuziehung der neuesten Planeten-Elemente von *Delambre*, *Bouvard* und mir hat man für das Jahr 1800:

	Aufsteig. Knoten				Neigung		
<i>Mercur</i>	1 ^S	15°	57'	9"	7°	0'	6"
<i>Venus</i>	2	14	53	42	3	23	28
<i>Mars</i>	1	17	59	38	1	51	6
<i>Jupiter</i>	3	8	25	0	1	18	52
<i>Saturn</i>	3	21	55	16	2	29	38
<i>Uranus</i>	2	12	50	58	0	46	25

D d 1

und

und damit ferner für 1800:

		Länge des aufsteigen- den Knotens der einen Bahn in der andern		Relative Neigung
		$\Omega \pm D$	$\Omega' \pm D'$	N
<i>Mercur</i>	— <i>Venus</i>	23° 48, 0	23° 54, 8	4° 20, 8
<i>Mercur</i>	— <i>Mars</i>	45 13, 0	45 13, 3	5 9, 1
<i>Mercur</i>	— <i>Jupiter</i>	36 23, 2	36 26, 9	6 17, 2
<i>Mercur</i>	— <i>Saturn</i>	25 4, 7	25 13, 1	6 24, 2
<i>Mercur</i>	— <i>Uranus</i>	42 43, 3	42 44, 6	6 18, 2
<i>Venus</i>	— <i>Mars</i>	100 36, 3	100 34, 8	5 55, 9
<i>Venus</i>	— <i>Jupiter</i>	61 23, 4	61 24, 3	2 14, 8
<i>Venus</i>	— <i>Saturn</i>	27 54, 6	27 57, 2	2 3, 1
<i>Venus</i>	— <i>Uranus</i>	75 30, 0	75 29, 9	2 37, 1
<i>Mars</i>	— <i>Jupiter</i>	2 59, 6	3 0, 6	1 26, 0
<i>Mars</i>	— <i>Saturn</i>	156 42, 7	156 44, 8	2 21, 8
<i>Mars</i>	— <i>Uranus</i>	32 9, 1	32 9, 5	1 11, 6
<i>Jupiter</i>	— <i>Saturn</i>	126 7, 2	126 7, 7	1 15, 0
<i>Jupiter</i>	— <i>Uranus</i>	126 50, 7	126 50, 5	0 42, 0
<i>Saturn</i>	— <i>Uranus</i>	126 22, 0	126 21, 1	1 57, 2

Die Saecular-Aenderungen dieser Werthe lassen sich durch folgende aus obigen Ausdrücken hergeleitete Differential-Formeln berechnen:

$$\begin{aligned}
 d \frac{D'+D}{2} &= \frac{\sin(D'+D)}{\sin(\Omega-\Omega')} d \frac{\Omega-\Omega'}{2} \\
 &+ \frac{1}{2} \sin(D'+D) \cotang \frac{1}{2}(i+i') d \frac{i+i'}{2} \\
 &- \frac{1}{2} \sin(D'+D) \cotang \frac{1}{2}(i-i') d \frac{i-i'}{2} \\
 d \frac{D'-D}{2} &= \frac{\sin(D'-D)}{\sin(\Omega-\Omega')} d \frac{\Omega-\Omega'}{2} \\
 &- \frac{1}{2} \sin(D'-D) \tang \frac{1}{2}(i+i') d \frac{i+i'}{2} \\
 &+ \frac{1}{2} \sin(D'-D) \tang \frac{1}{2}(i-i') d \frac{i-i'}{2} \\
 &d N
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 dN &= \sin N \cotang \frac{1}{2} (D' - D) d \frac{D' - D}{2} \\
 &\quad - \sin N \cotang \frac{1}{2} (D' + D) d \frac{D' + D}{2} \\
 &\quad + \frac{\sin N}{\sin (i + i')} d (i + i').
 \end{aligned}$$

Allein weit bequemer sind die von Hrn. Nicolai zu diesem Behuf entwickelten Differential-Formeln:

$$dD' = \frac{\sin i \cos D}{\sin N} d(\Omega - \Omega') - \frac{\sin D}{\sin N} di + \frac{\sin D'}{\tan N} d\tilde{i}$$

$$dD = \frac{\sin i' \cos D'}{\sin N} d(\Omega - \Omega') - \frac{\sin D}{\tan N} di + \frac{\sin D'}{\sin N} d\tilde{i}$$

$$dN = \sin i' \sin D' d(\Omega - \Omega') + \cos D di - \cos D' d\tilde{i}$$

Mit Zuziehung der *La Place'schen* Theorie und der zuverlässigsten Massen-Bestimmungen sind die Säcular-Aenderungen in den Knoten-Längen und Neigungen der Planetenbahnen folgende:

<i>Mercur</i> ,	Saec. Aend. d. Ω	+ 1° 10'	15."1	d. Neig. + 18."3
<i>Venus</i> ,	—	—	52 0, 0	— + 4, 4
<i>Mars</i> ,	—	—	41 40, 0	— + 0, 0
<i>Jupiter</i> ,	—	—	57 2, 4	— — 23, 3
<i>Saturn</i> ,	—	—	51 7, 6	— — 16, 3
<i>Uranus</i> .	—	—	24 0, 0	— — 2, 7

Mit Substitution vorstehender Werthe in obigen Differential-Formeln werden auf das Jahr 1900 für die Größen $\Omega \pm D$, $\Omega' \pm D'$, N folgende Resultate erhalten:

Länge

		Länge des aufsteigen- den Knotens der ei- nen Bahn in der andern				Relative Neigung
		$\Omega \pm D$		$\Omega' \pm D'$		N
<i>Mercur</i>	— <i>Venus</i>	25°	7, 4	25°	13, 5	4° 20, 6
<i>Mercur</i>	— <i>Mars</i>	46	33, 6	46	33, 9	5 9, 2
<i>Mercur</i>	— <i>Jupiter</i>	37	38, 1	37	41, 9	6 17, 6
<i>Mercur</i>	— <i>Saturn</i>	26	18, 2	26	26, 6	6 23, 6
<i>Mercur</i>	— <i>Uranus</i>	44	1, 7	44	2, 9	6 19, 3
<i>Venus</i>	— <i>Mars</i>	101	34, 2	101	32, 8	1 56, 2
<i>Venus</i>	— <i>Jupiter</i>	62	19, 1	62	20, 1	2 15, 3
<i>Venus</i>	— <i>Saturn</i>	28	53, 7	28	56, 4	2 3, 2
<i>Venus</i>	— <i>Uranus</i>	76	30, 2	76	30, 1	2 37, 2
<i>Mars</i>	— <i>Jupiter</i>	4	9, 2	4	10, 2	1 26, 6
<i>Mars</i>	— <i>Saturn</i>	157	40, 7	157	43, 0	2 22, 1
<i>Mars</i>	— <i>Uranus</i>	33	9, 2	33	9, 7	1 12, 0
<i>Jupiter</i>	— <i>Saturn</i>	126	46, 9	126	47, 2	1 13, 2
<i>Jupiter</i>	— <i>Uranus</i>	128	15, 8	128	15, 7	0 42, 2
<i>Saturn</i>	— <i>Uranus</i>	127	20, 9	127	20, 3	1 57, 3

Einige scheinbare Regelmäßigkeiten in den Vertheilungen dieser Planetenbahnen, die auf die Vermuthung eines dabey statt findenden Gesetzes führen könnten, und die uns, da kein solches von der heutigen Theorie an die Hand gegeben wird, gegen alle Analogieen mißtrauisch machen müssen, verdienen hier wenigstens bemerkt zu werden. Die Knoten-Längen der sechs ältern Planeten liegen paarweise beysammen, und in fast gleichen Distanzen von einander. Die Knoten-Längen von Mars und Mercur sind 2°, die von Venus und Uranus 2°, und die von Jupiter und Saturn 13° von einander verschieden. Die mittlern Abstände dieser paarweise genommenen Durchschnitts-Puncte von einander betragen 28° und 32°.

Sonder-

Sonderbar ist es, daß die Knotenpunkte der drey obersten Planetenbahnen in den Raum eines Grades zusammenfallen. Früher war dies noch mehr der Fall, indem im Jahre 1702 die Längen der relativen Durchschnittspunkte der Jupiter - Saturn - und Uranus - Bahnen nur um zwey Minuten von einander differirten.

Wiche die Saturnsbahn nicht ab, so würden vom Mercur an bis zum äußersten Planeten unseres Sonnen - Systems die Neigungen der Planetenbahnen, mit zunehmender Distanz von der Sonne, beständig abnehmen. Sollte vielleicht die Abweichung bey dem Saturn in dessen wunderbarer Configuration ihren Grund haben?

Doch genug der Vermuthungen und Träumereyen, die nie irgend einen reellen Werth haben konnten, und seit Entdeckung der neuen Planeten, die mit Ausnahme der allgemeinen Form der Bahn und Richtung der Bewegung über alle früherhin vermutheten Verhältnisse hinausgreifen, auch den der Wahrscheinlichkeit und der Analogie verlohren haben.

XLIX.

Erläuterung einer in den *Scriptoribus rei agrariae* pag. 176 u. 177, edit. Goefſi, gegebenen Vorſchrift, aus drey beobachteten ungleichen Schattenlängen die Mittagslinie zu finden.

Von Herrn Profeſſor Mollweide,

Bey Leſung dieſer Ueberschrift wird man vielleicht mit einiger Verwunderung fragen, was die Mittagslinie mit dem Ackerweſen gemein habe, und wie die Ziehung derſelben in Schriften, die dieſes betreffen, gelehrt werden könne. Allein es iſt zu bemerken, daß die Römer bey Anlegung der Raine (*limites*) auf ihren Feldern ſehr ſcrupulös zu Werke giengen, indem ſie, wofern es anders die Umſtände geſtatteten, die Hauptraine (*limites decumani* ſ. *prorſi*) von Oſten nach Weſten, die Neben- oder Querraine aber (*cardines* ſ. *limites tranſverſi*) von Süden nach Norden laufen ließen.*) Die Entſtehungsart dieſer Einrichtung und ihr Zweck brauchen hier nicht

*) Man ſ. unter andern *Adam's Handbuch der römischen Alterthümer*, Th. II. S. 447 u. 48 der zweyten Ausg.

nicht erörtert zu werden; *) die Kenntniß davon reicht hin, um es nicht seltsam zu finden, daß in einer Schrift *de limitibus constituendis*, dergleichen sich unter *Hygin's* Namen in der oben angezeigten Sammlung der *Auctor. rei agrar.* pag. 150 und folg. befindet, Anweisungen, die Mittagslinie zu ziehen, vorkommen.

Hygin lehrt nämlich zuerst die bekannte, auch von *Vitruv* **) vorgetragene, Manier, die Mittagslinie durch zwey gleiche Schattenlängen, davon die eine Vor- die andere Nachmittags beobachtet worden, zu finden. Alsdann zeigt er noch, wie eben dieselbe aus drey ungleichen an einem Tage beobachteten Schattenlängen gefunden werden könne. Ich werde zuvörderst die Methode, so wie ich sie mir entwickelt habe, hersetzen, nachher aber die Stelle des *Hygin* selbst, worin sie vorgetragen ist, mittheilen, und einige Anmerkungen beyfügen.

Die Ebene der Zeichnung (Fig. 1) stelle demnach die horizontale Ebene vor, in welcher die im Fußpunkte *B* des senkrechten Zeigers oder Stiftes zusammenlaufenden Schattenlinien *BD*, *BC*, *BE* sind, unter denen *BE* die kleinste, *BD* die größte sey. Man ziehe in irgend einer Ebene (Fig. 2) willkürlich eine gerade Linie *BD*, und trage auf dieselbe von einem ihrer Endpunkte *B* aus die drey Schattenlängen *BE*, *BC*, *BD*, errichte in *B* auf

BD

*) Die Römer haben *Hygin's* Zeugnisse zufolge diesen Gebrauch von den Tuskern entlehnt, von denen sie überhaupt so vieles angenommen haben.

**) I. 6.

BD den Perpendikel *BA* von der Höhe des Zeigers, und ziehe *AE*, *AC*, *AD*. Mit der kleinſten derſelben *AE* beſchreibe man aus *A* einen Kreisbogen, welcher *AD* in *F* und *AC* in *J* ſchneide, und ziehe durch *F* und *J* Parallelen mit der *BD*, die der *AB* in *G* und *K* begegnen. Die dadurch erhaltenen Linien *FG*, *JK* trage man in der horizontalen Ebene (Fig. 1) von *B* aus auf die zuſtimmenden Schattenlinien *BD*, *BC*, d. h. man nehme $BL = FG$, $BM = JK$, ziehe *LM* und durch die Endpunkte der Schattenlinien *DC*, verlängere *LM* und *DC* bis zu ihrem Durchſchnitte *H*; ſo iſt, wenn der Endpunkt *E* der kleinſten Schattenlinie mit *H* verbunden wird, *EH* der Oſtweſt-Linie parallel, folglich eine durch *B* darauf geführte ſenkrechte die Mittagslinie.

Um den Grund dieſes Verfahrens einzulehen, denke man ſich die rechtwinkligen Dreyecke *ABD*, *ABC*, *ABE* der zweyten Zeichnung über den Linien *BD*, *BC*, *BE* der erſten ſenkrecht auf die Ebene dieſer Linien aufgerichtet, wie es Fig. 3 darſtellt, ſo fällt *A* in die Spitze des Zeigers; *ABD*, *ABC*, *ABE* ſind die Verticalflächen, in denen ſich die Sonne befand, als der Stift *AB* die Schatten *BD*, *BC*, *BE* warf, und *DA*, *CA*, *EA* gehen nach dem Mittelpunkte der Sonne, liegen alſo in der Oberfläche eines geraden Kegels, deſſen Spitze *A*, Grundfläche aber der Tagekreis der Sonne iſt. *) Da nach der

Con-

*) Der Einfluß der Strahlenbrechung und die Veränderung in der Abweichung der Sonne während eines Tages oder eigentlich in der Zwischenzeit der Beobachtungen werden hier bey Seite geſetzt.

Construction $AF = AE = A\mathcal{F}$, so sind die Punkte F , \mathcal{F} , E im Umfange eines Kreises, der dem Tagekreise der Sonne, folglich auch dem Aequator parallel ist, und $F\mathcal{F}$ ist eine Sehne dieses Kreises. Weil ferner FG der BL gleich und parallel ist, so ist auch, wenn man FL verbindet, solche der BG gleich und parallel. Eben so ist JM der BK gleich und parallel. Da also FL und JM der AB , folglich auch einander parallel sind, so liegen sie in einer Ebene, in welcher auch $F\mathcal{F}$, so wie LM , ist. $F\mathcal{F}$ ist aber auch in der Ebene ADC , und LM in der horizontalen Ebene BCD , folglich ist $F\mathcal{F}$ der Durchschnitt der Ebene $F\mathcal{F}ML$ mit der Ebene ADC , und LM der Durchschnitt derselben Ebene mit der horizontalen BCD . Nun schneidet die Ebene ADC die horizontale Ebene in der DC , welche verlängert der gleichfalls verlängerten LM in H begegnet, folglich ist H in der Ebene ADC und auch in der Ebene $FJML$, folglich ein Punkt des gemeinschaftlichen Durchschnittes beyder Ebenen, d. h. der verlängerten $F\mathcal{F}$. Diese aber liegt ganz in der Ebene des Kreises durch F , \mathcal{F} , E , also ist H in dieser Ebene, aber auch in der horizontalen Ebene BDC , folglich ein Punkt des gemeinschaftlichen Durchschnittes beyder Ebenen. Nun ist auch E ein solcher, folglich die verbundene EH der Durchschnitt einer der Aequators-Ebene parallelen Ebene mit der horizontalen Ebene, mithin der Ostwestlinie parallel.

Es ist nicht gerade nothwendig, zum Halbmesser des aus A beschriebenen Kreisbogens (Fig. 2) die kleinste der drey Linien AE , AC , AD zu nehmen, man kann auch jede der beyden andern dazu wählen. Der kleinsten ist hier der Vorzug gegeben, weil

weil dadurch die Construction einfacher wird, indem man alsdann nicht nöthig hat, AB und AE oder AE und AC , so wie auch BE oder BE und BC (Fig. 1) zu verlängern, wie es der Fall ist, wenn man AC oder AD zum Halbmesser nimmt.

Vermittelt der Analysis läßt sich die angegebene Construction so deduciren: In der Ebene der drey Schattenlinien seyen zwey Coordinaten-Axen, worauf die x und y genommen werden, senkrecht auf einander, aber sonst willkürlich gezogen, und in ihrem Durchschnitte die Axe der z senkrecht auf jene Ebene. Für die Spitze des senkrecht auf die Ebene der x, y errichteten Stifts oder Zeigers seyen a, b, c die Coordinaten, so daß a die Abscisse b die Ordinate des Fußspuncts, in welchem die drey Schattenlinien zusammentreffen, c aber die Höhe des Zeigers ist. Die Coordinaten zu den Endpuncten der drey Schattenlinien seyen nach der Folge ihrer Größe $x', y'; x'', y''; x''', y'''$. Bezeichnen nun d', d'', d''' folgeweise die geraden Linien, welche die Endpuncte der drey Schatten mit der Spitze des Zeigers verbinden, so ist

$$d'^2 = (x' - a)^2 + (y' - b)^2 + c^2$$

$$d''^2 = (x'' - a)^2 + (y'' - b)^2 + c^2$$

$$d'''^2 = (x''' - a)^2 + (y''' - b)^2 + c^2.$$

Da die Linien d', d'', d''' in der Oberfläche eines geraden Kegels sind, dessen Spitze in den Mittelpunkt der Sphäre fällt (wofür man immer die Zeigerspitze setzen darf), und dessen Axe die Weltaxe ist, so ist, wenn

$$x - a = m(z - c)$$

$$y - b = n(z - c)$$

die

XLIX. Erläuterung e. Vorschrift üb. d. Mittagslinie. 401

die Gleichungen für diese Axe sind, M aber den Cosinus des halben Winkels an der Spitze des Kegels bezeichnet, und zur Abkürzung $1 + mm + nn = pp$ gemacht wird, die Gleichung für die Kegelfläche

$$\begin{aligned} [z - c + m(x - a) + n(y - b)]^2 \\ = M^2 p^2 [(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2] \end{aligned}$$

folglich die Gleichung für den Durchschnitt derselben mit der Ebene der x, y , in welchem die Endpunkte der Schatten sind,

$$\begin{aligned} [-c + m(x - a) + n(y - b)]^2 \\ = M^2 p^2 [(x - a)^2 + (y - b)^2 + c^2] \end{aligned}$$

woraus zur Bestimmung der drey Constanten m, n, M folgende drey Gleichungen entstehen:

$$\begin{aligned} -c + m(x' - a) + n(y' - b) &= Mpd' \\ -c + m(x'' - a) + n(y'' - b) &= Mpd'' \\ -c + m(x''' - a) + n(y''' - b) &= Mpd''' \end{aligned}$$

Wird die erste Gleichung von jeder der beyden andern besonders abgezogen, so gibt die Division der Reste

$$\frac{m(x''' - x') + n(y''' - y')}{m(x'' - x') + n(y'' - y')} = \frac{d''' - d'}{d'' - d'}$$

wodurch der Quotient $\frac{m}{n}$ bestimmt wird, welcher hier, wie sogleich erhellen wird, allein in Betracht kommt. Es ist nämlich

$$y - b = \frac{n}{m} (x - a)$$

die Gleichung für die Projection der Welt-Axe auf die Ebene der x, y , d. i. für die Mittagslinie, zu deren hier gesuchten Bestimmung es also nur, weil
a und

a und b gegeben sind, des Quotienten $\frac{n}{m}$ oder seines reciproken $\frac{m}{n}$ bedarf. Man findet nun

$$\frac{m}{n} = \frac{(y'' - y')(d''' - d') - (y''' - y')(d'' - d')}{(x''' - x')(d'' - d') - (x'' - x')(d''' - d')}$$

wo in dem rechter Hand des Gleichheitszeichens stehenden Ausdrücke alles bekannt, und sonach die Aufgabe als aufgelöst anzusehen ist.

Da es hier aber hauptsächlich um eine einfache und bequeme Construction zu thun ist, so könnte man in dieser Absicht zuerst darauf verfallen, das Verhältniß zu suchen, in welchem eine der drey geraden die Endpunkte je zweyer Schatten verbindenden Linien von der Mittagslinie geschnitten wird, allein ein Versuch zeigt, daß dies Verhältniß sehr zusammenge setzt ausfällt. Dadurch wird man veranlaßt, folgenden Weg einzuschlagen, der, wie der Erfolg lehrt, sicher zu dem gewünschten Ziele führt. Anstatt nämlich den Durchschnitt der Mittagslinie mit einer von den drey zwischen den Endpunkten je zweyer Schatten enthaltenen geraden Linien zu suchen, suche man das Verhältniß, in welchem eine auf die Mittagslinie senkrecht und durch den Durchschnitt irgend zweyer jener Linien gelegte gerade die dritte schneidet. Wir wollen den Durchschnitt wählen, dessen Coordinaten x' , y' sind, d. i. den Endpunkt der kleinsten Schattenlinie. Die Gleichung für die gerade, welche durch diesen Punkt geht und die Mittagslinie rechtwinklig durchschneidet, ist nun

$$y - y' = - \frac{m}{n} (x - x')$$

Und

Und um die Ausdrücke etwas zusammen zu ziehen und dadurch die Rechnung zu verkürzen, wollen wir noch $x' = y' = 0$ setzen, so daß der Anfang der Coordinaten in den Endpunct der kleinsten Schattenlinie fällt, diese Linie selbst aber die Axe der x wird. Dadurch ergibt sich

$$\frac{mx''' + ny'''}{mx'' + ny''} = \frac{d''' - d'}{d'' - d'}$$

Die Gleichung für die durch den Endpunct der kleinsten Schattenlinie senkrecht auf die Mittagslinie gezogene gerade aber wird

$$y = -\frac{m}{n} x$$

Ferner ist die Gleichung für die durch die Endpuncte der größern zwey Schattenlinien gelegte gerade

$$y - y'' = \frac{y''' - y''}{x''' - x''} (x - x'')$$

$$\text{oder } y = \frac{y''' - y''}{x''' - x''} x + \frac{x''' y'' - x'' y'''}{x''' - x''}$$

Bezeichnet man nun die Coordinaten des Durchschnits dieser beyden geraden durch X, Y , so findet sich

$$X = \frac{n(x'' y''' - x''' y'')}{m(x''' - x'') + n(y''' - y'')}$$

$$Y = \frac{m(x''' y'' - x'' y''')}{m(x''' - x'') + n(y''' - y'')}$$

wodurch

$$\begin{aligned} x''' - X : x'' - X &= y''' - Y : y'' - Y \\ &= mx''' + ny''' : mx'' + ny'' \\ &= d''' - d' : d'' - d' \end{aligned}$$

wird.

wird. Hieraus folgt, daß sich das Stück der durch die Endpunkte der beyden größern Schattenlinien gezogenen geraden, welches zwischen dem Durchschnitte derselben mit der durch den Endpunkt der kleinsten Schattenlinie senkrecht auf die Mittagslinie geführten geraden und dem Endpunkte der größten Schattenlinie enthalten ist, zu dem Stücke, welches von eben jenem Durchschnitte an bis zu dem Endpunkte der noch übrigen Schattenlinie liegt, verhält, wie $d''' - d'$ zu $d'' - d'$, d. h., daß

$$HD : HC \text{ (Fig. 1) } = DF : CJ \text{ (Fig. 2)}$$

ist. Man darf also nur in der nach der Seite der kleinsten Schattenlinie verlängerten DC den Punkt H so nehmen, daß $HD : HC$ das angegebene Verhältniß erhält, so hat man die Lage der auf die Mittagslinie senkrechten EH . Um DC in dem angegebenen Verhältnisse zu verlängern, sey durch H eine Transversale, welche BD in L , BC aber in M schneidet, gelegt, so ist nach einem bekannten Satze von *Ptolomäus**)

$$\begin{aligned} BL : LD &= \left\{ \begin{array}{l} BM : MC \\ HC : HD \end{array} \right\} \\ &= \left\{ \begin{array}{l} BM : MC \\ CJ : DF \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Macht man nun

$$BM : MC = A\mathcal{J} : \mathcal{J}C$$

$$\begin{aligned} \text{d. i. } BC : BM &= AC : A\mathcal{J} \\ &= BC : K\mathcal{J}, \end{aligned}$$

folglich

$$BM = K\mathcal{J},$$

so

*) M. f. Ideler über die Trigonometrie der Alten, M. C. Bl. XXVI, S. 25.

so wird $BL : LD = A\gamma : DF$
 $= AF : FD,$

also $BD : BL = AD : AF$
 $= BD : GF,$

mithin $BL = GF.$

Umgekehrt also, wenn man $BL = GF$ und $BM = K\gamma$ nimmt, und LM zieht, welche der DC in H begegnet, so ist

$$HD : HC = FD : \gamma C$$

und die verbundene EH senkrecht auf die Mittagslinie.

Das gewiesene Verfahren, die Mittagslinie zu finden, ist nicht bloß auf horizontale Ebenen eingeschränkt, sondern, wie sich aus dem Beweise ergibt, auch auf alle Ebenen anwendbar, deren Durchschnitt mit der Mittagsfläche senkrecht auf ihren Durchschnitt mit der Aequatorsfläche ist, d. i. auf alle Vertical- und geneigte Flächen, das letztere Wort in der Bedeutung, die es in der Gnomonik hat, genommen.

Ich gebe nun die Stelle *Hygin's*, wie sie in der *Goes'schen* Ausgabe abgedruckt ist, wo sie so lautet:

**) Est et alia ratio, qua tribus umbris comprehensis meridianum (1) describimus. Loco plano gno-*

**)* Vor allem merke ich an, daß in des Mönchs *Gerbert*, nachherigen *Pabstes Sylvester II.*, *Geometrie*, von der *Kästner* in seinen *geometr. Abhändl. I. 1.* Nachricht ertheilt hat, im 94ten Cap. *Hygin's* hier mitgetheilte Vorschrift wiederholt ist, doch nicht ganz, sondern nur bis zu den Worten *intervallo o circulum scribimus*. Der Herausgeber, *Pez*, hat am Rande bemerkt: *Textus hu-*
Mon. Corr. XXVIII. B. 1813. E o jus

gnomonem conſtituimus (2) *A.* et umbras ejus, qualescunque tres, notabimus *C, D, E.* Has umbras (3) normaliter comprehendemus, quanta latitudine altera ab altera diſſent. (4) Si ante meridiem conſtituimus, prima umbra erit longiſſima: ſi poſt meridiem, noviſſima. †) Has deinde umbras proportionē (5) ad multiplicandam in tabula deſcribimus: et ſic in terra ſervabimus. (6) Sit ergo gnomon, *A.* planitia, *B.* tollamus umbram maximam, et in planitia notemus ſigno, *D.* (7) ſic et terram ſigno, *E.* ut ſint in baſi proportionē longitudinis ſuae *BEDC.* eiiciamus hypotenuſas ex *C* in *A,* et ex *D* in *A.* nunc puncto *A* et intervallo (8) *E,* circum ſcribamus (9) ordinatas: deinde lineas baſi, hoc eſt, planitiae eiiciamus in cathetum ex praecifuris hypotenuſarum et circumferentiae ex *F* in *G,* et ex *J* in *K.* (10) longiſſimam deinde lineam maximae umbrae imprimemus et a ſigno *B* notabimus, *G F.* ſecundam lineam umbrae ſecundae (11) notabimus, *KJ.* deinde ex ſigno *F,* (12) et in *J,* rectam lineam eiiciemus, itemque ex *CD* finibus umbrarum. hae duae lineae altera alteram (13) comprecident, ſigno (14) *J.* eiiciemus deinde rectam lineam ex (14) *J* et *E,* quae erit ortus et occaſus. ex hac (15) in rectum rectam lineam eiiciemus, hoc eſt normaliter, haec erit meridiano ordinata. (16) Eiſdem ſignis id ipſum conſtituimus, et intuebimur qua-

jus capitis perturbatus et obſcurus eſt. Vorher, im 93ſten Cap., wird auch die Manier, aus zwey gleichen Schattenlängen die Mittagslinie zu finden, mit denſelben Worten, wie bey *Hygin,* vorgetragen.

quatuor caeli partes quibus limitum ordinatio hac ratione constituta omni tempore convenit.

- (1) Bey Gerbert steht *describamus*. Richtiger, als beydes, ist *describamus*.
- (2) Muß heißen *AB*, wie bey Gerbert.
- (3) *Normaliter comprehendere umbras* heißt wol, die Endpuncte der Schatten durch gerade Linien verbinden, ohne daß diese gerade ausgezogen zu werden brauchten.
- (4) Es ist nicht nothwendig, wie *Hygin* voraus zu setzen scheint, daß alle drey Schatten an demselben Vormittage oder Nachmittage beobachtet werden. Es kann auch einer oder zwey davon Vormittags, und die beyden andern oder der dritte Nachmittags genommen seyn. *Hygin* nimmt fibrigens, wie die Folge zeigt, den Fall an, daß alle drey Schatten Vormittags beobachtet sind, welchen ich auch, um das Verständniß seiner Vorschrift zu erleichtern, in der ersten und dritten Figur dargestellt habe.
- (†) Diesem Abfatze geht im Texte eine Figur vorher, die aber, weil sie sehr schlecht zu demselben stimmt, zur Erläuterung desselben wenig beytragen kann.
- (5) Nach einem Maßstabe, der aber kein verjüngter seyn darf. *Multipeda* ist ein Stab, der ein Vielfaches des Fußes enthält, so wie *decempeda* einer, der zehn Fuß hält. *Proportione* ist: in der jedem Schatten zukommenden Länge.
- (6) Bey dem, was nun folgt, nehme man Fig. 2 zur Hand.

(7) Hier ist offenbar eine Lücke im Texte, die etwa so auszufüllen seyn mögte: *Similiter tollamus umbram secundam et in planitia notemus signo C, sic et tertiam* (so muß statt *terram*, welches keinen Sinn giebt, gelesen werden) *tollamus et notemus signo E.*

(8) Zu setzen *AE.*

(9) *Ordinatas* gehört zu dem folgenden *lineas*: deswegen muß hinter *scribamus* interpungirt werden. *linea basi ordinata* ist aber so viel als *linea basi parallela f. aequidistans*. Dals *ordinatus* diese Bedeutung hat, sieht man aus dem weiter unten vorkommenden *meridiano ordinata* und mehreren anderen Stellen *Hygin's*. *lineae diametro ordinatae* sagt also eben das aus, was *lineae diametro ordinatim applicatae* anzeigt, und wer zuerst jenen Ausdruck statt dieses gebraucht hat, hat wol nicht daran gedacht, dals sich dafür eine Auctorität im *Hygin* nachweisen lasse.

(10) Hier geschieht der Uebergang von Fig. 2 zu Fig. 1. *Hygin* bezeichnet dabey die Endpuncte der auf *BD*, *BC* (Fig. 1) von *B* aus aufgetragenen Linie *GF*, *KJ* (Fig. 2) wieder mit denselben Buchstaben *F*, *J*, die sie in Fig. 2 hatten, welches von mir, des Beweises wegen, nicht geschehen ist. Wo also *L*, *M* (Fig. 1) steht, setzt *Hygin* *F*, *J* hin, welches man zum leichtern Verstehen des folgenden zu merken hat.

(11) Es ist wol hier wieder eine Lücke, so dals es vollständig heißen muß: *secundam lineam umbrae secundae imprimemus et a signo B notabimus Kf.*

(12)

- (12) Von den beyden Wörtern *et* und *in* ist eins auszustreichen.
- (13) Eine andere von *Rigaltius* angeführte Leseart, die aber keinen Sinn giebt, ist *comprehendent. compraecident* ist so viel als *secabunt*.
- (14) Statt *J*, welches schon in Beschlag genommen worden, muß ein anderer Buchstabe, vermuthlich *H*, welchen ich gewählt habe, gesetzt werden.
- (15) Eine Formel, wie die *in transversum*, *Plin.* XVI. 42. Die Erklärung folgt gleich.
- (16) Diese Worte gehen vermuthlich auf die Uebersetzung der Zeichnung vom Reifsbrette (*tabula*) auf das Feld. Die dem Texte beygegebene Figur ist aber, wie die vorige, ganz unpassend.

Den Urheber der von *Hygin* im Vorhergehenden gelehrtten Methode, die Mittagslinie zu finden, weifs ich nicht anzugeben. Von *Hygin* selbst rührt sie schwerlich her, da die Römer in der eigentlich wissenschaftlichen Geometrie, ohne welche man nicht auf jene Methode kommen kann, sehr fremd waren. Höchst wahrscheinlich ist die Methode von einem griechischen Schriftsteller entlehnt, aber, so weit ich nach meiner Kenntniß derselben urtheilen darf, aus keinem der noch vorhandenen und bekannten, sondern aus einem verloren gegangenen und unbekannten. *Ptolomäus* giebt keine Anweisung, die Mittagslinie zu ziehen, sondern sieht im roten Cap. des ersten Buchs seines *Almagestis* *) die Lage derselben

*) In der Geographie I. 3. erwähnt *Ptolomäus* der Astrolabien und Skiotheren (Schattenfucher) als solcher Instrumente, vermitteltß deren an jedem Orte und zu jeder

selben als bekannt an. Dasselbe thut sein Commentator *Theon*. Die von *Hygin* vorgetragene Construction

der Zeit leicht die Lage der Mittagslinie gefunden werde. Von dem Skiother sagt eine Glosse: Σκιάστρος ἐστὶ σχῆμα πυραμίδος ἐκ τεσσάρων τριγώνων περιεχόμενον, περιεχόντων ὁρθὴν γωνίαν πῶν τριγώνων, εἰ οὖν λαμβάνομεν τὴν μεσημβρίαν. Hat der Glossator bey dieser Beschreibung etwa Fig. 3 im Sinne gehabt, und dadurch die auf dieselbe sich gründende Construction andeuten wollen? — Ein eignes Instrument, das auf Fig. 3 gegründet wäre, läßt sich nicht wohl denken. Bey *Suidas* steht: Σκιάστρον, εἶδος πλούς. Hier ist vermuthlich eine Sonnenuhr gemeint, die auf einer hohlen Fläche, etwa der einer Kugel, beschrieben ist, dergleichen auch sonst σκάφη und σκαφίου hiefs; und *Martini's* (von den Sonnenuhren der Alten p. 75 n. 134) vorgeschlagene Aenderung von πλούς in πλόου scheint unnöthig, wenn man annimmt, *Suidas* habe sich mit einer allgemeinen, bloß von der Gestalt hergenommenen, Beschreibung beholfen. — Im 4ten Capitel des angeführten Buchs der Geographie gedenkt *Ptolomaeus* noch eines andern Instruments von seiner eigenen Erfindung, Meteoroscopium, womit sich jederzeit sowohl am Tage als bey Nachte die Polhöhe des Orts der Beobachtung, als auch zu jeder Stunde die Lage der Mittagslinie bestimmen lasse; allein er beschreibt daselbst weder die Einrichtung noch den Gebrauch des Instruments. *Pappus* in seinem Commentar über das fünfte Buch des *Almagests* erwähnt des Meteoroscops gleichfalls, und bezieht sich auf *Ptolomaeus* Beschreibung desselben (woraus beyläufig hervorgeht, daß *Ptolomaeus* eben so wohl Verfasser der Geographie als des *Almagests* ist), bringt aber auch nichts weiter bey, als die davon herge-

ction ist übrigens fein angedacht und sehr zierlich, und liefert ein gutes Beyspiel der *géometrie descriptive*. Statt der *Ff* wird ihre orthographische Projection auf die Ebene der drey Linien *BE*, *BC*, *BD* gebraucht, welche durch die Projectionen der Punkte *F* und *f* gefunden wird; diese selbst aber werden dadurch bestimmt, daß man die beyden Ebenen *ABE*, *ABC* sich um *AB* drehen läßt, bis sie mit der Ebene *ABD* zusammenfallen, welche allenfalls noch weiter um *BD* gedreht werden kann, bis sie mit der Grundebene zusammenfällt, da man denn allein in dieser zu operiren hat.

Das Problem, aus drey ungleichen an einem Tage beobachteten Schattenlängen die Mittagslinie zu finden, ist in den neuern Zeiten nicht unberührt geblie-

hergenommenen Dimensionen des Astrolabs. — Uebrigens klingt die von *Schneider* in den Anmerk. zu den *Ecol. phys.* p. 272 aus einem alten Comiker nach *Hesychius* angeführte Glosse: *ὥρα ὁρῶνται, σκοθῆναι* *οἱ γὰρ ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἐβώσαν τὰς μετουρανῆσεις λαμβάνειν καὶ σκοθῆναι ἐν τῶν ὥρῶν, allerdings etwas sonderbar. Vielleicht hat ein einziges Factum, was *Plinius H. N. II.* 73 anführt, daß nämlich, um gewiß zu werden, *Syene* liege unter dem nördlichen Wendekreise, und die Körper würfen daselbst am Mittage des Sommer-Solstizialtages keinen Schatten, ein Brunnen gegraben sey, welcher auch ganz erleuchtet wurde, Veranlassung dazu gegeben. Denn daß es überhaupt Gewohnheit der Mathematiker gewesen sey, die Mittagslinie in Brunnen zu ziehen, ist theils wegen der damit verknüpften Beschwerlichkeit, theils weil nicht abzusehen ist, was ein Brunnen dabey für Vortheile gewähre, schwer zu glauben.*

geblieben. *Muzio Oddi*, ein wegen ſeiner Schickſale merkwürdiger italiänifcher Mathematiker*) des 17ten Jahrhunderts, hat in ſeiner Schrift: *Gli Orologi ſolari delle ſuperficie piane*, Mil. 1611, eine Auflöſung deſſelben gegeben, welche *Schooten* in ſeinen *Exercitatt. mathem.* p. 507 und aus ihm *Ozanam* in den *Récrétions mathem. et phyſ.* Tom. III. pag.

- *) *Franz Maria II.*, letzter Herzog von *Urbino*, in deſſen Dienſten *Muzio* als Architect ſtand, lieſs ihn eines Verdachts wegen ins Gefängniſs werfen, wo er mehrere Schriften, die er nach ſeiner Loſlaſſung bekannt machte, ausgefertigt hat. Wie er dabey aus Mangel an Schreibwerkzeugen ſich geholfen, erzählt *Erythraeus* (eigentlich *Roscius* genannt) in ſeiner *Pinacotheca* mit folgenden Worten: *In emporia bibula charta (non enim melior ſuppeteſebat) carbone, in ſtyli formam aedificato, inſtituit librum de horologiis conſcribere, nullo librorum auxilio ſublevatus; et quia erat periculum, ne litterae, male chartae haerentes, exciderent, primum rationem invenit, qua bibulae chartae inter ſe plures cohaererent; tum in nucis juglandis putamen, tanquam in atramentarium, goſſypii loco, (wozu Baumwolle ins Dintenfaß?) lanam e culcitra detractam intulit, et carbone aqua diluto imbuit, in quam calamum ex arundine factum intingeret; poſtremo circum ex duobus olivae ramulis, lino compactis, exſtruxit; ac per hanc rationem eos omnes libros compoſuit, qui Mediolani ac Venetiis impreſſi feruntur: videlicet de Norma, de Fabrica uſuque circini polymetri, de Horologiis ſolaribus. — Montucla (Hiſt. des Mathem. I. 730) rühmt an den beyden Tractaten *Muzio's* von den Sonnenuhren, daſs ſie wegen verſchiedener ſinnreicher Verzeichnung merkwürdig wären, und mehr aus der tiefern und feinern Geometrie enthielten, als die gewöhnlichen Bücher dieſer Art,*

XLIX. Erläuterung e. Vorschrift üb. d. Mittagslinie. 413

pag. 268 vorgetragen hat. Sie beruht darauf, daß man sich die rechtwinkligen Dreyecke ABD , ABC , ABE und FLH um die Linien BD , BC , BE und LH gedreht denkt, bis sie in die Ebene derselben fallen. Die Auflösung wird aber bey weitem nicht so einfach, als die hier nach *Hygin* mitgetheilte. Auch *Boscovich* hat in seinen *Opp. ad Optic. et Astronom. pertinent. Tom. IV. p. 243* eine Auflösung gegeben, bey der angenommen wird, das Dreyeck ADC sey um DC gedreht, und in die Ebene BDC niedergelegt, so daß A und B an entgegengesetzte Seiten der CD zu liegen kommen. An Einfachheit steht diese Auflösung der im *Hygin* enthaltenen nicht sehr nach. Der ganze Unterschied der drey Auflösungen besteht darin, daß der Punct H in der einen vermittelt der Linien LM und DC , in der andern durch $F\zeta$ und LM , in der dritten endlich mittelst der $F\zeta$ und DC gefunden wird.

Das vorige Problem kann auch anders, und zwar so ausgedrückt werden: *Es ist die Lage der Durchschnitte dreyer Verticalkreise mit dem Horizonte gegeben, und die Höhen, welche die Sonne in jedem der Verticalkreise über dem Horizonte hatte, man soll die Lage der Mittagslinie finden.* Unter dieser Form läßt es zwey nicht minder elegante Auflösungen, als die vorhergehenden, zu, die ich, mehr um den Reichthum der Geometrie an Hülfsmitteln zur Auflösung einer und derselben Aufgabe zu zeigen, als ihrer vorzüglichern practischen Brauchbarkeit wegen, noch beybringe.

Es seyen also in Fig. 4 ACa , $A'Ca'$, $A''Ca''$ die in die Horizontfläche fallenden Durchmesser der drey
Ver-

Verticalkreise der Sonne. Man beschreibe aus dem gemeinsamen Durchschnitte derselben C mit einem beliebigen Halbmesser den Kreis $AA'aa'$, und gebe den Bogen $AB, A'B', A''B''$ so viele Grade, als den gegebenen Höhen der Sonne zukommen. Von den Punkten B, B', B'' falle man auf die Durchmesser $ACa, A'Ca', A''Ca''$ die Perpendikel $BD, B'D', B''D''$, und verbinde $DD', D'D''$, mache durch D' die $D'E$ und $D'E'$ denen DB und $D'B'$ parallel und der $D'B'$ gleich, ziehe $EB, E'B''$, welche den Linien $DD', D'D''$ in den Punkten F und F' begegnen, so ist die F und F' verknüpfende gerade FF' der Ostwestlinie parallel.

Denn denkt man sich den Kreis $AA'aa'$ nach und nach über den Durchmessern $Aa, A'a', A''a''$ senkrecht aufgerichtet, so stellt er in dieser Lage die drey Verticalkreise der Sonne, in denen sie die Höhen $AB, A'B', A''B''$ hatte, dar, und B, B', B'' sind im Umfange des Tagekreises der Sonne. Die Perpendikel $BD, B'D', B''D''$ aber sind bey jener Lage des Kreises $AA'aa'$ parallel, liegen also je zwey in einer Ebene. Von diesen Ebenen schneidet die durch DB und $D'B'$ gehende die Grundebene in der DD' , und weil $DB < D'B'$, so laufen die Linien BB' und DD' zusammen, schneiden also einander irgendwo. Es geschehe in X , so ist

$$\begin{aligned} XD':XD &= DB:D'B' \\ &= DB:D'E \\ &= FD':FD, \end{aligned}$$

folglich getrennt

$$DD':XD = DD':FD,$$

also $XD = FD,$

d, h.

d. h. die durch die Endpuncte B, B' der aufgerichteten Perpendikel DB, DB' gelegte gerade BB' schneidet DD' in F . Nun fällt BB' ganz in die Ebene des Tagekreises der Sonne, und DD' ganz in die Ebene des Horizonts, folglich ist F in beyden Ebenen, also ein Punct des gemeinschaftlichen Durchschnittes der Ebene des Tagekreises der Sonne mit der Horizontfläche. Auf gleiche Art wird gezeigt, dafs auch F' ein solcher Punct ist, mithin ist die ausgezogene FF' der Ostwestlinie parallel.

Eine analytische Herleitung der eben gezeigten Construction aus der oben gegebenen Analysis würde vielleicht mit einigen Weitläufigkeiten verknüpft seyn. Kürzer erhält man sie auf folgende Art:

Es seyen h, h', h'' die drey Höhen der Sonne, und $\alpha, \alpha', \alpha''$ die ihnen entsprechenden Azimuthe. Es sey, um gleich den in der Zeichnung dargestellten Fall anzunehmen, h' die grösste Höhe, also zunächst am Mittage genommen. Heissen nun die Winkel $ACA', A'CA''$ resp. β und γ , so hat man, weil α und α' an derselben, α'' hingegen und α' an verschiedenen Seiten der Mittagslinie liegen, $\alpha = \beta + \alpha'$, $\alpha'' = \gamma - \alpha'$. Bezeichnet man ferner die Polhöhe durch φ , die Abweichung der Sonne aber durch δ , so giebt die sphärische Trigonometrie:

$$\sin \delta = \sin \varphi \sin h - \cos \alpha \cos \varphi \cos h$$

$$\sin \delta = \sin \varphi \sin h' - \cos \alpha' \cos \varphi \cos h'$$

$$\sin \delta = \sin \varphi \sin h'' - \cos \alpha'' \cos \varphi \cos h''$$

Zieht man die erste Gleichung von der zweyten ab, und dividirt den Rest mit $\cos \varphi$, so wird erhalten:

tang

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} \phi (\sin h' - \sin h) &= \cos \alpha' \cos h' - \cos \alpha \cos h \\ &= \cos \alpha' \cos h' - \cos (\beta + \alpha') \cos h \\ &= \cos \alpha' (\cos h' - \cos h \cos \beta) + \sin \alpha' \cos h \sin \beta, \end{aligned}$$

woraus, wenn man

$$\frac{\cos h \sin \beta}{\cos h' - \cos h \cos \beta} = \operatorname{tang} \zeta$$

ſetzt,

$$\operatorname{tang} \phi (\sin h' - \sin h) = \frac{\cos h \sin \beta \cos (\alpha' - \zeta)}{\sin \zeta}$$

folgt. Man bemerke, daß ζ der Winkel eines geradelinigen Dreyecks iſt, in welchem die Seiten $\cos h$, $\cos h'$ den Winkel β einſchließen. ζ iſt nämlich der der Seite $\cos h$ entgegenſtehende Winkel, folglich $\frac{\cos h \sin \beta}{\sin \zeta}$ die dritte Seite dieſes Dreyecks; d. h. es iſt,

weil $D'C = \cos h'$, $DC = \cos h$, $DCD' = \beta$,

$$DD'C = \zeta$$

$$\text{und} \quad DD' = \frac{\cos h \sin \beta}{\sin \zeta}.$$

Da nun überdieß $B'D' = \sin h'$, $BD = \sin h$, ſo iſt

$$(B'D' - BD) \operatorname{tang} \phi = DD' \cos (\alpha' - \zeta).$$

Macht man nun

$$FD' : FD = B'D' : BD$$

$$\text{d. i.} \quad FD' : DD' = B'D' : B'D' - BD,$$

$$\text{ſo wird} \quad B'D' \operatorname{tang} \phi = FD' \cos (\alpha' - \zeta).$$

Eben ſo entſteht, wenn man die zweyte Gleichung von der dritten abzieht, und die reſultirende auf die vorige Weiſe behandelt,

$$B'D' \operatorname{tang} \phi = F'D' \cos (\alpha' + \eta),$$

wo $\eta = D''D'C$.

Dem-

Demnach hat man

$$\frac{D'F}{D'F'} = \frac{\cos(\alpha' + \eta)}{\cos(\alpha' - \zeta)},$$

also $\frac{D'F' - D'F}{D'F' + D'F} = \frac{\cos(\alpha' - \zeta) - \cos(\alpha' + \eta)}{\cos(\alpha' - \zeta) + \cos(\alpha' + \eta)}$

$$= \tan\left(\alpha' + \frac{\eta - \zeta}{2}\right) \tan \frac{\eta + \zeta}{2},$$

also $\tan\left(\alpha' + \frac{\eta - \zeta}{2}\right) = \frac{D'F' - D'F}{D'F' + D'F} \cotg \frac{\eta + \zeta}{2},$

d. h. es ist $\alpha' + \frac{\eta - \zeta}{2}$ die halbe Differenz der Winkel an der dritten Seite eines geradelinigen Dreyecks, dessen beyde andere Seiten $D'F'$ und $D'F$ sind, welche den Winkel $\zeta + \eta$ einschliessen. Da also $FD'F' = \zeta + \eta$, so ist

$$\alpha' + \frac{\eta - \zeta}{2} = \frac{D'FF' - D'FF}{2},$$

und weil $90^\circ - \frac{\eta + \zeta}{2} = \frac{D'FF' + D'FF}{2},$

so wird $90^\circ - \alpha' - \eta = DFF,$

also $90^\circ - \alpha' = DFF + \eta$

$$= DFF + \alpha' D'F'.$$

Es ist $90^\circ - \alpha'$ der Winkel, unter welchem eine der Ostwestlinie parallele die $A'a'$ schneidet. Dieser Winkel ist also, wenn $A'a'$ von der FF' in N geschnitten wird, gleich dem äussern Winkel des Dreyecks DNF' , welcher entsteht, wenn man DN oder NF' verlängert, folglich gleich $D'NF$, mithin FF' selbst der Ostwestlinie parallel.

Die oben versprochene zweyte Auflösung ist folgende:

Nach-

Nachdem man, wie in der vorigen, den Kreis $AA'aa'$ (Fig. 5) beschrieben, und auf dem Umfange desselben die Bogen AB , $A'B'$, $A''B''$ den gegebenen Sonnenhöhen gemäß nach einerley Seite genommen hat, so nehme man nach der entgegengesetzten jeden der Bogen AO , $A'O'$, $A''O''$ gleich einem Quadranten, und ziehe BO , $B'O'$, $B''O''$. Durch die Durchschnittspuncte S , S' , S'' derselben mit Aa , $A'a'$, $A''a''$ beschreibe man den Kreis $SS'S''K$, und ziehe durch den Mittelpunkt desselben G den Durchmesser $HC\zeta$ des Kreises $AA'aa'$, so ist solcher die gesuchte Mittagslinie.

Denn stellt man sich, wie vorhin, den Kreis $AA'aa'$ nach und nach über den Durchmessern Aa , $A'a'$, $A''a''$ senkrecht auf die Ebene der Zeichnung aufgerichtet vor, so fallen O , O' , O'' in den Ort des Auges, den dieses in der stereographischen Projection der Kugelfläche einnimmt, und S , S' , S'' sind die Projectionen der Puncte B , B' , B'' , welche auf dem Umfange des Tagekreises der Sonne liegen, folglich ist der durch S , S' , S'' beschriebene Kreis $S S' S'' K$ die Projection des Tagekreises der Sonne. Nun halbirt $HCGK$, welche die Projection eines Verticalkreises, also eines größten Kugelkreises, ist, die Projection $S S' S'' K$ des Tagekreises der Sonne, folglich liegen (*Theodos. Sphaer. I. 14*) die Projectionen der Weltpole in HK , mithin ist dieselbe die Projection des Meridians auf die Ebene des Horizonts, d. h., die Mittagslinie.

Um

XLIX. Erläuterung e. Vorschrift üb. die Mittagslinie. 419

Um auch diese Verzeichnung analytisch herzuleiten, drücke man die Gleichung

$$\sin \delta = \sin \varphi \sin h - \cos \alpha \cos \varphi \cos h$$

so aus:

$$\begin{aligned} \cos \alpha \cos \varphi \cos h &= \sin \varphi \sin h - \sin 90^\circ \sin \delta \\ &= \frac{(1 + \sin h)(\sin \varphi - \sin \delta) - (1 - \sin h)(\sin \varphi + \sin \delta)}{2}, \end{aligned}$$

so wird durch Division mit $1 + \sin h$

$$\begin{aligned} \cos \alpha \cos \varphi \tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h) &= \frac{\sin \varphi - \sin \delta}{2} - \\ &\tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h)^2 \cdot \frac{\sin \varphi + \sin \delta}{2}, \end{aligned}$$

und eben so aus den beyden andern Gleichungen zwischen $\varphi, \delta, h', \alpha'$ und $\varphi, \delta, h'', \alpha''$

$$\begin{aligned} \cos \alpha' \cos \varphi \tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h') &= \frac{\sin \varphi - \sin \delta}{2} - \\ &\tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h')^2 \cdot \frac{\sin \varphi + \sin \delta}{2}, \\ \cos \alpha'' \cos \varphi \tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h'') &= \frac{\sin \varphi - \sin \delta}{2} - \\ &\tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h'')^2 \cdot \frac{\sin \varphi + \sin \delta}{2}. \end{aligned}$$

Setzt man nun zur Abkürzung

$$\tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h) = m$$

$$\tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h') = n$$

$$\tan(45^\circ - \tfrac{1}{2}h'') = p$$

$$\text{und} \quad \frac{\sin \varphi + \sin \delta}{2} = M,$$

so

ſo erhält man, wenn man die zweyte Gleichung (weil der Annahme zufolge n ſowohl kleiner als m , als auch kleiner als p iſt) von jeder der beyden andern beſonders abzieht,

$$(n \cos \alpha' - m \cos \alpha) \cos \phi = (mm - nn) M$$

$$(n \cos \alpha' - p \cos \alpha'') \cos \phi = (pp - nn) M.$$

Es iſt

$$\begin{aligned} n \cos \alpha' - m \cos \alpha &= (m+n) \frac{\cos \alpha' - \cos \alpha}{2} - (m-n) \frac{\cos \alpha' + \cos \alpha}{2} \\ &= (m+n) \sin \frac{\alpha' + \alpha}{2} \sin \frac{\alpha' - \alpha}{2} - (m-n) \cos \frac{\alpha' + \alpha}{2} \cos \frac{\alpha' - \alpha}{2} \\ &= (m+n) \sin (\alpha' + \tfrac{1}{2}\beta) \sin \tfrac{1}{2}\beta - (m-n) \cos (\alpha' + \tfrac{1}{2}\beta) \cos \tfrac{1}{2}\beta \\ &= (m+n) \sin \tfrac{1}{2}\beta [\sin (\alpha' + \tfrac{1}{2}\beta) - \frac{m-n}{m+n} \cos (\alpha' + \tfrac{1}{2}\beta) \cotg \tfrac{1}{2}\beta]. \end{aligned}$$

Macht man nun

$$\frac{m-n}{m+n} \cotg \tfrac{1}{2}\beta = \tan g A,$$

ſo wird

$$n \cos \alpha' - m \cos \alpha = \frac{(m+n) \sin \tfrac{1}{2}\beta \sin (\alpha' + \tfrac{1}{2}\beta - A)}{\cos A}$$

und

$$\sin \tfrac{1}{2}\beta \sin (\alpha' + \tfrac{1}{2}\beta - A) = (m-n) M \cos A.$$

Auf gleiche Weiſe wird, wenn man

$$\frac{p-n}{p+n} \cotg \tfrac{1}{2}\gamma = \tan g A'$$

nimmt, erhalten

$$\sin \tfrac{1}{2}\gamma \sin (\tfrac{1}{2}\gamma - \alpha' - A') = (p-n) M \cos A'.$$

Mithin iſt

$$\frac{\sin \tfrac{1}{2}\beta \cos A' \sin (\alpha' + \tfrac{1}{2}\beta - A)}{\sin \tfrac{1}{2}\gamma \cos A \sin (\tfrac{1}{2}\gamma - \alpha' - A')} = \frac{m-n}{p-n}.$$

Man

Man setze $\alpha' + \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma = \xi$, so wird

$$\frac{\sin \frac{1}{2}\beta \cos A' \sin (\xi + \frac{1}{2}\gamma - A)}{\sin \frac{1}{2}\gamma \cos A \sin (\frac{1}{2}\beta - A' - \xi)} = \frac{m-n}{p-n},$$

d. i. nach gehöriger Entwicklung der Ausdrücke $\sin (\xi + \frac{1}{2}\gamma - A)$ und $\sin (\frac{1}{2}\beta - A' - \xi)$

$$\begin{aligned} & \frac{\tan \xi (\cot g \frac{1}{2}\gamma + \tan A) + 1 - \cot g \frac{1}{2}\gamma \tan A}{1 - \cot g \frac{1}{2}\beta \tan A' - \tan \xi (\cot g \frac{1}{2}\beta + \tan A')} \\ & = \frac{m-n}{p-n}. \end{aligned}$$

Setzt man hier in den übers Kreuz gemachten gleichen Producten statt $(m-n) \cot g \frac{1}{2}\beta$, $(p-n) \cot g \frac{1}{2}\gamma$ ihre Werthe $(m+n) \tan A$, $(p+n) \tan A'$; so wird nach gehöriger Reduction erhalten

$$\begin{aligned} \tan \xi &= \frac{(m-p) (1 - \tan A \tan A')}{(m+p) (\tan A + \tan A')} \\ &= \frac{m-p}{m+p} \cot g (A + A'). \end{aligned}$$

Hier endigt sich die analytische Auflösung der Aufgabe. Denn da m , n , p , so wie β , γ gegeben sind, so ist sowohl A als A' und dadurch ξ gegeben, woraus man $\alpha' = \xi + \frac{1}{2}\gamma - \frac{1}{2}\beta$ hat.

Für die Darstellung der herausgebrachten Formeln durch eine Construction bemerke man zunächst, daß m , n , p die Katheten dreier rechtwinkligen Dreyecke sind, welche 1 zur Basis und $45^\circ - \frac{1}{2}h$, $45^\circ - \frac{1}{2}h'$, $45^\circ - \frac{1}{2}h''$ zu Winkeln an der Basis haben. Ferner sind A , A' die halben Differenzen der Winkel an der dritten Seite in zwey Dreyecken, in deren einem der Winkel β von den Seiten m und n , in dem andern aber der Winkel γ von den Seiten n

und p eingeschlossen wird. Man lege also in dem mit dem Halbmesser $CA = r$ beschriebenen Kreise $AA'A''$ die drey Halbmesser $CA, C'A, CA''$ unter den Winkeln β, γ an einander, so nämlich, daß $ACA' = \beta, A'CA'' = \gamma$ werde, so kommt es darauf an, auf den genannten Halbmessern die Stücke $CA \cdot \text{tang}(45^\circ - \frac{1}{2}h), C'A \cdot \text{tang}(45^\circ - \frac{1}{2}h'), CA'' \cdot \text{tang}(45^\circ - \frac{1}{2}h'')$ abzuschneiden. Dies wird dadurch erhalten, daß man jeden der Bogen $AO, A'O', A''O''$ einem Quadranten gleich macht, und nach der andern Seite von $Aa, A'a', A''a''$ zu, $AB = h, A'B' = h', A''B'' = h''$ nimmt, und $BO, B'O', B''O''$, welche die Halbmesser $CA, C'A, C''A''$ in S, S', S'' schneiden, zieht. Es ist nämlich alsdann der Winkel CSO , welcher die halbe Summe der Bogen Oa und AB zu seinem Maasse hat, $= 45^\circ + \frac{1}{2}h$, also wenn man sich CO , welche auf AC senkrecht seyn wird, gezogen denkt,

$$\begin{aligned} CS &= CO \cdot \cotg CSO \\ &= CA \cdot \text{tang}(45^\circ - \frac{1}{2}h) \\ &= m, \end{aligned}$$

und eben so

$$\begin{aligned} CS' &= CA' \cdot \text{tang}(45^\circ - \frac{1}{2}h') \\ &= n, \\ CS'' &= CA'' \cdot \text{tang}(45^\circ - \frac{1}{2}h'') \\ &= p. \end{aligned}$$

Demnach ist, wenn SS' und $S'S''$ gezogen werden,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(CS'S - CSS') &= A, \\ \text{und} \quad \frac{1}{2}(CS'S'' - CS'S) &= A'. \end{aligned}$$

Man

XLIX. Erläuterung e. Vorschrift üb. d. Mittagslinie. 423

Man ziehe noch SS'' , und setze

$$\frac{1}{2} (CS''S - CSS'') = A'',$$

so ist

$$\text{tang } A'' = \frac{m-p}{m+p} \cotg (180^\circ - \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma),$$

folglich

$$\text{tang } \xi \text{ tang } (A+A') = \text{tang } (180^\circ - \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma) \text{ tang } A'',$$

woraus, wenn für ξ sein Werth $\alpha' + \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma$ gesetzt wird, folgt

$$\text{tang } (180^\circ - \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma) : \text{tang } (\alpha' + \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma) = \\ \text{tang } (A+A') : \text{tang } A''.$$

Hieraus entsteht durch Verbindung und Trennung und aus dem Gleichen

$$\sin(\gamma - \alpha') : \sin(\alpha' + \beta) = \sin(A+A'+A'') : \sin(A+A'-A'')$$

d. i., wenn HCK die gesuchte Mittagslinie ist,

$$\sin S''CK : \sin KCS (= \sin S''CH : \sin HCS) \\ = \sin(A+A'+A'') : \sin(A+A'-A'').$$

Da

$$A = SS'C + \frac{1}{2}\beta - 90^\circ$$

$$A' = CS'S'' + \frac{1}{2}\gamma - 90^\circ$$

$$\text{und } A'' = CS''S + 90^\circ - \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma$$

$$= \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{2}\gamma - 90^\circ - CSS'',$$

so wird

$$A+A'+A'' = SS'S'' - 90^\circ + CS''S,$$

$$A+A'-A'' = SS'S'' - 90^\circ + CSS''.$$

Demnach ist

$$\sin S''CK : \sin KCS =$$

$$\sin(SS'S'' - 90^\circ + CS''S) : \sin(SS'S'' - 90^\circ + CSS'').$$

F f 2

Weil

Weil der Punct C als gegeben angesehen werden kann, indem solcher der Fußpunct des die Schatten Ca , Ca' , Ca'' werfenden senkrechten Stiftes ist, oder nach Willkühr angenommen wird, so bedarf es, damit die Mittagslinie HCK der Lage nach gegeben sey, nur der Kenntniß der Lage noch eines Punctes auf ihr. Dieser sey G , so ist, wenn GS , GS'' gezogen werden,

$$\sin S'CK : \sin KCS = \frac{GS''}{\sin CS'G} : \frac{GS}{\sin CS''G},$$

wodurch

$$GS' : GS = \frac{\sin(SS'S'' - 90^\circ + CS''S) \sin CS'G}{\sin(SS'S'' - 90^\circ + CSS'') \sin CS''G} :$$

wird. G sey da, wo die Mittagslinie HCK dem auf SS'' in ihrer Mitte errichteten Perpendikel begegnet, so ist

$$GS = GS''$$

$$\text{und } GSS' = GS''S.$$

Setzt man nun Kürze halber $SS'S'' - 90^\circ = \varepsilon$, $CS''S = \theta$, $CSS'' = \kappa$ und GSS'' oder $GS''S = \phi$, so hat man

$$\sin(\varepsilon + \theta) \sin(\kappa + \phi) = \sin(\varepsilon + \kappa) \sin(\theta + \phi),$$

woraus nach gehöriger Entwicklung

$$\tan \phi = \tan \varepsilon$$

also, weil ϕ nicht stumpf seyn kann,

$$\phi = \varepsilon = SS'S'' - 90^\circ$$

folgt. Und da

$$GS = \frac{SS''}{2 \cos GSS''},$$

$$\text{aber } SS'' = \frac{SS' \cdot \sin SS'S''}{\sin SS''S'},$$

so

so wird, weil $\cos GSS'' = \sin SS'S''$ ist,

$$GS = \frac{SS'}{2 \sin SS''S'}.$$

Nun ist

$$\begin{aligned} SS''S' &= 180^\circ - S'SS'' - SS'S'' \\ &= 90^\circ - GSS'' - S'SS'' \\ &= 90^\circ - GSS', \end{aligned}$$

mithin $GS = \frac{SS'}{2 \cos GSS'},$

oder $GS \cdot \cos GSS' = \frac{1}{2} SS',$

folglich halbirt der von G auf SS' gefällte Perpendikel die SS' , oder der Punct G ist in der auf SS' in ihrer Mitte errichteten senkrechten. Nun ist derselbe auch in der auf SS'' im Halbirungspuncte errichteten senkrechten, folglich der Mittelpunkt des um das Dreyeck $SS'S''$ beschriebenen Kreises, wodurch also die Lage von G und dadurch auch die der Mittagslinie HCK bekannt wird.

L.

Ueber einige unberechnete Cometen, deren Bahnen man vielleicht noch auffinden und berechnen könnte.

Vom Herausgeber.

Unter der grossen Menge von Cometen, deren die Geschichte und die astronomischen Urkunden Erwähnung thun, ist bey weitem der grössere Theil, davon die bis zu uns gelangten Nachrichten weiter nichts als ihre oft zweifelhafte Erscheinung zu erkennen geben. Wie oft sind Lufterscheinungen, Nördscheine, Feuerkugeln, ja selbst die hellleuchtende Venus für Cometen gehalten und ausgegeben worden! und wenn es auch wirklich Cometen waren. so sind sie doch grösstentheils nur so angegeben, daß man höchstens das Jahr, den Monat, den Tag, die Dauer und die Himmelsgegend ihrer Erscheinung benennt, welches den Astronomen auf keine genaue Spuhr ihres geocentrischen Laufes bringen kann. Man hat daher wenig Hoffnung, daß man unter den ältern Cometen, davon die vielen Cometographen so sorgfältige Nachrichten gesammelt haben, irgend solche Beobachtungen wird auffinden können, woraus sich auch nur wahrscheinliche Bahnen dieser Himmelskörper würden berechnen lassen. Die wahre beobachtende Astronomie begann eigentlich nur mit

Ende

Ende des sechszehnten, und mit Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts, in welche glänzende Epoche der Sternkunde auch die Entdeckung der Fernröhre fällt; also nur von diesem Zeitraume an wollen wir unsere Untersuchungen beginnen, und die Astronomen auf das, was wir gefunden haben, aufmerksam machen.

Im Jahre 1602, also nur fünf Jahre vor dem berühmten *Halley'schen* Cometen, erschien, wie *Lubienetzky* berichtet, ein solches Gestirn auf der Brust des Schwans. Dieser Comet wird sonst nirgends erwähnt. Allein, hat man auch alle möglichen Untersuchungen hierüber angestellt? Sollte man in dieser Zeit einen mit bloßen Augen sichtbaren Cometen so ganz unbeobachtet haben dahin streichen lassen? Wir sind gegenwärtig nicht in der Lage, selbst Nachforschungen hierüber anzustellen, allein einige Fingerzeige wollen wir denjenigen hier geben, welche in der Nähe reichhaltiger Bibliotheken diese Quellen auffuchen und nachschlagen können:

In demselben Jahre, als dieser Comet erschien, erschien auch in Wittenberg von einem *Abraham Rockenbach*, *De Cometis Tractatus novus methodicus*.

Im J. 1604 zu Frankfurth, *Joh. Letzner's Beschreibung der Cometen von Anfang der Welt her*.

Im J. 1605 zu Danzig, *Petri Crugeri Disputatio de Cometis, Praefide Hekermannno habita*.

Sollte in diesen drey Werken des Cometen von 1602 keine Erwähnung geschehen? In dieser Zeit wurde viel über Cometen geschrieben, wozu der *Kepler'sche Stern im Fuß des Schlangenträgers* (wel-

(welchen man anfänglich für einen Cometen hielt), und nachher der im J. 1607 erschienene große Halley'sche Comete die Veranlassungen waren.

Im J. 1647 erschien, nach *Hevelius*, ein Comete in der Gegend des *Haupthaars der Berenice*. Welche ist die Geschichte seiner Erscheinung, da von ihm sonst nirgends Erwähnung geschieht, da doch über die beyden vorhergehenden Cometen (1618) und über den nachfolgenden (1652) viel geschrieben worden?

J. 1666. Nach *Robert Knox* Beschreibung von *Ceylon*, Utrecht 1692, hat man den Schweif eines Cometen in *Ceylon* gesehen. Hat man nichts weiter von diesem Gestirne erfahren, und erwähnt keiner der Missionaire, welche damals schon auf die Himmelsbegebenheiten aufmerksam waren?

J. 1668. Von diesem Cometen scheint nur der Schweif beobachtet worden zu seyn. *J. D. Cassini* schrieb darüber seine bekannte *Spina celeste, meteoræ observata in Bologna, il mese di Marzo 1668, Bologna fol. 1668*. Man sehe auch das *Giornale di Roma* 1668, 1670, 1673; das *Journal des Savans*, Juillet 1668; die Pariser *Memoires de l'Acad. d. Sc.* An. 1702. Diese Erscheinung wurde auch, wie *Chardin* berichtet, in *Ispahan*, und von dem Jesuiten *P. Landen* in *Goa* vom 5ten bis zum 21ten März gesehen. Andere sahen sie in *St. Salvador* in Süd-Amerika, und längst der Küste des Vorgebirges der guten Hoffnung. *Cassini* glaubte hierinn einen Cometen viele Jahrhunderte vor Chr. Geb. zu erkennen, allein *Mr. Du-Tal* und *Mr. de Vignolles* widerlegten ihn, ersterer in den *Nouvelles de la Ré-*
publi-

publique des lettres, An. 1708 Decbr., letzterer in den *Miscellan. Berolinens.*, *Berolini 1710 pag. 251.* Auch *Gottigniez* hielt diese Erscheinung für einen Cometen, und gab in demselben Jahre zu Rom heraus: *De figuris cometarum qui annis 1664, 1665 et 1668 apparuerunt, cum brevissimis animadversionibus.* In den *Londner Philosoph. Transactionen* dieses Jahres wird auch eines Cometen erwähnt, welcher den 7. März in $0^{\circ} 16'$ der Länge, und in $20\frac{1}{2}^{\circ}$ südl. Breite gestanden haben soll. Ist dies die *Cassini'sche Spina*? Es hat noch niemand mit diesen Beobachtungen etwas versucht.

J. 1695. Dieses Cometen erwähnen der Jesuite *Noel*, in seinen *Observatt. mathemat. et physic. in Indiâ et Chinâ factae ab ann. 1684 ad ann. 1708*, *Pragae 1710*, und *J. D. Cassini*, in den *Pariser Memoiren* vom J. 1702. Er wird als *Comète sans tête* beschrieben, und wurde in Amerika und Aſien im Sternbilde des Raben gesehen. Der Jesuite *P. Jacob* beobachtete ihn in der *Baye aller Heiligen* in Brasilien vom 28. October an. Den 30. October sah ihn der Jesuite *P. Bouvet* in *Surate*, der Schweif nahm 18 Grade am Himmel ein, die Spitze, da wo eigentlich der Kopf oder Kern des Cometen hätte seyn sollen, traf auf das Bein des Raben. Den 2. Novbr. sah man diesen kopflosen Cometen in Amerika auf den Inseln *St. Anna*, die Spitze traf auf den Stern in der Brust des Raben, und den 5. Nov. berührte sie den Schnabel dieses Vogels. Man beobachtete dieses Gestirn in *Surate* bis zum 19. April 1696, nach welcher Zeit nur ein schwacher Schimmer seiner Strahlen zu bemerken war. *Cassini* bezeichnet seinen Lauf ziemlich

lich bestimmt, und muß daher genauere Nachrichten über ihn gehabt haben, welche sich vielleicht unter seinen vielen hinterlassenen und in Paris befindlichen Papieren noch auffinden lassen.

Im J. 1732 den 27. Februar hat man einen Cometen über der *Kornähre der Jungfrau* gesehen. Nur *Hanow* berichtet es. Der Jesuite *Nicas. Grammatici* spricht von einem Cometen vom J. 1730, *Dissertatio astronom. de Cometa annorum 1729 et 1730, Tyrnaviae 1736*. Ist es etwa auch nur ein Cometen-Schweif, und ist diese Erscheinung vielleicht identisch mit *Weidler's meteorolo lucido singulari anno 1730 mense Octobri conspecto, quâ observationes Madritenses et Wittebergenfes comparantur, Witteberg. 1731, ?*

J. 1750. *Wargentin* hat einen Cometen vom 21. bis 25. Januar dieses Jahres im *Pegasus* beobachtet. Sonst niemand? Wahrscheinlich hat man mit diesen wenigen Beobachtungen nichts unternehmen können.

Aeltere Cometen-Beobachtungen auffuchen, ihre Bahnen daraus berechnen, ist wol eben so verdienstlich und nützlich, als neue Cometen entdecken. Aus Druckschriften ist wol wenig mehr zu holen, da diese sorgfältig genug durchsucht worden sind, aber aus Handschriften läßt sich noch manche Nachlese erwarten, wie noch kürzlich zwey Beyspiele an den beyden Cometen von 1701 und 1737 bewiesen haben (*M. C. Bd. XXI. S. 316, 439*). In Paris existiren *au Dépôt de la Marine*, in den Archiven der vormaligen Academie der Wissenschaften, auf der Sternwarte, und auf manchen Deutschen Bibliotheken,

ken, wo vormals große Jesuiter-Collegia waren, wie z. B. in *Ingolstadt*, *München*, *Dillingen*, *Prag*, *Wien*, *Würzburg* etc. noch eine Menge Handschriften, welche nicht alle durchblättert worden sind. Wir bringen bey dieser Gelegenheit eine wenig bekannte Handschrift zur Anzeige, welche auf der öffentlichen Bibliothek zu *Lyon* aufbewahrt wird, und eine nähere Untersuchung verdient. Es ist ein *Curfus Astronomiae* von 484 Folio-Seiten. Der Verfasser ist ein gewisser *Leo de Balneolis*; die astronomischen Bibliographen erwähnen seiner nirgends, doch kommt er in dem *Catalogue de la Bibliothèque du Roi* unter der Nummer 7289 vor, wo er auf dem Titel eines Tractates über die Astronomie, im J. 1340 aus dem Hebräischen übersetzt, ein Jude genaunt wird. Das Lyoner Manuscript ist zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts verfaßt, und gegen Anfang des sechszehnten Jahrhunderts auf gutes Papier ziemlich reinlich abgeschrieben worden, aber wegen der vielen Abkürzungen schwer zu lesen. Astrologisches kommt gar nichts darinn vor, der Verfasser weist vielmehr den *Ptolomaeus* über die Irrthümer seines Weltsystems zu rechte. Er verspricht in der Einleitung drey Tractate, allein die Handschrift enthält nur die 110 ersten Capitel des ersten Tractates, welcher 134 Capitel enthalten sollte. Was diese Handschrift eigentlich bemerkenswerth macht, ist, daß darinn Beobachtungen vorkommen, welche der Verfasser im J. 1334 selbst angestellt hat. Auf alle Fälle verdient diese den Astronomen ganz unbekannte Handschrift eine nähere Untersuchung.

Die

Die unbekannten von Jesuiten in *Pekin* angestellten Beobachtungen des zweyten Cometen vom J. 1737, womit wir im XXI. Bande der *M. C. S.* 316 die Cometographie bereichert haben, und woraus nachher *M. Daussy* die Bahn berechnet hat (*Conn. des tems* 1812 p. 409), kommen wahrscheinlich aus irgend einer zerstreuten Jesuiten-Sammlung von Handschriften. Diefs bringt uns eine ähnliche große Sammlung von vierzehn Bänden in Erinnerung, in deren Besitz die Vaticanische Bibliothek in Rom ist, und die den Jesuiten und Missionnaire *Johann Adam Schall* zum Verfasser hat, und welche er selbst *Clemens X.* übersandte, und durch den *P. Intorcetta* diesem Pabst überreichen ließ. Uns ist nicht bekannt, ob man diese Sammlung je benutzt hat. Da *P. Schall* als Astronom bekannt ist, so ist zu vermuthen, daß diese Handschriften auch astronomische Beobachtungen enthalten werden. *P. Schall* war i. J. 1591 zu *Cöln* geboren, in seinem 30ten Jahre wurde er von seinem Orden nach *China* geschickt, wo er 23 Jahre lang Präsident des mathematischen Tribunals war. Der Kaiser *Xun-chi* soll ihm besonders gewogen gewesen seyn, ihm (gegen alle Chinesische Hof-Etiquette) zu allen Stunden den Zutritt erlaubt haben. Der Kaiser dagegen besuchte ihn viermal des Jahrs, überhäufte ihn und seine Nachkommenschaft bis ins dritte Glied mit großen Ehrentiteln, unter andern auch, eines *Meisters der Geheimnisse des Himmels*. Allein nach dem Tode dieses Kaisers ließ ihn sein Nachfolger ins Gefängniß werfen, allwo er auch den 15. August 1666 starb. Durch den Druck ist von ihm bekannt: *Historica rela-*

relatio de ortu et progressu fidei orthodoxae in regno Chinesi per Missionarios societatis Jesu ab anno 1581 usque ad annum 1669 novissime collecta, ex literis eorundem Patrum soc. J. praecipue R. P. Joan. Adami Schall, ex eadem societate. Editio altera et aucta, geographica Regni Chinesis dispositione, compendiosa narratione de statu Missionis Chinesis, prodigiis quae in ultima persecutione contigerunt, et indice. Ratisbonae 1672 in 4. Das Buch ist ziemlich selten, und das Jahr der ersten Ausgabe uns unbekannt.

LI.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Pietro Caturegli,

Astronom auf der königl. Sternwarte
zu Bologna*).

Bologna, am 15. Aug. 1812.

. . . . Ich eile Ihren Wunsch in Hinsicht der bey uns befindlichen alten handschriftlichen geographischen Karten zu erfüllen. Eine der ältesten befindet

*) Während meines kurzen vorjährigen Aufenthaltes in Bologna hatte in Abwesenheit des Herrn Ritter Ciccolini, dessen Bekanntschaft ich erst später in Mailand zu machen das Vergnügen hatte, Hr. Caturegli die Güte, mich mit den wissenschaftlichen Instituten des lange berühmten Bologna bekannt zu machen, und ich ergreife mit Freu-

det sich auf der kaiserlichen Bibliothek in *Parma*, von der mir der dortige Bibliothekar Hr. *Pezzana* eine Notiz gefälligst mitgetheilt hat. Die älteste der dortigen Karten oder Atlasse sind die im Jahre 1367 in Venedig von den Gebrüdern *Pizzigani* verfertigten, die Hr. *Pezzana* in einem besondern im Jahre 1807 herausgegebenen Werke beschrieben und erläutert hat. *) Leider kann ich Ihnen dieses interessante Buch wenigstens für den Augenblick nicht schicken, indem es hier nicht vorzufinden war. Genannter Bibliothekar theilte mir zugleich die Bemerkung mit, daß die älteste jetzt bekannte handschriftliche Karte wahrscheinlich die vom Jahre 1346 sey, die sich gegenwärtig auf der kaiserlichen Bibliothek zu *Paris* unter der Nr. 6816 befindet.

... Es ist nicht andern, daß die Franzosen alle älteren geographischen Karten aus der Bibliothek zu

Freuden die sich mir hier darbietende Gelegenheit, ihm meinen Dank für die freundschaftliche Gefälligkeit, mit der er mir seine Zeit zum Opfer brachte, öffentlich zu wiederholen. Ich erkundigte mich in Bologna, so wie in mehreren andern Städten Italiens, nach ältern geographischen Karten, und hierdurch wurde der vorstehende Brief veranlaßt, den ich schon längst unsern Lesern mitgetheilt haben würde, hätte ich nicht die Absicht gehabt, mehrere in dieser Hinsicht im Laufe meiner vorjährigen Reise von mir gesammelte Notizen in einem besondern Aufsatze zu geben, was denn aber jetzt meine temporair veränderten Verhältnisse nicht erlauben,

v. L.

*) Früher hat eine Nachricht von dieser Karte gegeben *Zanetti* in seiner Abhandlung: "*Dell' origine di alcune arti principali appreso i Viniziani 1758.*" v. L.

zu Bologna mitgenommen haben; die wenigen, von einigen Französischen Generalen und Commissairen in Beschlag genommenen, waren neuere topographische Karten, die zur Leitung der Kriegs-Operationen dienen konnten. Im Gegentheil bin ich so glücklich gewesen, den gegen Sie mündlich erwähnten alten Atlas auf unserer königlichen Bibliothek wieder aufzufinden. Es ist ein prächtiger Codex, der sechs hydrographische, schön gezeichnete, illuminierte und vergoldete Karten enthält. Auf der zweyten Karte befindet sich die Bemerkung: *Gratiosus Benincasa *) Anconitanus composuit Venetiis anno Domi-*

*) Ueber die hier erwähnte Karte von Benincasa findet sich in dem sehr interessanten geographischen Werke *Il Mappamondo di Fra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido Zurla, Venezia 1806*, folgende Notiz:

“ In tale Città specialmente apprese quanto di singolare, e recente delineò nella Tavola quinta, e sesta. In queste a tutta precisione si marcano i Paesi, ed Isole scoperte all’ Ovest dell’ Africa dal Veneto Patrizio Alvise Cadamosto fino al Rio Grande, a 11° di latitudine boreale, e la bocca vastissima di tal fiume come indeterminata a foggia di piccolo golfo fra terra insinuantesi si dipinge; oltre la quale si prosegue nella sesta predetta Tavola la costa fino a Capo S. Anna, e Rio de Palmieri colle Isole adjacenti, come si trova nel viaggio di Pietro di Sintra suddetto, che s’ inoltrò fino a Capo Cortese, o Misurato, cioè fino a 6° bor. nell’ alta Guinea. E siccome i progressi di scoperte a quelle parti non poco si rallentarono dopo la morte dell’ intraprendente Infante D. Enrico, avvenuta nel 1463. o 1460. come vuole il Foscari *Letter. Venez. I. 4, pag. 422*, così si può affermare

Domini MCCCCLXXIII. Wahrscheinlich ist die Jahrszahl 1471, indem die beyden letzten Zahlen hinzugefügt zu seyn scheinen. Die erste dieser Karten stellt den *Archipelagus* vor; die zweyte dasselbe Meer nebst dem *Adriatischen*; die dritte das ganze *Mitteländische* Meer; die vierte den Ocean von *Portugal* bis nach *Schottland*; die fünfte den südlichen Theil von *Portugal* bis zum *weißen Vorgebirge* an den Küsten von *Africa*; die sechste die Afrikanischen Küsten bis zum *Capo St. Anna*.

Auch findet sich in hiesiger Bibliothek eine andere große hydrographische Karte in zwey Blättern vom Jahre 1482, die von demselben *Benincasa* verfertigt ist, und die ganzen Europäischen Küsten, einen Theil der Africanischen, nebst dem nördlichen und westlichen Ocean enthält. Außerdem fand ich noch eine Menge historischer, Sitten, Gewohnheiten, Lage und Klima fremder Völker und Länder beschreibender, Handschriften, und gern werde ich Ihnen von diesen, so wie von einer Menge hier befindlicher gedruckter Landkarten aus dem 16ten Jahrhundert umständlichere Nachrichten mittheilen, wenn Ihnen solche wünschenswerth sind.

Anmer.

mare, che queste due ultime Tavole di Grazioso Benincasa riferiscono non solo i viaggi del Cadamosto, e del Sintra, come si disse, ma generalmente tutto ciò eziandio, che fino all'anno 1471. di tal lavoro era stato scoperto."

v. L.

Anmerkung zu vorstehendem Briefe:

Die oben erwähnte Karte von 1346 habe ich, während meines Aufenthalts in *Paris* in den Monaten März und April 1812, öfter in Händen gehabt, und ich würde mir gleich daselbst umständliche Notizen daraus excerpirt haben, hätte man mir nicht damals Hoffnung zur Erhaltung eines vollständigen Abdruckes davon gemacht, der aber bis jetzt nicht in meine Hände gekommen ist. Unsere Leser mögen es daher entschuldigen, wenn ich nur eine sehr unvollständige Nachricht darüber hier mitzutheilen vermag.

Der ganze Atlas besteht aus sechs, in einen Band gebundenen, dünnen, etwa eine Linie starken, hölzernen Tafeln, die mit Pergamen überzogen sind, auf dem Schrift und Zeichnung befindlich ist. Die Höhe jeder Tafel beträgt nicht ganz 2 Fufs, die Breite 8 bis 9 Zoll. Der Inhalt dieser Blätter ist im Wesentlichen folgender:

I. Seite. Calender-Angaben. — Der menschliche Körper mit Angabe der zwölf Himmelszeichen und der Bedeutung der Gliedmaßen.

II. Seite. Schriftliche Erklärung über die Art der Kartenzeichnung. Aeltere Angaben über Gröfse der Erde. Ueber die Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Welttheile.

III. und IV. Seite. Es kommen hier ein paar Angaben vor, die es wahrscheinlich machen, daß die Karte 1376 gezeichnet worden ist. Immerwährender Calender. Mondphasen, Epacten, Mondscyclen. Zeichnung des Planeten-Systems; die Erde
Mon. Corr. XXVIII. B. 1813. G g in

in der Mitte, hauptsächlich eingenommen von einer gekrönten sitzenden Figur, die ein Instrument in der Hand hält, fast wie ein Sextant gestaltet. Die Planeten folgen so: Luna, Mercurius; Venus, Sol, Mars, Jovis, Saturnus; dann der Sternenhimmel. Umher sind die Planeten durch menschliche Figuren bezeichnet. Dabey sind die Umlaufszeiten auf folgende Art angegeben:

I. *Sol CCCLXV Dies VI hor.*

II. *Venus CCLXVIII Dies* (nicht gut zu lesen).

III. *Mercurius evogilos XII signes en LXXXIX Dies.*

IV. *Luna evogilos XII signes en XXVII Dies c. VIII hor.*

V. *Jovis evogilos XII signes en XI ays. c. X meses c. XVI Dies.*

VI. *Saturnus evogilos XII signes en XXIX ays. c. V mes. c. XV Dies.*

VII. *Mars evogilos XII signes en I a. X mes. XXII Dies.*

In einem goldnen Ringe sind die zwölf Himmelszeichen angebracht. Auch befinden sich hier jüdische Calender-Bezeichnungen.

Zeit des Solstit. 16. Jun. 1^h. Zwischenraum bis zum ersten Grade des Krebses XXX D. XIII^h 7'. Aequinoct. 16. März. Solstit. 15. Decbr. Zwischenraum bis zum ersten Grade des Steinbocks XXX D. X^h. Aequin. 15. Sept. Vermöge einer hier befindlichen Aufschrift ist der Calender für die Jahre 1375, 1376 bestimmt.

V. und VI. Seite. Enthält einen Theil des südlichen Asiens.

VII. und VIII. Seite. Fortsetzung. Das Caspische Meer, *Mar de bacu*.

IX. und X. Seite. Ende von Asien. Theile von Europa und Afrika. Die geographische Darstellung ist nicht schlecht. Vom Archipelagus, meistens vergoldete Inseln, ist viel verwischt.

XI. und XII. Seite. Fortsetzung von Europa und Afrika; das ganze westliche Europa bis Spanien, nebst dem damals bekannten Ocean, in dem sich eine Menge von Inseln befinden.

Ich bedaure es jetzt auf das lebhafteste, nicht mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf das nähere Studium dieses höchst merkwürdigen geographischen Documents verwandt zu haben. Vielleicht gelingt es mir, durch diese fragmentarische Notiz irgend einen andern Geographen auf jenen Atlas aufmerksam zu machen, und dadurch zu einer gehörig wissenschaftlichen Beschreibung desselben zu veranlassen. — Da ich minder für mich selbst, als für einen meiner literarischen Freunde, Beyträge für eine Geschichte älterer Landkarten zu sammeln wünschte, so habe ich es mir im ganzen Laufe meiner Reise angelegen seyn lassen, Notizen hierüber einzuziehen, deren Resultate aber eben nicht sehr befriedigend waren. Der Drang der Umstände erlaubt mir in diesem Augenblicke nicht, irgend etwas geordnetes oder vollständiges darüber zu geben; allein da in dem jetzigen Zeitpuncte *Quintilian's* Ausspruch "*multa, dum perpoliuntur, intereunt*" wohl leicht

zur Wahrheit werden könnte, so beschränke ich mich vor der Hand darauf, ein paar Excerpte aus den mir zunächst liegenden Papieren zu geben, und ein paar in Italien zu dielem Behuf gekaufte Bücher zu nennen, die reichhaltigen Stoff enthalten, und die in Deutschland nur noch wenig bekannt zu seyn scheinen.

Außer dem erwähnten Atlas gelang es mir, wiederholter Anfragen ungeachtet, nicht, auf den zahlreichen Pariser Bibliotheken mehrere solche ältere Karten aufzufinden. Zum Theil war dieses meine eigne Schuld, da ich damals noch nicht auf handschriftliche Codices des *Ptolomaeus* aufmerksam war, in welchem ich erst nach Besuchung einiger italienischen Bibliotheken einen reichen Schatz älterer Karten-Zeichnungen entdecken lernte. So blieben auch alle meine Nachsuchungen in einem bedeutenden von mir durchreiseten Theile Frankreichs fruchtlos; entweder waren in den von mir besuchten Städten nie ähnliche geographische Documente vorhanden gewesen, oder es waren solche, wie man mir häufig sagte, im Laufe der Revolutionsstürme verschwunden. Nur in *Diano Marino*, einer kleinen am Meeres-Ufer liegenden Stadt auf dem Wege von *Nizza* nach *Genua*, soll, nach der Versicherung eines Marine-Beamten, ein Geistlicher leben, der im Besitz einer merkwürdigen Sammlung alter Landkarten ist. Leider traf ich den Geistlichen nicht zu Hause, und mußte so Verzicht auf seine Bekanntschaft thun, da mir die Umstände einen längern Aufenthalt nicht gestatteten. Doch erwähne ich den Umstand, da es sich wohl der Mühe verlohnt, daß andere

dere Reisende nähere Erkundigungen darüber einziehen.

Auch in *Genua*, wo ich übrigens mehr andere interessante geographische Werke, wie *Ramusio*, *Sannuto*, *Formaleoni* etc. um wahre Spottpreise bey Buchhändlern kaufte, konnte ich weder bey diesen, noch auf den dortigen Bibliotheken, die mindeste Nachricht von alten Landkarten erhalten; nur das erfuhr ich von einem jener Antiquare (in der Nähe der Kirche *Carignan*), daß alle vorhandene ältere Landkarten, sowohl in *Genua* als an andern Orten, von Herrn *de Baillou* zum Behuf einer Geschichte der Geographie des Mittelalters aufgesucht und aufgekauft worden wären. Zu meinem großen Mißvergnügen gelang es mir nicht, die persönliche Bekanntschaft dieses Gelehrten während meines Aufenthaltes in Italien zu machen, was ich um so mehr zu bedauern Ursache habe, da ich späterhin dessen vielseitigen Kenntnisse aus der Abhandlung: *Cav. de Baillou Geografo di S. M. il Re d'Etruria, Spiegazione delle Tavole riguardanti il viaggio nel basso ed alto Egitto riprodotte su quelle del Sig. Denon*, wo er S. 12 einen *Trattato sulle misure lineari, itinerarie . . . antiche e moderne* verspricht, kennen und schätzen zu lernen Gelegenheit hatte.

In *Florenz* lernte ich durch die Gefälligkeit der Herren Bibliothecare auf der *Mazzuchellianischen* Bibliothek und der zu *San Lorenzo* mehr sehr interessante Codices von der Geographie des *Ptolomaeus* kennen. Auf beyden waren mehrere vorhanden, und auf der von *San Lorenzo* wenigstens fünf. Ganz besonders zeichnete sich durch Schönheit der Schrift
und

und Malerey der eine aus; der Titel war: *Ptolomaei Geographia cum tabul. membr. in fol. max. saec. XV.* Die Aufschrift lautete: *Illustrissimo principi ac Domino Dno. Borsio, Duci Mutinae ac Regii Marchioni Estensi, Rodigrique Comiti, Dominus Nicolaus Germanus.* — In einer Dedicationschrift zeigt er umständlich die Aenderungen an, die er mit dem *Ptolomaeus* vorgenommen hat. Die erste Karte enthält die ganze damals bekannte Welt. Aeußerst sauber ist vieles mit Gold geschrieben, was den schönsten Glanz behalten hat. *Sinarum regio* und *Sinarum regio* sind verschieden; erstere weit nördlicher. Das *rothe Meer* und der *Nil* sind hier nicht, wie auf so vielen andern Karten des 16ten und 17ten Jahrhunderts, verzeichnet. Aufser der General Karte sind noch 29 Special-Karten dabey. Die letzte enthält *Taprobane Insula*, und bey dieser die Bemerkung: *haec diu ante Simondi insula dicebatur, nunc autem salva. Qui eam habitant, hominum vocabulo saltem notantur. Nascitur apud hos Orizemel, Zinibar et omnia metallorum genera, auro argentoque abundat. Elephantes quoque gignit et tigrides.* Die fünf Exemplare dieser Art, die ich auf der Bibliothek *di San Lorenzo* sah, waren für das Studium der Geographie des 15ten, 16ten und 17ten Jahrhunderts besonders darum höchst merkwürdig, weil in allen die Zeichnungen der Landkarten keinesweges bloße Copieen zu seyn, sondern vielmehr auf successiven Berichtigungen oder veränderten geographischen Ansichten zu beruhen schienen.

Für die Mazzuchellianische Bibliothek in Florenz finde ich unter meinen Papieren vorzüglich zwey solcher Codices erwähnt:

I. *Cl. Ptolomaei Cosmographia cum tabulis regionum NRJ.TPis et universis portubus et locis maritimitractus tam notis quam a rege portus Galli nuper repertis. Hoc ornatissimo Codice continentur —. Henricus Martellus Germanus fecit has tabulas.*

Ω

C.

M.

V.

Beatissimo patri Alexandro Quinto Pont. Max. Angelus.

Bey einem zweyten Codex; der sich durch sein besonders großes Format, und vorzüglich durch schöne, ganz auf Pergamen gemachte, Malereyen vor allen andern auszeichnete, war die Anmerkung befindlich: *Codex manusc. Ptolom. in bibliotheca Mazzuchelliana ornatissimus hic est.* Die Zeichnung kam im Wesentlichen mit dem vorherigen überein. Bey Taprobane stand die Bemerkung: *An:e Taprobanem chortes sunt insularum, quas dicuntur esse numero 1378; quae autem ad notitiam pervenere hae sunt...* Südlich von Taprobane sind noch eine Menge von Inseln angegeben; bey einer solchen südlichen Inselgruppe ist bemerkt: *Mamole insulae apud lapis Hercules invenitur.* Noch südlicher *Sinde Insulae, omnium harum incolae anthropofagi sunt.*

Auf

Auf der Sternwarte in *Bologna* zeigte mir Hr. *Caturegli* zwey Zeichnungen alter Landkarten. Auf der einen stand; *Hoc opus fecit Julius Caesaris Petricii Civis Senar. In civitate Pifar. anno Dni. MDLXXI.* Die Karte begreift nur Europa und Theile von Afrika und Asien. Die Lage des Nils und rothen Meeres ist richtig angegeben. Die Aufschrift der zweyten Karte ist: *Hanc panades mallorgui in pallermo any. 1556.* Auch diese Karte stellt hauptsächlich nur Europa dar. Im Norden ist Island, und dann südwestlich von dieser Insel noch eine grössere „*Frislandia*“ angegeben. Die Lage des Nils und des rothen Meeres ist hier ganz verschieden von der vorherigen; das rothe Meer enthält mehre Inseln, und liegt weit vom Nile ab. Städte sind fast gar nicht darauf angegeben.

Außer diesen Karten fand ich noch auf der Sternwarte zu *Bologna* ein paar große geographische Darstellungen in Chinesischer Sprache. Es waren zwey große Erd- und Himmels-Planisphären von 4 Fuß 7 Zoll im Durchmesser. Von sehr altem Dato konnten sie nicht seyn, da Amerika völlig und ziemlich richtig darauf dargestellt war. Nur im Norden war die Zeichnung irrig, weil es da mit Asien ganz zusammenhieng. Es verlohnte sich wol der Mühe, daß ein der Chinesischen Sprache kundiger Gelehrter (vielleicht Hr. Professor *Hager* in Mayland) diese seltenen Darstellungen näher untersuchte und beschrieb.

Unter allen Städten Italiens ist aber unstreitig für Geschichte der neuern geographischen Entdeckungen keine so interessant und wichtig, als *Venedig*.

dig. Bis zur Auffindung der neuen Welt wurden fast alle geographische Entdeckungen und Reisen von hier aus gemacht, und natürlich mußte sich dort, und namentlich in der *St. Marcus-Bibliothek*, ein Schatz geographischer Documente anhäufen, wie ihn kein anderer Ort der Welt aufzuweisen hat. Mit einem großen und dem wahrscheinlich reichhaltigsten Theile dieser literarischen Schätze haben uns mehre, um die ganze italienische Literatur überhaupt so hochverdiente, Männer, wie *Morelli*, *Formaleoni*, *Tiraboschi*, *Foscarini*, *Zurla* u. a. m., bekannt gemacht, und es würde eben so lächerlich als anmaßend von mir seyn, wenn ich, nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen in Venedig, zu jenen, auf vieljährigen Untersuchungen beruhenden, Resultaten irgend etwas hinzusetzen wollte. Nur das glaube ich hier sagen zu müssen, daß der Besuch der *St. Marcus-Bibliothek* und die dort zu machende Bekanntschaft des Ritters *Morelli* für jeden, der Geschichte der Geographie kennt und liebt, höchst interessant und genussvoll seyn muß. Abgerechnet die Menge handschriftlicher, zum großen Theil wenig oder gar nicht bekannter, geographischer Memoiren, kommen dort ältere geographische Darstellungen vor, die unter die allermerkwürdigsten dieser Art gehören. Hierher rechne ich hauptsächlich den Atlas von *Andrea Bianco*, die große Weltkarte von *Fra Mauro* (5 Par. Fufs 11 Zoll 7 Lin. von Süd nach Nord, 6 Fufs 7 Lin. von Ost nach West), und die in demselben Pallast im *Sala dello Scudo* an den Wänden befindlichen geographischen Darstellungen. Von diesen sämmtlichen merkwürdigen geographischen

schen

ſchen Documenten ſind jetzt genügende Beſchreibungen vorhanden. Die Karten von *Bianco* (1436) beſchreibt ſehr umſtändlich *Formaleoni* im T. VI. *Comp. de Viaggi* von *La Harpe*, und liefert ſpäterhin noch einen Nachtrag im T. XXII. deſſelben Werkes. Die Weltkarte von *Fra Mauro* hat neuerlich, und gewiß ſehr mit Recht, die Veranlaſſung zu einem beſondern Werke gegeben, welches im Jahre 1806 zu Venedig erſchienen iſt; *Il Mappamondo di Fra Mauro Camaldoleſe deſcritto ed illuſtrato da D. Placido Zurlo dello ſteſſ' ordine*. Endlich finden ſich von den im *Sala dello Scudo* befindlichen Zeichnungen ſehr umſtändliche Nachrichten in *Minerva de Letterati d'Italia Dicembre 1762, Venezia, p. 27*, und dann *Deſcrizione delle tele geografiche, rinovate ed accreſciute nella Sala dello Scudo, Venez. 1763*. Ich habe mehrere Stunden in dieſem Saale zugebracht, und mich gefreuet über die dort an den Mauern aufbewahrten Heldenthaten und Entdeckungen edler Venetianer in fremden Gegenden und Ländern. Schade, daß dieſe geographiſchen Gemälde nicht mehr die erſten urſprünglichen, und, wie Kenner behaupten, nicht ohne Fehler ſind. Die jetzigen rühren vom Dogen *Foscarini* her, und ſollen, wie es ſcheint, zum Theil das erſetzen, was letzterer in dem zweyten, leider nicht von ihm beendigten, Theile ſeines vortrefflichen Werkes, *Letteratura Veneziana*, über Venetianiſche Seefahrer beygebracht haben würde. *Morelli* äußert in dieſer Hinſicht in ſeiner *Differtazione intorno ad alcuni viaggiatori eruditi Veneziani poco noti, p. 4*: “*Un lieve compenſo di tanta perdita ci preſentano le Tavole Geografiche nella Sala del Palazzo già Ducale, detta dello Scudo, ripoſte, nelle quali*

dipinte

dipinte sono le regioni da' principali viaggiatori Veneziani o scoperte o visitate, con iscrizioni appostevi, nelle quali il tempo e il merito di ciascuno di loro è dichiarato; perciocchè essendo quelle Tavole state ivi in parte rifatte e in parte aggiunte per consiglio e provvedimento del Foscari, e con la soprantendenza e qualche opera ancora di lui, ne pochi mesi del suo Dogado, il lavoro interamente stato eseguito; vengono esse a presentare in un certo prospetto le maggiori e più famose imprese de' viaggiatori nostri, da lui pubblicamente autorizzato. Sebbene, per avere in quell' affare avuta grande mano persona presuntuosa e che alla volontà altrui difficilmente arrendevasi, vogliono quelle Tavole essere con cautela guardate; non già con buona fede tenute siccome corrispondenti alle vecchie, che vi erano, e sono poi andate perdute; cosa che altrove avrò forse occasione di svolgere, pubblicando ancora qualche curiosa notizia sì intorno a queste, come ad altre Tavole Geografiche, già nel Palazzo medesimo state dipinte, e in grande pregio tenute."

Auch bey den eben so gelehrten als freundlichen Armenianischen Mönchen auf St. Lorenzo bey Venedig fand ich geographische Schätze mancher Art, deren Benutzung aber, da sie meistens orientalischer Art waren, einen sprachkundigern Mann erfordern, als ich bin. Mögen jene Eintiedler, wenn anders diese Zeitschrift nach Venedig gelangt, hier meinen herzlichsten Dank für ihre wohlwollende Aufnahme, und für die angenehmen lehrreichen Stunden finden, die ich am 27. Julius 1812 in ihrer Gesellschaft verbrachte.

In Mailand verdient die Ambrosianische Bibliothek, wol allein die Reise eines Gelehrten dahin. Aus
den

den Werken eines *Muratori*, *Saffi* und *Amoretti* ist die dortige Sammlung von Manuscripten zwar zum Theil bekannt, allein erschöpft ist dieser Schatz noch bey weitem nicht. Ich weiß dieses sowohl aus eigener Ansicht, als aus Hrn. *Amoretti's* Munde, dem wir doch schon manches Schöne daraus verdanken und gewiß noch verdanken werden.

Unter den dort befindlichen handschriftlichen Ausgaben des *Ptolomaeus* habe ich mir vorzüglich zwey, die sich durch Schönheit und Seltenheit auszeichneten, notirt. Unter die erste Rubrik gehörte:

Cl. Ptolomaei de Cosmographia lib. VIII a Jacobo Angelo Florentino latine redditi anno 1410. editi deinde saepius ut videre licet apud Marsuchellum de scriptoribus Italicis, V. Dabey war bemerkt: *Codex pulcherrimus atque ille ipse probabiliter qui Alexandro V. Summo Pontifici ab auctore oblatus.* — In den schön illuminirten, zum Theil vergoldeten, Karten ist das Land weiß gelassen, das Meer dunkelblau; Städte sind gar nicht darauf angegeben. Wie mir Hr. *Amoretti* sagte, befindet sich ein diesem ganz ähnliches Exemplar im Vatikan.

Merkwürdiger ist der folgende Codex, da dieser griechisch ist, und unstreitig unter die seltensten Ausgaben von der Geographie des *Ptolomaeus* gehört:

Claudii Ptolomaei Geographia. Dionysius de situ orbis. Cum commentariis incogniti auctoris. Codex optimus atque annis abhinc amplius quadringentis scriptus; ex insula Chio adductus 1606. Auf dem ersten Blatte steht: *Portato da Scio da Stephano Mauro gardato.* Die Abfassung dieses Codex fällt unstreitig ins zwölfte oder dreyzehnte Jahrhundert. Schrift und Zeichnung der dabey befindlichen Landkarten documentiren dies.

Alle

Alle Karten sind mit der Feder, aber nur in groben Umrissen und ohne Symmetrie und Schönheit gezeichnet. Eine Menge Anmerkungen, selbst Arabische, begleiten den Text, und es ist gewiß sehr wünschenswerth, daß Hr. *Amoretti* sein gegen mich geäußertes Vorhaben, diesen Codex herauszugeben, erfüllen möge. Wie mag es wol kommen, daß man so häufig handschriftliche Ausgaben der Geographie des *Ptolomaeus* antrifft (ich glaube deren zwölf und mehrere gesehen zu haben), während dagegen die des *Almagests* so höchst selten, ja fast einzig, sind?

Ich schliesse diese fragmentarischen, eilig hingeworfenen, Notizen mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß man solche ja nicht als den Versuch einer Bereicherung unserer geographischen Literatur, sondern nur als den Wunsch ansehen möge, daß andere Reisende, deren Verhältnisse einen längern Aufenthalt in Italien als die meinigen gestatten, aufmerksam auf die geographischen Schätze der Italienischen Bibliotheken werden, und umständlich befriedigende Notizen darüber auf Deutschen Grund und Boden verpflanzen mögen.

Eben in dieser Hinsicht bringe ich hier auch noch die Titel einiger Bücher bey, die ich mir in Italien erkaufte, um daraus einen eigenthümlichen geographischen Aufsatz für diese Zeitschrift zu bearbeiten, da sie, wie ich glaube, wol größtentheils in Deutschland noch minder bekannt sind, als sie es ihrem innern literarischen Werthe nach zu seyn verdienen:

1. *Monumenti Veneziani di varia Letteratura per la prima volta pubblicati. Venezia 1796.*

2. *Me-*

2. *Memorie storiche su la vita gli studi e le opere di Leonardo da Vinci, scritte da Carlo Amoretti. Milano 1804.*
3. *Della Patria di Cristoforo Colombo, Dissertazione pubblicata nelle Memorie dell' Accademia imperiale delle Scienze di Torino. Firenze 1808.*
4. *Ricerche storico-critiche sull' opportunita' della laguna Veneta pel Commercio, sull' arti, e sulla marina di questo stato. Venezia 1803.*
5. *Francesconi illustrazione di un Urnetta all' Agemina. Padova 1800.*
6. *Carli sulla scoperta dell' America. Milano 1802.*
7. *Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatori eruditi Veneziani poco noti. Pubblicata . . . da Don Jacopo Morelli. Venezia 1803.*
8. *Il Mappamondo di Fra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido Zurla dello stess' ordine. Venezia 1806.*

Die beyden letztern Werke sind für geographische Literatur die interessantesten. Wie viele unserer Leser kennen wol nur dem Namen nach die Venetianischen Reisenden Paolo Trevisano, Giovanni Bembo, Pellegrino Brocardi, Ambrogio Bembo, Giannantonio Soderini, Benedetto Dandolo, Buonajuto Albani, Tommaso Gradenigo, Niccolò Brancaleone, Antonio Priulli, Carlo Maggi, Cecchino Martinello, von denen Morelli in der angeführten Abhandlung biographische Notizen mittheilt.

Höchst reichhaltig für die Geschichte geographischer Entdeckungen und älterer Landkarten ist Nro. 8. Ich behalte es mir vor, zu einer andern Zeit einen Auszug daraus in diesen Blättern zu liefern, da ich
mich

mich jetzt darauf beschränken muß, nur die allgemeine Inhalts-Anzeige auszuheben:

1. *Studio dell' antica Geografia.*
2. *Tavole, e Portolani specialmente in uso appo i Veneziani. F quali anche per altri argomenti hanno la primaria influenza al risorgimento della Geografia, e ciò massime riluce dal Mappamondo di Fra Mauro.*
3. *Patria, condizione, epoca, studi, lavori di Fra Mauro.*
4. *Medaglia in di lui onore.*
5. *Mappamondo per Portogallo.*
6. *Grandezza, forma, e parti del nostro.*
7. *Artifizio, e pittoreschi disegni.*
8. *Nord d'Europa.*
9. *Viaggio del Querini.*
10. *Degli Zeni.*
11. *Indizio d'America.*
12. *Viaggi di Marco Polo, ed altri Veneziani in Asia.*
13. *Nord d'Asia, Catajo, India, Persia, e altre parti d'Asia.*
14. *Isole d'Asia.*
15. *Particolarità del Mar Indiano.*
16. *Costa occid. d'Africa.*
17. *Viaggi colà del Cadamosto.*
18. *Nilo, sue fonti, e inondazioni. Abissinia.*
19. *Estremità d'Africa nell' Isola Diab.*
20. *Giro attorno essa asserito, ed influenza ai Viaggi Portoghesi, e forse anche a quelli del Colombo.*
21. *Isole d'Africa.*
22. *Distanza dei Cieli, e loro numero. Flusso e riflusso del Mare.*

23. *Terra abitabile sopra il livello dell' acqua. Paradiso terrestre.*
24. *Diversa quantità degli Elementi. Zona torrida abitabile.*
25. *Pregi del Mappamondo. Versione latina delle di lui note, e copia di esso fatta dai Fiorentini, e per la Corte di Londra.*
26. *Autori che lo celebrano; e' lavoro originale, e intatto di Fra Mauro.*
27. *Autori citati da Fra Mauro nelle sue note.*

v. L.

LII.

Himmels-Karten
des Herrn Professor *Harding*
in Göttingen.

IV. *Lieferung.*

Wir machen hier die etwas verspätete Anzeige von der schon vor einiger Zeit erschienenen *vierten* Lieferung dieser trefflichen Himmelskarten, welche als graphische Darstellungen des gestirnten Himmels in jeder Rücksicht die vollkommensten unter den schon vorhandenen sind. Die vor uns liegende neue Lieferung besteht aus den Blättern XI, XII, XIII und XIV, mit deren näherem Inhalte wir jetzt unsere Leser bekannt machen wollen:

Blatt

Blatt XI.

Gerade Aufsteigung: Von II^h 36' bis V^h 24'

Abweichung: Von — 33° bis + 1°

Sternbilder: *Cetus*, *Harpa Georgii*, *Eridanus*,
Sceptrum Brandenburgicum, *Orion*, *Lepus*, *Caela*
sculptoris und *Apparatus chemicus*.

Blatt XII.

Gerade Aufsteigung: Von V^h 16' bis VIII^h 4'

Abweichung: Von — 33° bis + 1°

Sternbilder: *Orion*, *Lepus*, *Columba*, *Monoceros*,
Canis major, *Officina typographica* und
Argo navis.

Blatt XIII.

Gerade Aufsteigung: Von VII^h 56' bis X^h 44'

Abweichung: Von — 33° bis + 1°

Sternbilder: *Monoceros*, *Officina typographica*,
Argo navis, *Pyxis nautica*, *Hydra*, *Sextans* *Uraniae*,
Felis und *Antlia pneumatica*.

Blatt XIV.

Gerade Aufsteigung: Von X^h 36' bis XIII^h 24'

Abweichung: Von — 33° bis + 1°

Sternbilder: *Leo*, *Crater*, *Cauda Hydrae*, *Antlia pneumatica*,
Virgo, *Corvus* und *Centaurus*.

Auf diesem Blatte ist, wie uns der Herr Verfasser selbst gütigst mittheilte, vom Kupferstecher aus Versehen *Corvi* als Stern dritter Grösse angegeben,

Mon. Corr. XXVIII. B. 1813.

H h

statt

statt daß derselbe nur als einer der *fünften* GröÙe hätte gestochen seyn sollen.

Mit vollem Rechte gebührt auch dieser Lieferung dasselbe Lob, welches wir den frühern ertheilt haben; denn sie tritt diesen in Ansehung der Präcision und Vollständigkeit würdig zur Seite. Mit der größten Sehnacht sehen wir der gänzlichen Vollendung dieses vortrefflichen Himmels-Atlases entgegen, und wir können nicht umhin, hier schon im Voraus, im Namen aller beobachtenden Astronomen, dem würdigen Verfasser unsern wiederholten Dank abzustatten für die eben so höchst nützliche als mühsame Arbeit, welche nur ein unermüdeter Eifer für die Wissenschaft projectiren und ausführen konnte.

LIII.

Auszug aus einer Abhandlung
des

Hrn. Dr. *W. Herschel*

über den grossen Cometen von 1811.

Vorgelesen am 19. December 1811.

Es ist hinlänglich bekannt, welcher ausserordentlichen Mittel sich *Herschel* bedient, um den unendlichen Himmelsraum zu durchdringen. Gewiss hat bey der Erscheinung des schönen Cometen von 1811 ein jeder, dem es um eine nähere Kenntniß der physischen Beschaffenheit der Weltkörper zu thun ist, den lebhaftesten Wunsch geäussert, auch über diesen Himmelskörper die Resultate der Beobachtungen jenes berühmten Astronomen kennen zu lernen. In dieser Rücksicht glauben wir, nicht nur den eigentlich mathematisch-astronomischen Lesern dieser Zeitschrift, sondern auch den blossen Liebhabern der Wissenschaft einen angenehmen Dienst zu erweisen, wenn wir hier jetzt aus der gedachten interessanten Abhandlung die Hauptresultate der Beobachtungen *Herschel's* zusammenstellen.

Bekanntlich hatte die Bahn des Cometen für astronomische Beobachtungen eine vorzüglich günstige Lage. Der Verfasser, welcher diesen Umstand benutzte, beobachtete ihn also mit der angestrengtesten und unermüdetsten Aufmerksamkeit in allen

Theilen seiner Bahn, indem er dabey Teleskope anwandte, welche alle erforderlichen Grade von Helligkeit, Deutlichkeit und Vergrößerungskraft besaßen. Die Beobachtungen sind so zahlreich und so oft wiederholt, daß sich der Verfasser in seiner Abhandlung darauf beschränkt, bloß diejenigen auszuwählen, welche unter den günstigsten Umständen gemacht sind, und darauf abzuwecken, die sonderbaren Eigenthümlichkeiten in der Conformation dieses Himmelskörpers zu bestimmen. Da der Verfasser bey diesen Beobachtungen seine Aufmerksamkeit besonders auf alle diejenigen Eigenthümlichkeiten richtete, die ihm vorzüglich einer nähern Untersuchung werth zu seyn scheinen, so hielt er es für zweckmäßiger, seine Beobachtungen nicht nach der Zeitfolge zusammen zu stellen, sondern sie nach den besondern Gegenständen zu classificiren, worauf sie sich beziehen.

Die Beobachtungen des Haupttheils des Cometen, nämlich des eigentlichen *Cometen-Körpers*, machen den Anfang. — Sehr bald bemerkte der Verfasser in der Mitte der Lichtmasse, welche man ihres vorzüglichern Glanzes wegen den Kopf des Cometen zu nennen pflegt, einen hellleuchtenden Punct, der trotz seiner außerordentlichen Kleinheit doch ganz abgefondert von der ihn umgebenden Lichthülle erschien. Er wurde mit einem 7füßigen, einem 7füßigen und zwey 10füßigen Teleskopen untersucht, aber ein jedes dieser Instrumente bestätigte übereinstimmend die Realität jener Erscheinung. Der Verfasser nennt diesen Punct den *planetarischen Körper*, um ihn von der ihn umgebenden

gebenden Hülle, oder seiner Athmosphäre, zu unterscheiden, mit welcher sich derselbe für unbewaffnete Augen, oder beym Gebrauch schwächerer Instrumente, vermischt. Mit einem Hohlspiegel von zehn Fufs Brennweite, aber von ganz vorzüglicher Klarheit, untersuchte *Herschel* an allen heitern Abenden dieses Körperchen, und machte dabey die Bemerkung, dafs, obgleich der Umfang desselben gewifs eine runde Form haben müsse, doch nur sehr selten sich die Gelegenheit darbot, durch sichere Merkmale diese Rundung ausser allen Zweifel gesetzt zu sehen. — Den 19ten October wurden Ocular-Gläser von 169, 240, 300, 400 und 600maliger Vergrößerung gebraucht, und mit einem jeden derselben der Lichtpunct sorgfältig beobachtet. Die 169malige Vergrößerung zeigte, dafs der Körper ungefähr im Vergleich dieselbe Gröfse hatte, wie ein Kügelchen, welches der Verfasser des Morgens mit demselben Teleskope und demselben Oculare beobachtet hatte, und welches, vermöge seiner bekannten Gröfse und Entfernung, sich unter einem Winkel von $1,39$ zeigte. Da indessen dieser so gefundene Durchmesser wegen der gewöhnlichen optischen Täuschung, wodurch alle kleinen hellglänzenden Punkte vergrößert werden, noch einigem Zweifel unterworfen seyn konnte, so wurde nachher die 240malige und 300malige Vergrößerung gebraucht; jedoch änderte sich bey diesen der Durchmesser nicht merklich. Die 600malige Vergrößerung zeigte aber den Lichtpunct weit besser, als die 400malige, und diese wurde also angewandt, um ein sicheres Resultat über die scheinbare Gröfse desselben zu erhalten. Durch Vergleich-

gleichung des Körpers mit mehrern der Gröſſe und Entfernung nach bekannten Kugelchen ergab es ſich, daß der Durchmesser des Cometen an jenem Tage ungefähr $\frac{2}{3}$ " gewesen ſey. Als ein Mittel aus allen Beobachtungen ſetzt der Verfaſſer dieſen ſcheinbaren Durchmesser = 0,275. Aus den damals ſchon hinlänglich genau bekannten Elementen der Bahn des Cometen wurde die beyläufige Entfernung deſſelben von der Erde für jene Epoche = 114 Millionen (Engliſche) Meilen berechnet, und ſonach aus dieſen Datis der wahre Durchmesser des Cometen-Körpers = 428 Meilen erhalten.

Nicht immer nahm der Lichtpunct die Mitte der ihn umgebenden Hülle ein, ſondern ſeine Lage war oft mehr oder weniger excentriſch. So erſchien er bey den Beobachtungen vom 16ten und 17ten October, wie auch am 4ten und 10ten November. Seine Farbe war blaſsröthlich, und glich der gewiſſer Fixſterne, die eben ſo klein erſcheinen. Zur Zeit der Beobachtungen, welche der Verfaſſer vorzüglich über die Erleuchtung des Lichtpunctes anſtellte, verhielt ſich, vermöge der Lage des Cometen gegen die Sonne, die erleuchtete Phaſe deſſelben zur vollen Scheibe, ungefähr wie 16 zu 20. Aus dieſem Verhältniſſe, ſo wie beſonders aus dem hervorstechenden Lichte, welches der Körper ungeachtet ſeiner außerordentlichen Kleinheit zeigte, ſchließt der Verfaſſer, daß dieſes Licht ihm größtentheils eigenthümlich ſey.

Der Verfaſſer wendet ſich nunmehr zu der Betrachtung der *Lichtmaſſe*, welche jenen leuchtenden Punct umgab, und zeigt hier zuvörderſt, daß der ſcheinbare Kern, welchen man mit ſchwachen Inſtru-

Instrumenten im Kopfe des Cometen zu finden glaubte, nur eine optische Täuschung war, die durch eine Anhäufung des Lichtes in einem Raume, dessen scheinbarer Durchmesser nur wenige Minuten betrug, verursacht wurde. Selbst im grossen, 10füssigen Teleskope hatte der Comet bey 110maliger Vergrößerung am 18ten September das Ansehn eines schönen Nebelflecks von 5 bis 6 Minuten im Durchmesser; bey stärkern Vergrößerungen aber zeigte sich im Centrum obiger helle Punct, umgeben von einem nach und nach abnehmenden Lichte.

In allen Teleskopen erschien der Kopf des Cometen immer in einer höchst merkwürdigen eigenthümlichen Farbe. Sie war beständig grünlich oder bläulich-grün; und obgleich im Allgemeinen eine Anhäufung des Lichts gegen das Centrum statt fand, so schien es doch, als wenn sich auf der nach der Sonne gekehrten Seite ein grösserer Theil befand, als es eigentlich hätte der Fall seyn sollen, wenn das Licht überall gleichförmig vertheilt gewesen wäre. Der helle Punct war immer weiter von der Sonne entfernt, als die Mitte des glänzendsten Theils der ihn umgebenden Atmosphäre. Diese Excentricität des Kerns war so beträchtlich, daß bey der Schwierigkeit, mit welcher der Lichtpunct gesehen ward, letzterer sehr leicht dem Beobachter ent schlüpfen konnte, wenn er ihn fortwährend im scheinbaren Centrum der Lichthülle gesucht hätte.

Um die eigentliche Grösse des Cometen-Kopfes zu bestimmen, untersuchte ihn der Verfasser mit seinen drey Teleskopen von 7, 10 und 20 Fufs. Er schätzte den Durchmesser desselben nach seinem Verhält-

hältnisse zu dem bekannten Gesichtsfelde, welches die verschiedenen gebrauchten Oculare gaben. Den 29ten September zeigte ihn das 10füßige Teleskop in der scheinbaren GröÙe von ungefähr 3 Minuten; den 6ten October war, bey der Beobachtung mit dem 20füßigen Teleskope, dieser Durchmesser 3' 45". Auf die letztere Bestimmung legt der Verfasser den meisten Werth, und er findet hieraus die wahre GröÙe des Durchmessers ungefähr 127000 Meilen.

Die Untersuchung der höchst merkwürdigen *elastischen und durchsichtigen Athmosphäre*, welche den dunkeln Zwischenraum zwischen dem Schweife und Kopfe des Cometen bildete, beschäftigt zunächst den Verfasser. "Mit allen Instrumenten", sagt er, "mit welchen ich den Cometen untersuchte, sah ich rings um dem Kopfe einen verhältnißmäÙig sehr schwach beleuchteten oder vielmehr ganz dunkeln Raum, wo auf einmal das nach und nach abnehmende Licht des Central - Körpers gänzlich verschwand. Man kann diese Erscheinung nicht wohl anders erklären, als durch die Annahme, daß der Kopf des Cometen von einer elastischen, durchsichtigen Athmosphäre umgeben gewesen sey. Den 18ten Septbr. hatte ich die Gelegenheit, mich von dieser Durchsichtigkeit zu überzeugen; denn ich erblickte im Innern dieses ringförmigen Raumes drey sehr kleine, aber der GröÙe nach verschiedene, Sterne. Auf die Elasticität der Athmosphäre kann man aus der kreisförmigen Gestalt schließen, unter welcher sie beständig erschien. Denn da sie von einer concentrischen Lichthülle umgeben war, so kann man die gleiche Entfernung der letztern vom Mittelpuncte nicht füglich anders erklären,

ten,

ren, als wenn man zwischen dem Kopfe des Cometen und der in einer gewissen Distanz ihn einschliessenden Lichthülle einen Raum annimmt, der mit einem elastischen, athmosphärischen Fluidum angefüllt war."

Den 6ten October nahm dieser kreisförmige dunkle Zwischenraum gerade das Gesichtsfeld des Teleskops ein, was für seinen scheinbaren Durchmesser 15 Minuten giebt. Die wahre Grösse des Durchmessers betrug also, nach der damaligen Distanz des Cometen, mehr als 507000 Meilen. Diese Grösse ist ein Minimum; denn es ist keine Beobachtung vorhanden, die angeben könnte, wie weit sich die Athmosphäre noch über diese Grenze hinaus erstreckte.

Es folgt nunmehr in der Reihe der zu untersuchenden Theile des Cometen die Beschreibung der glänzenden Lichthülle, wovon die Athmosphäre desselben begrenzt war. Den 9ten und 10ten September, an welchen Tagen sich *Herschel* in *Alnwick* befand, hatte er Gelegenheit, den Cometen mit einem achromatischen Fernrohre zu untersuchen, welches nur 65mal vergrösserte. Er sah, daß der Kopf des Cometen an der einen Seite von einem Lichtschleier umgeben war, welcher in einer gewissen Distanz vom Kopfe durch einen zwischenliegenden dunkeln Ring gehalten wurde. Betrachtete man diese Umgebung mit Fernröhren, die nur 16mal oder noch weniger vergrösserten, so erschien die Gestalt derselben ungefähr kreisförmig, aber sie machte nicht ganz die Hälfte des Umfangs vom Cometen aus, indem sich das Licht in zwey Zweige theilte, die auf jeder Seite des Cometen - Kopfes fortgiengen. In den
Teles.

Teleskopen von 7, 10 und 20 Fuß hatte diese Licht-
hülle eine sehr bestimmte gelbliche Farbe, die einen
auffallenden Contrast mit der grünlichen Farbe des
Kopfes bildete. Die Entfernung des äußersten Ran-
des der Lichthülle vom Centrum des Kopfes in der
Richtung einer nach der Sonne gezogenen Linie
war ungefähr 9' 30". Nimmt man an, daß sich diese
Linie seitwärts bewege, und einen Halbkreis um den
Cometen bilde, so war hiernach der scheinbare
Durchmesser desselben ungefähr 19 Minuten, was
für dessen wahre GröÙe etwas mehr als 643000 Mei-
len giebt.

Die merkwürdigste Erscheinung, welche über-
haupt die Cometen auszeichnet, ist unstreitig jener
Lichtstreifen, welchen man ihren *Schweif* nennt,
und zu dessen näherer Beschreibung in Beziehung auf
unsern Cometen der Verfasser jetzt übergeht. — Man
weiÙ, daß die Länge dieses Schweißes mannichfal-
tigen Veränderungen unterworfen ist; Ursachen, die
von den wirklichen Dimensionen desselben ganz un-
abhängig sind, modificiren seine scheinbaren Dimen-
sionen, und bewirken, daß man in dieser Hinsicht
nur höchst beyläufige Schätzungen erhalten kann.
Den 2ten September, wo der Mond über dem Hori-
zonte war, der Comet sehr niedrig stand, und die
Luft mit Dünsten angefüllt war, bemerkte der Ver-
fasser gar keinen Schweif; den 9ten hatte der Comet
einen sehr kenntlichen von 9 bis 10 Grad Länge, den
18ten erstreckte er sich bis auf 11 oder 12 Grade, und
den 6ten October war er 25 Grade lang. Den 12ten
October wurde er wieder nur 17 Grade geschätzt,
den 14ten 17½, und den 15ten, wo ihn der Verfasser
mit

mit vieler Aufmerksamkeit und bey einem sehr günstigen Zustande der Athmosphäre beobachtete, fand er ihn von $23\frac{1}{2}$ Grad Länge. An diese letzte Beobachtung glaubt sich der Verfasser besonders halten zu müssen, wegen der vorzüglich günstigen Umstände, unter welchen sie gemacht wurde. Wird hierbey die schiefe Lage des Schweifes in Beziehung auf die Erde mit berücksichtigt, so findet es sich, daß die wahre Länge desselben damals über 100 Millionen Meilen betrug, also ungefähr der Entfernung der Erde von der Sonne gleich war. — Bey der Breite des Schweifes hielt es sehr schwer, sie nur auf irgend eine, einigermaßen genaue Art durch Beobachtungen zu bestimmen. Den 12ten October war die grösste Breite ungefähr $6\frac{1}{2}$ Grad, und bey einer Entfernung von 5 oder 6 Graden vom Cometen-Kerne fing der Schweif an, etwas schmaler zu werden. Den 15ten war in der Gegend der Mitte des Schweifes die Breite desselben ziemlich gleichförmig. Die Beobachtung vom 12ten giebt für die wirkliche Breite ungefähr 15 Millionen Meilen.

Was die Krümmung des Schweifes anbetrifft, so war diese am 9ten und 10ten September sehr beträchtlich; den 18ten zeigte sie sich am äussersten Theile des Schweifes gerade so, als wenn derselbe hier etwas hinten zurückgeblieben wäre, wenn man die Richtung berücksichtigt, nach welcher sich der Comet bewegte. Den 17ten October erschien der Schweif gekrümmter, als er bisher gewesen war. Den 2ten December hatte die Krümmung eine der vorigen gerade entgegengesetzte Direction, denn sie wurde nunmehr auf der hintern (nördlichen) Seite convex.

Den

Den 18ten September bemerkte der Verfasser, daß die zwey oben erwähnten, den Cometen-Kopf auf beyden Seiten umgebenden, Lichtstreifen einen beträchtlichen Theil ihres Lichtes nach der Richtung des Schweifes ausströmten; gegen das Ende desselben erschien aber das Licht überall gleichförmig vertheilt. Den 12ten October zeichneten sich die beyden Streifen durch ihre respective Dichtigkeit sehr aus, bis auf eine Distanz vom Cometen-Köpfe von ungefähr 6 Graden; weiterhin war das Licht gleichförmig. Den 15ten war der vordere Zweig des Schweifes $7^{\circ} 1'$ lang, der hintere nur ungefähr $4^{\circ} 41'$, durch welche ungleiche Länge der Schweif von einer irregulären Krümmung erschien. Der Verfasser führt mit Detail die Veränderungen an, die bis zum roten Novembér bey diesen Erscheinungen vorgien- gen; um diese Zeit war der vordere Zweig $5^{\circ} 16'$ lang, der hintere dagegen nur $3^{\circ} 31'$. Jener war dabey weit dichter und breiter als dieser.

Im Laufe seiner Beobachtungen richtet zugleich der Verfasser sein vorzügliches Augenmerk auf das eigentliche neblichte Wesen des Schweifes. Den 18ten September glich dieses im 10füßigen Teleskope völlig dem milchfarbigen Nebel im Schwerte des Orion, versteht sich an den Orten des Schweifes, wo das Licht gerade dieselbe Stärke hatte. Den 9ten November, an welchem Tage sich der Schweif in der Nähe der Milchstraße befand, schien an den sternleeren Stellen der letztern das Licht derselben mit dem des erstern beynahe identisch zu seyn.

So waren die Erscheinungen des Cometen meistens zur Zeit seines lebhaftesten Glanzes; es fol-

folgen jetzt diejenigen Beobachtungen, welche der Verfasser noch über das allmähliche Verschwinden desselben anstellte. "Nachdem", heisst es, "der Schweif sich immer mehr und mehr verkürzt hatte, das Licht sich verminderte, und die Seitenzweige sich zerstreuten, nachdem die durchsichtige Athmosphäre immer schwächer und undeutlicher wurde, welches darin seinen Grund hatte, dass die sie umgebende Lichthülle sich dem Cometen-Kopfe immer mehr näherte und zugleich mehr ausbreitete; so konnte ich die jetzt noch statt findenden Erscheinungen des planetarischen Körpers, des Kopfes, der Athmosphäre, der Lichthülle und des Schweifes beynabe mit dem Ansehn eines gewöhnlichen Nebelfleckes vergleichen, nicht in Beziehung auf die scheinbaren Dimensionen der einzelnen Theile, sondern nach den wirklichen physischen Veränderungen, welche ich in dem ganzen Wesen beobachtete." —

Am 4ten Nov. sah man im röhrlsigen Teleskope mit 289maliger Vergrößerung die planetarische Scheibe noch ganz deutlich, und zugleich in einer mehr, als gewöhnlich, excentrischen Lage. Den 9ten entdeckte man sie nur kaum mit 169maliger Vergrößerung, besser jedoch mit 240maliger; aber sie wurde durch das neblichte Wesen der Lichthülle so geschwächt, dass eine gute Beobachtung derselben durchaus nicht möglich war. Den 10ten hatte man mit dem grossen röhrlsigen Teleskope von der planetarischen Scheibe und ihrer excentrischen Lage nur noch eine Idee; den 13ten aber suchte man sie mit allen Instrumenten und Vergrößerungen vergebens.

Was das allmähliche Verschwinden der durchsichtigen Athmosphäre und der sie umgebenden Lichthülle betrifft, so finden sich hier beym Verfasser viele detaillirte Beobachtungen in dem Zeitraume vom 4ten November bis zum 14ten Decèmbre, wovon wir die merkwürdigsten anführen wollen. Den 4ten November unterschied man mit einem Cometensucher nicht mehr den Theil der Athmosphäre, welcher den Kopf von der ihn umgebenden Lichthülle absonderte. Im 10füßigen Teleskope erschien bey Anwendung eines grossen Doppel-Oculars die Lichthülle sehr nahe beym Kopfe, so daß ihre respective Scheitel-Entfernung weniger als $7' 10''$ betrug. Den 10ten konnte man die Lichthülle vom Kopfe nur noch durch einen sehr kleinen dunkeln Zwischenraum unterscheiden, in welchem man kaum die Athmosphäre bemerkte; die verticale Distanz der Lichthülle war $4' 46''$. Den 19ten wurde im 10füßigen Teleskope die Athmosphäre durchaus von der Lichthülle bedeckt, und der Comet erhielt nun immer mehr und mehr das Ansehn eines Nebelfleckes. Den 9ten Decèmbre schien sich die Lichthülle, die bis dahin nur noch aus einem schwach erleuchteten Rande bestanden hatte, gegen die Erwartung des Beobachters wieder zu vergrößern; aber auch dessenungeachtet blieb sie sehr schwach. Ihre Distanz vom Centrum des Kopfes war ungefähr $4\frac{1}{2}$ Minuten. Den 14ten war sie gänzlich verschwunden. — Bey dieser allmählichen Auflösung der Lichthülle hatten sich mehre sonderbare Erscheinungen dargeboten. Den 4ten November zeigte sie sich im 10füßigen Teleskope auf der nach der Sonne gekehrten Seite doppelt,

pelt, und theilte sich auf jeder Seite des Cometen-Kopfes in drey Arme, wovon die äussern sehr kurz und schwach beleuchtet erschienen. Jedoch waren diese Phaenomene manchen kleinen Veränderungen unterworfen, und den 14ten December war nur noch auf der vordern Seite ein einziger schwach beleuchteter Arm vorhanden. Den 15ten October, den 5ten und 10ten November erschien der eben erwähnte Zweig am längsten; den 3ten und 9ten November waren sie auf beyden Seiten sich gleich. Den 13ten hatte der hintere Arm $4^{\circ} 6'$ Länge, der vordere dagegen nur $3^{\circ} 31'$; den 14ten wurden sie sich wieder gleich, und waren ungefähr $3^{\circ} 31'$ lang; den 15ten war die Erscheinung dieselbe, wie am 13ten; den 19ten zeigten sie sich wieder beyde in einer gleichen Länge von etwa $4^{\circ} 23'$. Den 2ten December erschienen sie ebenfalls beynahe gleich, und ungefähr $3^{\circ} 12'$ lang. Sie hatten nunmehr ihren Glanz verloren, und zeigten sich in derselben Farbe, wie die verworfene Lichtmasse überhaupt. Den 9ten und 14ten December waren sie endlich so geschwächt, dass man über ihre Länge durchaus keine Beobachtungen anstellen konnte.

Auch über die Veränderung des Winkels, unter welchem sich die Lichthülle auf beyden Seiten des Cometen-Kopfes forterstreckte, findet man mehrere Angaben. Den 4ten November hatten die beyden Zweige derselben eine grössere Divergenz, als gewöhnlich. Der Verfasser schreibt dieses einer Zusammenziehung der Lichthülle auf der nach der Sonne gekehrten Seite zu, so dass die Zweige derselben auf beyden Seiten des Kopfes dieselbe Entfernung unter

unter sich behalten. Den 13ten erschien im 10füßigen Teleskope der Krümmungs-Winkel an seinem Scheitel sehr vergrößert; aber im Cometensucher wurde man keinen merklichen Wachsthum desselben gewahr. Den 14ten November, wo man freylich die Lichthülle nicht sehr gut mehr vom Kopfe unterscheiden konnte, zeigte sich jener Winkel ungefähr 60 bis 65 Grade groß; allein im Cometensucher erschienen die beyden Zweige, welche man nur noch mit Mühe erkennen konnte, mehr einander genähert, als es vorhin der Fall gewesen war.

In Beziehung auf die allmähliche Verkürzung des Schweifes bemerkt der Verfasser, daß derselbe am 8ten November, wo die Luft außerordentlich heiter war, schon sehr verkleinert erschien. Seine Länge betrug ungefähr 12° ; den 9ten war sie nur 10° . Den 15ten zeigte sich der Schweif im Cometensucher sehr kurz; den 16ten hatte er bey unbewaffnetem Auge eine GröÙe von etwa $7\frac{1}{2}^\circ$, und den 19ten von $6^\circ 10'$. Den 2ten December erschien er nur von 5° , und mit einem sehr schwachen Lichte; den 9ten und 14ten war er von derselben GröÙe, aber am letztern Tage sein Licht gegen das Ende zu äußerst geschwächt.

Nach und nach nahm auch die Dunkelheit zwischen den beyden Lichtstreifen, welche den Schweif einschlossen, immer mehr zu. Den 4ten November war die Dunkelheit in der Nähe des Kopfes auf der nach der Sonne gekehrten Seite sehr merklich, und weniger mit dem sich immer mehr ausbreitenden Lichte gemischt; den 5ten war diese Dunkelheit auffallender auf der, der vorigen entgegengesetzten,

Seite.

Seite. Den 10ten war sie überhaupt zwischen den beyden Zweigen des Schweifes sehr beträchtlich. Den 14ten zeigte sich innerhalb des Schweifes, sehr nahe bey'm Kopfe, ein grosser Raum, der fast gänzlich von der Lichtmaterie frey war, so dafs man die kleinsten Sterne der Milchstrafse eben so gut darin sehen konnte, als wenn gar kein Gegenstand im Wege gewesen wäre. Den 19ten hatte sich im rofsigen Teleskope die Dunkelheit zwischen den beyden Zweigen sehr vermehrt. Den 9ten December war der Raum in der Nähe des Kopfes auf der von der Sonne abgewandten Seite völlig finster, oder vielmehr völlig durchsichtig. Den 14ten sah man in diesem dunkeln Raume sehr viele kleine Sterne der Milchstrafse.

Dieses sind im Ganzen die hauptsächlichsten Beobachtungen *Herschel's* über den Cometen, und wir werden nun im nächsten December - Hefte die Resultate mittheilen, welche dieser Astronom aus ihnen gezogen hat.

LIV.

Gegenschein des *Saturn's*

im Jahre 1813.

Beobachtet auf der Sternwarte *de la Capellette*
bey Marſeille.

Die Beobachtungen dieſes Planeten waren erſtlich folgende :

1813	Mittl. Zeit à la Capel- lette	Beob. ſchein- bare gerade Aufſteigung des δ	Beob. durch Parallaxe — 0,0 verb. ſüdliche Ab- weich. des δ	Beob. durch Aberr. — 12,06 Nutat. + 13,0 verbess. geoc. Länge des δ	Beob. ſüdl. geoc. Breite des δ
Jul. 5	12U 15' 59,7	287° 34' 25,8	22° 10' 44,7	286° 14' 9,7	0° 17' 48,8
6	12 11 44,8	287 29 41,0	22 11 27,2	286 9 42,8	0 17 38,1
7	12 7 30,0	287 24 56,0	22 11 59,3	286 5 15,7	0 17 37,8
8	12 3 15,4	287 20 14,3	22 12 35,0	286 0 53,7	0 17 32,9
10	11 54 45,8	287 10 46,7	22 13 42,0	285 52 4,1	0 17 28,9
11	11 50 31,1	287 6 4,2	22 14 7,7	285 47 41,4	0 17 34,1
13	11 42 1,7	286 56 39,2	22 15 39,1	285 38 51,3	0 17 4,3

Für obige Zeit-Momente wurden nun weiter aus unſern Sonnen-Tafeln folgende Elemente berechnet :

1813	Helioe. Länge der δ vom mittlern Aequinoct.	Logar. der Entfernung der \odot von der δ	Scheinbare Schiefe der Eclip- tik
Julius 5	283° 27' 20,5	0.0072171	23° 27' 43,0
6	284 24 22,0	0.0072046	
7	285 21 23,7	0.0071902	
8	286 18 25,8	0.0071740	
10	288 12 27,3	0.0071372	
11	289 9 28,8	0.0071168	
13	291 3 32,5	0.0070712	

Aus *Bouvard's* Saturn's-Tafeln wurden die heliocentriſchen Oerter dieſes Planeten berechnet, und
mit

LIV. Gegensehein des Saturn's im Jahre 1813. 471

mit Zuziehung obiger Elemente der Erdbahn folgen-
de geocentrische hergeleitet, welche, mit den beob-
achteten verglichen, die beystehenden geocentrischen
Fehler der Tafeln geben:

1813	Berechnete geocentrische Länge des η	Berechn. nörd- liche geoc. Breite des η	Geoc. Fehler der Tafeln	
			in Länge	in Breite
Julius 5	286° 14' 13.7	0° 17' 44.1	- 4.0	+ 4.7
6	286 9 48.1	0 17 38.9	- 5.3	- 0.7
7	286 5 23.1	0 17 33.6	- 7.4	+ 4.2
8	286 0 57.9	0 17 28.8	- 4.2	+ 4.1
10	285 52 8.3	0 17 18.1	- 4.2	+ 10.8
11	285 47 44.0	0 17 12.8	- 2.6	+ 21.3
13	285 38 57.0	0 17 2.0	- 5.7	+ 2.3
Mittlerer Fehler mit Ausschluss der zwei- felhaften Breite			- 4.8	+ 4.2

Nun wurde ferner, wie wir bey dem Gegen-
schein des Mars gethan haben, der heliocentrische
Fehler der Tafeln gesucht, und aus den also verbef-
serten heliocentrischen, dem Gegensehein zunächst
liegenden, Oertern Zeit und Ort desselben hergelei-
tet:

1813	Log. der cur- tirtanz der Son- ne von η	Beobach- tete heliocen- trische Länge des η	Beobach- tete nördliche helioc. Breite des η	Berechn. helioc. Länge des η	Berechn. nördl. helioc. Breite des η	Heliocentr. Fehler der Tafeln	
						in der Läng.	in der Breite
Jul. 5	1.0018509	285 57 16.7	0 16 0.7	285 57 20.3	0 15 50.5	- 3.0	+ 4.2
6	1.0018480	285 59 3.0	0 15 51.1	285 59 7.8	0 15 51.8	- 4.8	- 0.7
7	1.0018451	286 0 49.3	0 15 50.8	286 0 55.9	0 15 47.0	- 0.6	+ 3.8
8	1.0018421	286 2 40.2	0 15 40.3	286 2 44.1	0 15 42.5	- 3.9	+ 3.7
10	1.0018361	286 6 16.5	0 15 42.5	286 6 20.4	0 15 33.1	- 3.9	+ 9.7
11	1.0018331	286 8 6.3	0 15 47.7	286 8 8.5	0 15 28.4	- 2.2	+ 19.3
13	1.0018271	286 11 40.2	0 15 21.0	286 11 45.4	0 15 19.0	- 5.2	+ 2.0
Mittlerer heliocentr. Fehler der Tafeln mit Ausschluss der zweifelhaften Breite						- 4.3	+ 3.8

Verbessert man hiernach die geocentrische Breite,
die heliocentrische Länge und Breite der beyden Be-
obachtungen, welche die Zeit des Gegenseheins be-

greifen, so hat man für die Berechnung dieses Gegen-
scheins folgende Data:

1813	Mittl. Zeit à la Capel- lete	Länge der ☉ + Aberr. vom mittlern Aequinoct.	Wahre heliocentr. Länge des ♄	Wahre hel. Breite des ♄ nördlich	Wahre geoc. Breite des ♄ nördlich
Julius	7 12U 7' 30,"0 8 12 3 15, 4	105° 21' 23,"7 106 18 25, 8	286° 0' 51,"6 286 2 39, 8	0° 15' 50,"8 0 15 40, 3	0° 17' 37,"8 0 17 33, 0

Hieraus folgt endlich Zeit des Gegen-

scheins . . . 1813 d. 8. Jul. um 5U 13' 24,"0 M. Z. à la Capellette

Heliocentr. Länge des Saturns . . . 286° 2' 8,"9

Heliocentr. Breite — — . . . 0 15 47, 6 N.

Geocentr. Breite — — . . . 0 17 34, 3 N. *)

Bekannt-

*) Auf der hiesigen Sternwarte wurden zur Zeit dieses Ge-
genscheins folgende Beobachtungen erhalten:

1813	Mittl. Zeit auf Seeberg	AR. appar. h C.	Decl. app. h C.
Julius	6 12U 11' 48,"7 8 12 3 19, 0 10 11 29 21, 8	287° 29' 46,"5 287 20 16, 8 286 42 42, 0	— 22° 11' 16,"0 22 12 26, 2 22 17 18, 5

Hieraus ergibt sich:

1813	Beobach- tete helioc. Länge des ♄	Berechnete helioc. Länge des ♄	Corre- ction der Tafeln	Beobachtete heliocentr. Breite des ♄	Berechnete heliocentr. Breite des ♄	Corre- ction der Tafeln
Jul. 6	285° 50' 3,"6	285° 59' 10,"4	— 12,"8	+ 0° 15' 58,"1	+ 0° 15' 50,"8	+ 7,"3
8	286 2 37, 4	286 2 50, 5	13, 1	0 15 49, 7	0 15 42, 6	7, 1
10	287 17 3, 5	286 17 17, 8	14, 3	0 15 13, 8	0 15 5, 2	8, 6
Mittl. hel. Fehler in Länge . . . — 13,"4 . . . in Breite . . . + 7,"7						

Werden die hier gefundenen Verbesserungen angebracht,
so folgt:

♄ h ☉ 1813 Jul. 8. 5U 33' 9,"4 M. Z. auf Seeberg

Wahre Länge des Saturns . . . 286° 2' 8,"5

Wahre geocent. Breite . . . + 0 17 41, 4.

Wird in *Bouvard's* Tafeln die große Ungleichheit nicht
in Gemäßheit der darin befindlichen falschen Zeichen
corrigirt, so ist der mittlere Fehler der heliocentrischen
Länge 37" — 38".

v. L.

Bekanntlich bedarfen *Bouvard's*, vom Pariser *Bureau des Longitudes* herausgegebene, Jupiters- und Saturns-Tafeln einer gänzlichen Umarbeitung, da man weiß, daß die beyden großen, diesen Tafeln zum Grundeliegenden, Ungleichheiten (*Mécan. céleste* Vol. III. p. 129, 139) mit falschen und entgegengeletzten Zeichen angewendet worden, ein Irrthum, welchen *La Place* selbst, aber erst nach dem vollendeten Drucke dieser Tafeln, anerkannt hat. *Bouvard* suchte zwar diesen Fehler durch zwey, am Ende der Erklärung dieser Tafeln angehängte, Tafelchen zu heben, verfällt aber dabey in einen neuen Irrthum. Die Abweichungen dieser Planeten-Tafeln von den Beobachtungen sind zufällig jetzt gerade noch nicht stark, aber die Elemente, auf welchen sie beruhen, sind nichts destoweniger fehlerhaft, und bedürfen einer ganz neuen Untersuchung, und, um sicher zu gehen, auch einer neuen Berechnung aller Störungsgleichungen, welches kein kleines Geschäft ist, und das wir vielleicht von einem unserer rüstigsten und um neue Planeten-Tafeln verdientesten Astronomen zu erwarten haben. Indessen schadet dieses, wie man weiß, der Bestimmung unseres Gegenscheines keinesweges, da wir diese Tafeln im Ganzen durch sehr gut harmonirende Beobachtungen mit dem Himmel zur Uebereinstimmung gebracht haben. In unseren zu Florenz 1809 bey *Molini* herausgegebenen Monds-Tafeln haben wir S. 79 u. 80 ein Verzeichniß der in diesen *Bouvard'schen* Tafeln befindlichen Druckfehler gegeben, worin aber folgender bedeutender neu aufgefundenener nicht angegeben ist, den wir um so eiliger zur Anzeige bringen, weil er gera-

LV.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn
Professor *Bessel.*

Königsberg, den 22. Nov. 1813.

... **M**ir geht es fortwährend wohl, und seit dem
12ten d. M. bewohne ich meine neue prächtige Stern-
warte, deren Tagebuch demzufolge seit zehn Tagen
eröffnet ist. — Da Sie ohne Zweifel lebhaften An-
theil nehmen an den neuen Ausichten, die durch
die hiesige Sternwarte der Astronomie eröffnet sind,
und an dem Glücke, welches ich habe, indem ich
einem so herrlichen, ganz nach meinen Wünschen
eingerrichteten Institute vorstehe: so beschreibe ich
Ihnen den neuen Uranien-Tempel etwas genauer,
obgleich nicht im Einzelnen. — Die höchste Stelle
des Königsberger Walles, an der Nordwestseite der
Stadt, eine etwa 60 Fuß über dem *Pregel* erhabene
Anhöhe, wurde zum Bau der Sternwarte aus-
gewählt, indem die schöne Aussicht, die man von die-
sem Punkte hat, ihn vorzüglich dem Zwecke aneig-
nete; in der That ist der Horizont fast allenthalben
ganz frey, und die wenigen über ihn merklich her-
vorragenden Thürme und Gebäude sind zu entfernt,
um als wesentliche Hindernisse der Aussicht betrach-
tet werden zu können. Wenige Sternwarten an
ebener Erde besitzen einen so freyen Horizont, und
dabey eine so schöne Aussicht in die sie umgebende
Gegend,

Gegend, als die hiesige. — Das Gebäude ist vom dem verdienstvollen und als Erbauer des hiesigen Schauspielhauses u. s. w. rühmlichst bekannten Regierungsrathe Müller I. aufgeführt, und hat folgende Einrichtung, die ich Ihnen etwas speciell angebe, damit Sie sich in Gedanken leichter zu mir versetzen können. Der Haupteingang ist gegen Osten; rechts am Vorhause ist mein Entréezimmer, gegen Osten und Süden gelegen; an dieses stößt mein gleichfalls südliches Arbeitszimmer, welches ein Cabinet zum Schlafen und zur Aufbewahrung von Büchern neben sich hat. Auf der Nordseite des Hauses ist ein Zimmer für den Aufwärter, und der Hörsaal. In der obern Etage sind Zimmer für die Familie des Astronomen, und in dem Souterrain befindet sich alles, was zum öconomischen Bedarf gehört. Sowohl mein Arbeitszimmer, als das Auditorium, haben unmittelbare Eingänge in zwey zur Sternwarte gehörige Säle, deren einer auf der Südseite das Wohngebäude so weit überflügelt, daß man aus ihm die südliche Hälfte des Himmels, und noch ein ansehnliches Stück mehr, ganz übersehen kann; der Saal auf der Nordseite ist symmetrisch mit diesem; beyde zusammen genommen haben also freye Aussicht nach allen Seiten, und deshalb sind sie für die beweglichen Instrumente bestimmt. Ihre Höhe und GröÙe, die Höhe der Fenster u. s. w. sind übrigens so eingerichtet, daß man selbst gröÙere Fernröhre ohne Unbequemlichkeit gebrauchen kann; durch quadratische Dachklappen ist für die Gegend des Zeniths gesorgt. Aus beyden Sälen geht man in einen dritten an der Westseite des Ganzen, der für die Meridian-Instrumente bestimmt,

bestimmt, und deshalb zweymahl durchschnitten ist. Das ganze Gebäude hat demnach die Form eines Kreuzes. — Der Saal für die festen Instrumente enthält zwischen zwey prächtigen Granitpfeilern das vierfüßige Mittagsfernrohr von *Dollond*, ein herrliches Instrument, mit allem versehen, was die höchste Subtilität in die Beobachtungen bringen kann; — auf einem Granit-Cylinder den 25zolligen *Carry'schen* Kreis, ein Meisterwerk, dessen Schönheit sowohl in seiner soliden Construction, als in der Theilung zu suchen ist, und welches meine Erwartung bey näherer Untersuchung weit übertroffen hat. Dieses Instrument ist mit allem, was der Beobachter wünschen kann, versehen; mit den äußeren Mikrometern beobachtet man mit Sicherheit einzelne Secunden. Dieser Kreis scheint mir ganz *Ramsden's* Einrichtung zu haben; vorzüglich vollkommen ist an ihm der Pendel- und Niveau-Apparat. — An einem vierten Granitpfeiler ist die *Repsold'sche* Uhr aufgestellt, für deren vortreflichen Gang der Name des geniereichen Künstlers bürgt; daß sie in den wenigen Tagen seit ihrer Aufstellung ihren Gang nicht merklich änderte, versteht sich wohl von selbst. —

Sie sehen nun, daß es hinfort nur die Schuld des Wetters seyn wird, wenn nicht aus der neuen Sternwarte eine herrliche Reihe von Beobachtungen hervorgeht. Am Anfange war dieses freylich nicht sehr günstig; denn ich habe in den verflossenen 10 Tagen nur zweymahl den Mond und zweymahl die Juno im Meridian beobachten können; doch hoffe ich noch die Opposition dieses Planeten vollständig zu erhalten. — Es wird mir große Freude machen, wenn

wenn ich Ihnen meine ersten Beobachtungen auf der neuen Sternwarte mittheilen werde; jetzt zögere ich noch damit, weil sie zu wenig zahlreich sind.

Sie erzeigen mir eine Gefälligkeit, wenn Sie die Vollendung meiner Sternwarte den Lesern Ihrer *M. C.* mittheilen. Für die Folge wird und muß sich das neue Institut selbst in Andenken erhalten; allein ich glaube, es wird für die Freunde der Sternkunde nicht nur, sondern auch für Alle, die an den Wissenschaften Theil nehmen, eine erfreuliche Erscheinung seyn, aus Zeitverhältnissen, wie die gegenwärtigen, eine Anlage hervorgehen zu sehen, bey welcher weder Aufwand noch Mühe gespart wurde, um sie ganz dem Zwecke, den man bey ihrem Entwurf im Auge hatte, entsprechend zu machen. — Der Geist, der Preussen regiert, konnte sich nicht deutlicher aussprechen, als durch die Erbauung einer der prächtigsten Sternwarten der Welt in den Jahren 1811 bis 1813; die Freygebigkeit des Königs, und der Eifer der Behörden hier und in Berlin, mußten *so* zusammen wirken, wie es wirklich geschah, um *diesen* Erfolg hervorzubringen. — Mit meinen ersten Beobachtungs-Registern werde ich eine Zeichnung und genaue Beschreibung der Sternwarte bekannt machen; Sie werden daraus das Zweckmäßige ihrer Einrichtung und das Geschmackvolle ihres Aeufßern, welches ich ganz dem Regierungsrathe Müller verdanke, kennen lernen. —

Nun zu etwas anderem! — Ich sage Ihnen den verbindlichsten Dank für die nochmalige Mittheilung
der

der v. Zach'schen Beobachtungen der Sterne, mit welchen der Comet verglichen wurde; die frühere erhielt ich nicht. Ich habe die Sterne, die ich aus der *Hist. cél.* entlehnte, mit den v. Zach'schen verglichen, und überall eine schöne Uebereinstimmung in den Rectascensionen, aber starke Differenzen in den Declinationen gefunden; ich werde alle meine Rechnungen noch einmal revidiren, und Ihnen die Differenzen mittheilen. Ich darf nicht hoffen, daß Sie jetzt mit Herrn v. Zach in Verbindung stehen, sonst würde ich bitten, ihm meinen verbindlichsten Dank für die Güte zu sagen, mit welcher er die Bestimmung der mir so interessanten Sterne übernahm. — Doch mehr noch, als die Unterschiede der Positionen der Sterne, hat ein anderer Umstand die Verschiedenheit zwischen Herrn v. Zach's eignen Reductionen der Cometen-Beobachtungen und den meinigen erzeugt. Herr v. Zach nahm nämlich, wie es mir scheint, das Netz als richtig gestellt an, ich aber bestimmte seine Lage aus den Beobachtungen selbst, auf eine Art, über die ich mich in der Folge umständlicher erklären werde. Ich weiß sehr wohl, daß eine Beobachtung mit dem Netze eine Ortsbestimmung mit größerem Vortheile giebt, wenn man die Lage des Netzes unabhängig von dieser Beobachtung berichtigt hat; allein dann muß man ein Mittel besitzen, diese Berichtigung nicht nur mit Schärfe zu machen, sondern auch durch alle Beobachtungen zu conserviren. Bey einigen Beobachtungen scheinen mir sehr deutliche Spuren einer kleinen Abweichung des Netzes vorhanden zu seyn; sollte aber Herr v. Zach Mittel gehabt haben, sich von der Richtigkeit

tigkeit der Lage seines Netzes zu überzeugen, so versteht es sich, daß ich ihm folge, und dann werden sich unsere Reductionen mehr nähern.

Durch Herrn Ritter von Fufs habe ich nun auch die Original-Handschrift des Herrn von Wisniewsky über seine Cometen-Beobachtungen erhalten, und von dem Beobachter noch mehrere, diese wichtigen Data vervollständigenden, Notizen. Die Beobachtungen scheinen mir äufserst genau zu seyn; sie stimmen fast vollkommen mit meinen Elementen, und diese werden demnach nur unbedeutende Correctionen erhalten. Bewunderungswürdig ist es, daß Herr von Wisniewsky diesen Cometen mit einem $3\frac{1}{2}$ füßigen Fernrohre von Dollond sehen und beobachten konnte; er erschien etwa so lichtstark, wie ein Stern 11ter Gröfse, und etwa eine Minute im Durchmesser. Scharf reducirt habe ich die Beobachtungen noch nicht, indem ich die Positionen der verglichenen Sterne noch nicht mit gehöriger Schärfe kenne. Ich habe bisher vergebens versucht, sie auf meiner Sternwarte zu bestimmen, denn der Himmel war an zwey Abenden, wo mir diese Beobachtungen hätten gelingen können, an den Stellen, wo die Sterne culminiren, so dunstig, daß ich nur zwey von ihnen im Passagen-Instrumente erblicken konnte. Da die Sterne der Dämmerung stark zurücken, und ich fürchte, hier vom Wetter sehr genirt zu werden, so theile ich Ihnen die ungefähren Positionen dieser Sterne mit, mit der Bitte, Ihren vielleicht schönern Himmel noch einmal für mich zu benutzen:

I.	9	Gr.	...	21 ^U	29'	15"	—	26'	4'	..	<i>Hist. cél.</i>
II.	8	—	...	—	30	31	—	25	16		
III.	6	—	...	—	31	8	—	25	57	}	.. <i>Hist. cél.</i>
IV.	8	—	...	—	32	43	—	25	0		
V.	8	—	...	—	38	0	—	24	35		

Außerst angenehm würde es mir seyn, wenn Sie diese Sterne bestimmen könnten; gelingt es mir auch, so haben wir eine Controle; gelingt es mir nicht, so haben Sie allein das Verdienst, die Reduction der unschätzbaren v. *Wisniewsky'schen* Beobachtungen möglich gemacht zu haben. *) —

Es ist mir immer etwas sehr Unangenehmes gewesen, für die Fundamentalsterne Aberrations- und Nutations-Tafeln zu gebrauchen, die nicht so scharf oder so bequem sind, als sie seyn könnten. Für *Bradley's* Zeiten habe ich daher vor fünf Jahren Tafeln construirt, die beydes im höchsten Grade vereinigen, und die es vielleicht nützlich wäre, auch für die gegenwärtige Zeit zu berechnen. Da ich nun das Bedürfnis dieser Tafeln doppelt fühle, so würde ich es mir befriedigen, wenn meine anderweitigen Beschäftigungen mir jetzt einige Tage dazu übrig ließen. Vielleicht kennen Sie einen Liebhaber der Astronomie, der Lust hat, den Astronomen solche Tafeln

Tafeln

*) Hätte auch nicht das ungewöhnlich ungünstige Wetter zu unserm grossen Mißvergnügen um diese Zeit alle astronomischen Beobachtungen vereitelt, so würde uns dennoch die Bestimmung dieser kleinen Sterne unmöglich geworden seyn, da sie nach Empfang des Briefes schon in der Dämmerung culminirten.

Tafeln zu schenken; deshalb theile ich Ihnen hier die Idee davon mit:

Die Tafeln sollen die Aberration und Präcession vom Anfang des Jahrs angerechnet, mit Inbegriff der Solar-Nutation, unmittelbar mit dem Argumente des Beobachtungstages, und zwar für das Moment der Culmination, angeben, oder die Quantität:

$$\begin{aligned} & \text{Var. annua} \times \frac{\text{Long. med. } \odot' - 9^{\text{Z}} 10^{\circ}}{360^{\circ}} \\ & - \frac{20''.255}{\cos \delta} [\cos \omega \cos \alpha \cos \odot + \sin \alpha \sin \odot] \\ & - [0''.3982 \sin \alpha \sin 2 \odot + 0''.434 \cos \alpha \cos 2 \odot] \tan \delta \\ & - 0''.9173 \sin 2 \odot. \end{aligned}$$

Ich fingirte hierbey ein Jahr, für welches die Epoche der Sonnentafeln $\equiv 9^{\text{Z}} 10^{\circ}$ ist, und berechnete die Sonnenlänge für das Culminations-Moment eines Sterns nach der leicht zu findenden Formel (für dieses fingirte Jahr)

$$\equiv 9^{\text{Z}} 9^{\circ} 14' 7''.74 + (\tau + \alpha) 58' 58''.6417;$$

τ bedeutet hier den Tag des Jahrs, und α die in Theilen des Tages ausgedrückte Rectascension; der Multiplicator von $\tau + \alpha$ ist die Bewegung der Sonne in einem Sternentage. Aus dieser Formel suchte ich für jeden Stern für Jan. 0, 5, 10, 15 oder $\tau = 0, 5, 10, 15$. . . die mittlere Sonnenlänge, und aus dieser für die Epoche 1755 die wahre elliptische; dann gab mir die oben angeführte Formel die an den mittlern Ort des Sterns am 1. Jan. (eigentlich zur Zeit der mittl. Sonnenlänge $\equiv 9^{\text{Z}} 10^{\circ}$) anzubringende Correction, für alle Tage des Jahrs, von

5 zu 5 genommen, bis zum 36. Decbr. (5. Jan. des folgenden Jahrs). Aus dieser Tafel läßt sich nun mit großer Leichtigkeit das Gesuchte nehmen. Man bringt nämlich an den beobachteten Tag τ die Correction

$$- 0,101642 + \frac{1}{4} [4M - t] + 0,00773603 t$$

— östl. Meridian-Differenz von Paris in Theilen des Tages ausgedrückt

an, in welcher Formel das Beobachtungsjahr $= 1800 + t$, und die Zahl der zwischen 1800 und der Beobachtungszeit befindlichen Schalttage $= M$; überdies nimmt man statt des Tages τ den Tag $\tau + 1$, wenn von einem Sterne die Rede ist, dessen Rectascension kleiner ist, als die der Sonne, weil dieser alsdann vor dem Anfange des astronomischen Tages culminirt.

Die Rechnungen, die ich vorschlage, sind demnach folgende:

- 1) Eine Tafel für die sich immer ein Jahr über gleich bleibende Quantität

$$- 0,10164 + \frac{1}{4} [4M - t] + 0,00773603 t.$$

- 2) Eine Tafel für — östl. Merid. Diff. von Paris in Theilen des Tages, für die berühmtesten Sternwarten.

- 3) Eine Tafel für alle Fundamentalsterne, enthaltend das Resultat der obigen Formel, für Zwischenzeiten von 5 Tagen.

Um diese Tafel für die jetzige Zeit genau zu machen, würde ich vorschlagen, die wahren Sonnenlängen mit der für 1820 statt findenden Länge des Perihels und Excentricität, und die Rectascensionen und Declinationen gleichfalls für 1820 zu nehmen. —

Die

Die Nutations-Tafeln würde ich für die Argument 1810, 1810,5, 1811 etc. zu construiren vorschlagen oder auch für Intervalle von 100 Tagen; die Zahlen, die sie enthalten, gelten dann allgemein für $1810 \pm n$. 18,6124; $1810,5 \pm n$. 18,6124 etc., wo n ganze Zahlen bedeutet.

Um die Construction dieser Tafeln zu erleichtern, theile ich Ihnen hier die Zahlen für

$$9^{\text{Z}} 9^{\circ} 14' 7,74 + \alpha. 58' 58,6417$$

$$\text{und } \tau. 58' 58,6417$$

wie auch die jährliche Veränderung der \mathcal{R} . in Zeit aus einer Vergleichung von *Bradley's*, *Piazzi's* und *Maskelyne's* Beobachtungen mit. Die ersten Zahlen, so wie ich sie mit den 1820 stattfindenden α berechnete, sind folgende:

Var. ann. in \mathcal{R} .

γ Pegasi . . .	$9^{\text{Z}} 9^{\circ} 14' 16,6 + 3,074$
α Arietis	18 54, 4 3, 350
α Ceti	21 11, 7 3, 118
α Tauri	24 59, 4 3, 424
α Aurigae	26 32, 0 4, 407
β Orionis	26 38, 6 2, 875
β Tauri	27 0, 3 3, 784
α Orionis	28 15, 6 3, 243
α Can. maj.	30 23, 1 2, 642
α Gemin.	32 15, 5 3, 845
α Can. min.	32 33, 2 3, 145
β Gemin.	32 44, 0 3, 684
α Hydrae	37 0, 8 2, 934
α Leonis	38 39, 1 3, 203
β - - -	42 47, 5 3, 066

β Vir-

Var. ann. in R.

β Virgin.	. 9 ^h 9° 42'	51, "1	+ 3, "121
α - -	46	43, 1	3, 145
α Bootis	48	50, 3	2, 729
1 α Librae	50	12, 0	3, 297
2 α - -	50	12, 5	3, 299
α Coronae	52	5, 8	2, 531
α Serpentis	52	26, 3	2, 947
α Scorpii	54	12, 0	3, 658
α Herculis	56	10, 1	2, 725
α Ophiuchi	56	59, 6	2, 772
α Lyrae	59	37, 5	2, 026
γ Aquilae . . 10°	2	21, 8	2, 853
α - -	2	32, 3	2, 926
β - -	2	43, 3	2, 947
1 α Capric.	3	35, 4	3, 328
2 α - -	3	36, 4	3, 334
α Cygni	4	43, 3	2, 036
α Aquarii	8	2, 9	3, 081
α Pisc. austr.	9	19, 5	3, 345
α Pegasi	10	28, 6	2, 977
α Androm.	13	4, 2	3, 075

Hierzu sind zu addiren:

Jan.	0 . . 0 ^h 0° 0' 0, "0
-	20 . . 0 19 39 32, 8
Febr.	9 . . 1 9 19 5, 6
März	1 . . 1 28 58 38, 5
-	21 . . 2 18 38 11, 4
Apr.	10 . . 3 8 17 44, 2
-	30 . . 3 27 57 17, 0
May	20 . . 4 17 36 49, 8

Mon. Corr. XXVIII. Bd. 1813.

K k

Jun.

Jun.	9 . .	5 ^Z	7°	16'	22,"	7
-	29 . .	5	26	55	55,	5
Jul.	19 . .	6	16	35	28,	3
Aug.	8 . .	7	6	15	1,	1
-	28 . .	7	25	54	34,	0
Sept.	17 . .	8	15	34	6,	8
Octbr.	7 . .	9	5	13	39,	7
-	27 . .	9	24	53	12,	5
Nov.	16 . .	10	14	32	45,	3
Dec.	6 . .	11	4	12	18,	2
-	26 . .	11	23	51	51,	0
-	46 . .	0	13	31	23,	8

Die Declinationen von *Pond* habe ich für 1813 in dem neuesten Bande der *Philos. Transact.* erhalten; doch werden Sie sie schon kennen, da ich im May-Hefte der *M. C.* (dem letzten, welches ich erhielt) schon eine davon benutzt finde. Diese Declinationen sind übrigens gewiß vortrefflich, und stimmen nach einer, freylich auf Umwegen erhaltenen, aber nichts desto weniger Zutrauen verdienenden, Vergleichung, über die ich mich in meiner gekrönten Abhandlung über die Präcessionen näher erklärt habe, im Ganzen aufs Genaueste mit *Bradley's* Declinationen überein, *Piazzî's* neuester Catalog, der schon im Ganzen zwischen -35° und $+35^{\circ}$ Decl. $3''$ nördlicher ist als der alte, ist nach *Pond* noch $1''$ oder mehr zu südlich; dasselbe geben meine Präcessions-Untersuchungen, wenn ich dabey meine *Bradley's*chen Declinationen als richtig zum Grunde lege, Sie können sich leicht vorstellen, wie angenehm mir

es ist, meine Rechnungen noch lange nach ihrer Be-
endigung so unverhofft bestätigt zu sehen. —

Die Bedeckung ψ *Aquarii* am 7. October habe
ich beobachtet:

Eintritt . . . 6^U 38' 34,"4 W. Z.

Austritt . . . 7 37 52,8 — —

Der Austritt ist vielleicht etwas zu spät angegeben.

LVI.

Mittlere barometrische und thermometrische
Beobachtungen vom 1. Jan. 1811 bis 1. Jan.
1812, und hieraus berechnete Höhen über der
Meeresfläche; der Barometer-Ort in *Nizza*
zu 20 Mètres über der See
angenommen.

Von Herrn *Plana*, Astronom der k. Academie
der Wissenschaften in Turin.






Orte	Baro- meter	Therm. R.	Erhöhung in Toisen
		+	T
<i>Turin</i> . . .	27 ^Z 3, 93	12, 59	101, 103
<i>Montenis</i> . .	22 6, 60	4, 38	908, 413
<i>Bene</i> . . .	27 1, 00	10, 69	138, 185
<i>Casal</i> . . .	27 8, 60	12, 0	39, 106
<i>Busca</i> . . .	26 6, 96	8, 0	214, 911
<i>Saluzzo</i> . .	27 0, 28	10, 22	127, 342
<i>Nizza</i> . . .	27 10, 77	11, 40	10, 260

I N H A L T.

	Seite
XLVIII. Ueber die relative Lage der Planetenbahnen unter sich	389
XLIX. Erläuterung einer in den <i>Scriptoribus rei agrariae</i> pag. 176 u. 177, edit. <i>Goefii</i> , gegebenen Vorschrift, aus drey beobachteten ungleichen Schattenlängen die Mittagslinie zu finden. Von Herrn Prof. <i>Mollweide</i>	396
L. Ueber einige unberechnete Cometen, deren Bahnen man vielleicht noch auffinden und berechnen könnte. Vom Herausgeber	426
LI. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. <i>Pietro Catu-regli</i> , Astronom auf der kön. Sternwarte zu Bologna	433
LII. Himmels-Karten des Herrn Prof. <i>Harding</i> in Göttingen	452
LIII. Auszug aus einer Abhandlung des Hrn. Dr. <i>W. Herschel</i> , über den grossen Cometen von 1811; vorgelesen am 19. Dec. 1811.	455
LIV. Gegenschein des Saturns im Jahre 1813, beobachtet auf der Sternwarte <i>de la Capelle</i> bey Marseille.	470
LV. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. <i>Bessel</i>	475
LVI. Mittlere barometrische und thermometrische Beobachtungen vom 1. Jan. 1811 bis 1. Jan. 1812, und hieraus berechnete Höhen über der Meeresfläche; der Barometer-Ort in Nizza zu 20 Mètres über der See angenommen. Von Herrn <i>Plana</i> , Astronom der k. Acad. der Wissenschaften in Turin	487



(Hierzu eine Kupfertafel.)



Sechs Monatsstücke, jedes von sechs bis acht Bogen, machen einen Band aus, der mit einem Sachen- und Namen-Register geschlossen wird; zwey Bände einen Jahrgang. Der Preis eines Jahrgangs ist 6 Thaler Conv. Geld, und man kann zu jeder Zeit in das Abonnement eintreten, muß aber den ganzen laufenden Jahrgang nehmen. Einzelne Monatsstücke kosten 14 ggr.

Man macht die Befellungen bey den Post-Expeditionen und Buchhandlungen jedes Orts, welche die Exemplare von unterzeichneter Buchhandlung auf dem gewöhnlichen Wege beziehen.

Auch sind bey uns zu haben :

de Lindenau Tables barométr. pour faciliter le Calcul des Nivellements et des mesures des hauteurs par le Baromètre. 4^o. 2 Thlr. 12 gl.

Ejusdem Tabulae Veneris novae et correctae. Fol. min. 2 Thlr.

de Zach Tabulae Motuum Solis novae et corr. quibus acced.

Fixar. praecip. Catal. nov. ex observat. astr. ann. 1787-90 in spec. astr. Goth. habitis. 1792. Fol. min. 6 Thlr.

Ejusdem Fixarum praecip. Catal. nov. etc. (besonders gedruckt) 3 Thlr.

— Tabulae mot. sol. etc. Supplement 1804. 1 Thl. 12 gl.

— Astronom. Tafeln der mittl. geraden Aufsteig. der Sonne etc. zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc. (beym Observiren zu brauchen). Gebund. 6 gl.

— Nachrichten von der k. preuss. trigonom. und astronom. Aufnahme von Thüringen etc. und von der Gotha'schen Gradmessung I. Th. 2 Thlr.

— Tabulae spec. Aberr. et Nutat. una cum insignior. 494 stell. zod. Catalogo novo etc. Vol. I. II. 4^o broch. 20 Thlr.

— Tables abrégées et port. du soleil. 1 Thlr. 12 gl.

— Tables abr. et port. de la lune. 2 Thlr. (Beyde in kl. 4. broch.)

— Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour 1404 étoiles etc. 8^o broch. 3 Thlr. 12 gl.

Beckersche Buchhandlung in Gotha.



MONATLICHE
CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

vom

Freyherrn F. von ZACH,

Herzoglichen Sachsen - Gotha'schen
Oberhofmeister.

DECEMBER 1813.

G O T H A,

in der Beckerschen Buchhandlung.

Der Zweck dieser *Monatlichen Correspondenz* ist: Die Freunde der *Erd- und Himmels-Kunde* und der dahin einschlagenden Wissenschaften und Künste von den Fortschritten, welche von Zeit zu Zeit in diesen Fächern der Gelehrsamkeit geschehen, frühzeitig zu benachrichtigen. Sie beruhet auf einer von dem Herrn Herausgeber mit vielen gründlichen Gelehrten im Fache der Astronomie und Geographie (beydes im weitesten Sinne,) in den verschiedenen europäischen Staaten getroffenen Uebereinkunft, ihm die Resultate ihrer Forschungen, Beobachtungen und Lectüre mitzutheilen, um solche mittelst dieser Zeitschrift sowohl gegenseitig auszuwechseln, als auch durch öffentliche Bekanntmachung gemeinnützig zu machen.

Sie enthält also:

- I. Neue eigene Aufsätze der Herren Correspondenten über Gegenstände der Astronomie, der mathematischen, physischen und politischen Geographie, und der zu diesen Fächern gehörigen Hülfswissenschaften und Fertigkeiten, welchen, wo es zur Erläuterung nothwendig ist, Zeichnungen, Plane und Landkarten beygefügt werden.
- II. Einzelne eigene Beobachtungen, Erfahrungen, Entdeckungen und Erfindungen in diesen Wissenschaften.
- III. Urtheile und Nachrichten von neuen in diese Wissenschaften einschlagenden Schriften, wodurch die Wissenschaft erweitert oder berichtigt wird.
- IV. Beurtheilende Nachrichten von neuen Landkarten, Planen, astronomischen und mathematischen Werkzeugen u. s. w.
- V. Biographische Nachrichten von Männern, die in diesen Fächern viel geleistet haben, mit ihren Bildnissen.
- VI. Berichte von Reisenden, die auf die Länder- und Völkerkunde Bezug haben.

MONATLICHE
CORRESPONDENZ
ZUR BEFÖRDERUNG
DER
ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

DECEMBER 1813.

LVII.

Über die Berechnung der Längen und Breiten
aus gemessenen Abständen vom Meridian
und Perpendikel eines Orts.

Vom Herausgeber:

Herr Professor *Buzengeiger* hat im XXV. Bande unserer *M. C. S.* 478 eine Methode mitgetheilt, wie man die Länge und Breite eines Orts aus dem gegebenen Perpendikel und Abstände vom Meridian eines andern Orts auf einem elliptischen Erd-Sphäroide berechnen könne. Er nimmt zu diesem Ende die Berechnung der Breite auf einer Berührungs-Kugel vor, deren Halbmesser ein Krümmungs-Halbmesser

Mon. Corr. XXVIII. B. 1813.

L 1

des

des Meridians ist, desgleichen die Berechnung der Länge auf einer solchen Berührungs-Kugel, deren Halbmesser ein Krümmungs-Halbmesser des Perpendikels ist. Allein Herr *Buzengeiger* hat vergessen, daß diese Halbmesser nicht, so wie er gethan hat, für die Breite des Orts, auf dessen Meridian sich die gegebenen Abstände beziehen, berechnet werden müssen, sondern für die *mittlere Breite* zwischen dem *gegebenen* und *gesuchten* Orte, welche aber unbekannt ist, da sie die eben gesuchte Breite als schon bekannt voraussetzt, daher dieses Problem eigentlich nur indirect aufgelöst werden kann. Nach Hrn. *Buzengeiger's* Verfahren findet diese Schwierigkeit freylich nicht statt, allein man würde damit bey Länder-Aufnahmen von großem Umfange, und bey starken Längen- und Breiten-Differenzen in beträchtliche Fehler verfallen, wie wir sogleich zeigen werden. Hr. *Buzengeiger* hat zwar seine Methode auf ein Beyspiel angewendet, in welchem sowohl der Längen- als auch der Breiten-Unterschied sehr groß ist, und seine Resultate kommen mit jenen überein, die man durch die sphäroidische Rechnung erhält; allein diese Uebereinstimmung ist nur zufällig.

Abgerechnet, daß Hrn. *Buzengeiger's* Methode nicht genau ist, so scheint auch ihre Berechnung ziemlich weitläufig zu seyn, und vor der *Oriani'schen*, welche wir unsern Lesern im XXIII. Bande S. 158 empfohlen haben, in Anbetracht der Kürze keinen Vorzug zu haben. Indessen, indem wir Hrn. *Buzengeiger's* Vorschlag zu verbessern suchten, so ist es uns auch gelungen, die Rechnung beträchtlich abzukür-

zukurzen, wodurch sie nun in der That allen andern bekannten Methoden an Schärfe, Leichtigkeit und Kürze den Rang streitig machen kann. Da dieses Problem in der höhern Geodäsie stets vorkömmt, da man bey einer großen Länder-Aufnahme viele hundert Puncte zu berechnen hat, so ist jede Erleichterung ein reeller Gewinn; man hat daher nicht ohne Ursache alle Mittel versucht, diese Rechnungen möglichst abzukürzen, und durch Beyhülfe vorausberechneter Tafeln zu erleichtern.

Man hat nicht nöthig, so wie Herr Prof. *Buzengeiger* gethan hat, die beyden Krümmungs-Halbmesser in Reihen auszudrücken, man kann solche eben so leicht und streng durch die bekannten Formeln erhalten, nemlich für den Krümmungs-Halbmesser des Meridians $= r$

$$r = \frac{R (1 - e^2)}{\sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \beta)^3}}$$

und für den des Perpendikels $= \rho$

$$\rho = \frac{R}{\sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \beta)}}$$

wo R den Halbmesser des Aequators, β die Breite, e die Excentricität des Erd-Sphäroïds bedeutet. Diese beyden Ausdrücke für die Krümmungs-Halbmesser sind auch deswegen bequemer, weil man solche für jede gegebene Erd-Abplattung leicht berechnen kann, dagegen ihre Ausdrücke in Reihen für jede Abplattung erst mühsam entwickelt werden müßten. Da man aber für eine jede gegebene Abplattung einen andern Halbmesser des Aequators R be-

rechnen muß, so erhält man diesen leicht aus der Formel:

$$R = \frac{10000000 \text{ Mètres}}{\frac{1}{2} \pi} \left(1 + \frac{1}{2} \alpha + \frac{3}{16} \alpha^2 + \frac{1}{32} \alpha^3 \right),$$

oder in Toisen;

$$R = 3266331 \text{ Toises} \left(1 + \frac{1}{2} \alpha + \frac{3}{16} \alpha^2 + \frac{1}{32} \alpha^3 \right),$$

wo α die Abplattung und $e^2 = 2\alpha - \alpha^2$ ist.

Damit hätte man alle Formeln, um diese beyden Krümmungs-Halbmesser in jeder Hypothese der Erd-Abplattung berechnen zu können. Wären z. B. diese Halbmesser für die Breite von Paris $= 48^\circ 50' 14''$ in einer Abplattung $= \frac{1}{334}$ zu berechnen, so hat man:

$$\beta = 48^\circ 50' 14'', \alpha = \frac{1}{334}, e^2 = 0,00597906;$$

man hätte e^2 auch noch kürzer durch die Formel erhalten können:

$$e^2 = 1 - \left(\frac{333}{334} \right)^2 = \frac{667}{334^2}.$$

Hieraus folgt ferner

$$R = 3271220 \text{ Toisen}$$

$$\log r = 6,5143169$$

$$\log \rho = 6,5154470.$$

Da man diese Halbmesser in Secunden ausgedrückt haben muß, so hat man

$$r'' = \frac{648000''}{\pi \cdot r} = \frac{1}{\sin 1'' \cdot r}$$

$$\text{und } \rho'' = \frac{1}{\sin 1'' \cdot \rho},$$

folg-

folglich $\log r'' = 8.8001082$

$\log \varphi'' = 8.7989781,$

sehr nahe, wie Herr *Buzengeiger*, vielleicht nicht so genau, auf einem andern Wege findet.

Hat man einmal die Krümmungs-Halbmesser für eine gegebene Breite, so erhält man ihre Reductionen auf andere Breiten leicht; man darf nur die Aenderungen dieser Halbmesser für eine bestimmte Aenderung in der Breite z. B. für einen Grad berechnen, so kann man die für eine gegebene Breite berechneten allemal auf andere, und folglich auch auf die *mittlere Breite*, reduciren, wenn man einmal durch eine vorläufige Rechnung die *genäherte* gefunden hat. Die *mittlere Breite* ist gemeiniglich nur wenige Grade von der *gegebenen* verschieden, die kleinen Aenderungen der Halbmesser für so kleine Bögen bleiben daher den Breiten-Aenderungen proportional. Z. B. im vorliegenden Falle ist die Aenderung des $\log r''$ für eine Aenderung von 1° in der Breite $= \delta \log r'' = 0.0000679$, und für $\log \varphi''$ ist solche $\delta \log \varphi'' = 0.0000226$. Da man diese Aenderungen für die *mittlere Breite*, das ist, für den halben Breiten-Unterschied braucht, so kann man gleich ihre Hälften, und da diese sich *jederzeit* auf die drey letzten Decimal-Stellen des Logarithmus beziehen, mit Hinweglassung der Nullen also ansetzen: $\frac{1}{2} \delta \log r'' = 339$ und $\frac{1}{2} \delta \log \varphi'' = 113$.

Um diese Arbeit zu erleichtern, so haben wir in beyfolgender Tafel diese Krümmungs-Halbmesser mit ihren Aenderungen in fünf der üblichsten Hypothesen der Erd-Abplattung sowohl allgemein, als auch

auch besonders für *Paris*, *München* und *Wien*, als drey Orte, auf deren Meridiane sich die größten Vermessungen beziehen, für Französische Toisen berechnet. Für dazwischen fallende Abplattungen kann man diese Data durch eine leichte Interpolation erhalten. Zur Abkürzung der Rechnung haben wir einen dritten constanten Logarithmus eingeführt, welchen wir durch $\log \gamma''$ bezeichnen, und welcher nichts anders ist, als $2 \log \varphi'' + \log \sin 1'' - 0.3010300$. Hr. *Buzengeiger* braucht hier, bey der Correction ω , welche von der Länge abhängt, $\log r''$ statt $\log \varphi''$, welches aber irrig ist. Im vorgegebenen Falle ist $\log \gamma'' = 1.9825011$.

Es sey nun, wie bey Hrn. Prof. *Buzengeiger*, der Abstand in der Länge $= a$, in der Breite $= b$; die gegebene Breite $= \beta$, die gesuchte $= \beta'$; die gesuchte Länge $= \lambda'$, so ist:

Für die Breite

nach Hrn. *Buzengeiger*

$$\log \psi = \log r'' + \log b$$

$$\log \phi = \log r'' + \log a$$

$$\log \omega = 4.3845448 + 2 \log \phi + \log \tan(\beta \pm \psi)$$

$$\beta' = (\beta \pm \psi) - \omega;$$

nach uns

$$\log \psi = \log r'' + \log b \pm \frac{1}{2} \delta \log r'' \cdot \psi$$

$$\log \omega = \log \gamma'' + 2 \log a + \log \tan(\beta \pm \psi')$$

$$\beta' = (\beta \pm \psi') - \omega.$$

Für

Für die Länge

nach Hrn. Buzengeiger

$$\log \psi = \log \varphi'' + \log b$$

$$\log \phi = \log \varphi'' + \log a$$

$$\log \lambda = \log \phi - \log \cos (\beta \pm \psi) -$$

$$0,00000000000034 \phi^2 \tan g (\beta \pm \psi)^2$$

nach uns

$$\log \phi = \log \varphi'' + \log a \pm \frac{1}{2} \delta \log \varphi'' \cdot \psi$$

$$\log \lambda = \log \phi - \log \cos (\beta \pm \psi') -$$

$$[0,00000018439 \cdot \phi \cdot \tan g (\beta \pm \psi')]^2$$

Die doppelten Zeichen bey $\pm \frac{1}{2} \delta \log \varphi'' \cdot \psi$ sind so zu verstehen: + für kleinere Breiten, — für grössere Breiten als die gegebene, da natürlich in höheren Breiten diese Halbmesser kleiner werden, und umgekehrt. $\beta + \psi$ gilt bey nördlichen Abständen, $\beta - \psi$ bey südlichen. ψ bleibt in allen Fällen negativ, so wie die Correction für den $\log \cos (\beta \pm \psi')$.

Dasselbe Beyspiel, welches Hr. Buzengeiger zur Erläuterung seiner Rechnung gebraucht hat, wollen wir auch bey der unsrigen anwenden, und die Länge und Breite von *Duisburg* in einer Abplattung $= \frac{1}{310}$ von *Paris* ableiten. Nach *M. C.* VIII. Bd. S. 82 liegt *Duisburg* vom Pariser Meridian 157703,778 $= a$, und der Meridian-Abstand vom Perpendikel $= 152874,734 = b$. Nun stehet die Rechnung, wenn man die Data aus unserer beykommenden Tafel nimmt, also:

Für

Für die Breite

$\log b$	5.1843346	
$\log r''$	8.8000883	
$\log \psi$	3.9844229	$= 9647.7$
$\frac{1}{2} \log r'' \cdot \psi = 366 \times 2.68$		-981	
$\log \psi'$	3.9843248	$= 9645.5$
<hr/>			
$\log a$	5.1978421	
$2 \log a$	0.3956842	
$\log \tan (\beta + \psi')$	0.0996541	
$\log \gamma''$	1.9822581	
		2.4776234	
122×2.68	-327	
$\log w$	2.4775907	$= 300.3$

Diff	...	2°	40'	47.7"
		2	40	45.5
		β	48	50
			14.	0
		$(\beta + \psi')$	51	30
		w	-	5
				0.3
		β'	51	25
				59.2

Für die Länge

$\log a$	5.1978421	
$\log \varrho''$	8.7988771	
		3.9967122	
122×2.68	wie oben...	-327	
$\log \varnothing$	3.9966795	
$\log \cos (\beta + \psi')$	9.7939923	
		8.36207	
		2	
$\log \lambda$	4.2026872	
	N. Z.	0.0005298 6.72414
$\log \lambda'$	4.2021574	

$$\lambda' = 15927.9 = 4^\circ 25' 27.9''$$

Vergleicht man unsere Rechnung mit der *Buzen-geiger'schen*, so sieht man auf den ersten Anblick, wie sehr solche abgekürzt worden, ja man kann, wenn man will und viele Punkte zu berechnen hat, die kleinen Correctionen für die Halbmesser und für den $\log \lambda$ in Tafeln bringen. Wir haben solche Tafeln für unsern Gebrauch gerechnet; z. B. statt der logarithmischen Correction für $\log \lambda$ giebt unsere Tafel

fel die Correction des Bogens λ in Secunden, um den wahren Bogen λ' zu erhalten. In unserm Beyspiele wird in diesem Falle sogleich die natürliche Zahl des $\log \lambda$ gesucht, diese ist $= 15947,^{\circ}3$, die Tafel giebt für die Correction $- 19,^{\circ}4$, folglich λ' wie oben $= 15927,^{\circ}9$. Allein die Berechnung dieser Correction ist so kurz, die dazu erforderlichen Logarithmen von ϕ und $\text{tang} (\beta \pm \psi')$ sind schon vorhanden, und brauchen daher nicht besonders aufgesucht zu werden, so daß diese Rechnung, welche nur mit 5 Decimal-Stellen geführt zu werden braucht, eben so kurz als der Gebrauch der Tafel mit doppelten Eingängen ist.

Um nunmehr zu zeigen, wie genau unsere Rechnung mit der sphäroidischen übereinstimmt, so wählen wir vorzüglich hierzu die *Oriani'sche* Methode als die strengste, weil sie auf keiner der gewöhnlichen Voraussetzungen beruhet, z. B. daß der vorgegebene irdische Bogen sehr klein seyn, daß man die höheren Potenzen der Excentricität vernachlässigen müsse, etc. Nach *Oriani* kann der gegebene Bogen jede beliebige Anzahl Grade begreifen, wie dies die Anwendung auf ein Beyspiel bezeugt hat, wo die Breiten-Differenz $23^{\circ} 24'$, der Längen-Unterschied $26^{\circ} 36'$ betrug (*M. C.* XI. Bd. S. 557). Wir haben diese Rechnungs-Methode in der Hypothese der Erd-Abplattung $\frac{1}{310}$ in Tafeln gebracht, und unsern Lesern im XXIII. Bande S. 158 mitgetheilt. Wird nun nach diesen Tafeln und nach der dazu gehörigen Anweisung obiges Beyspiel von Duisburg gehörig berechnet, so erhält man

die

	die Breite	die Länge
	51° 25' 59,"0	4° 25' 27,"1
Wir haben nach unserer Rechnung oben gefun- den	51 25 59, 2	4 25 27, 9
Unterschied	0,"2	0,"8

Um ferner zu beweisen, daß man sich unseres Verfahrens auch im weitesten Umfange mit Sicherheit bedienen könne, so wählen wir zu diesem Zwecke ein Beyspiel einer der größten Vermessungen, welche bisher noch ausgeführt worden sind, nemlich von der Nord-See bis an das Mittelländische Meer. Im III. Bande der *Base métrique* pag. 268 wird der Abstand des Fort *Montjoux* bey *Barcelona* in Spanien vom Meridian von *Dünkirchen* 9058,⁷⁰ und vom Perpendikel 551571,⁷⁶ Französische Toisen angegeben. Die Breite des Signal-Thurms von *Dünkirchen* setzt *Delambre* auf 51° 2' 9,"2 und die Abplattung auf $\frac{1}{308,6}$, damit findet man vorläufig folgende constante Logarithmen:

$$\log R = 6.5147639, \quad \log r' = 8.7999270, \quad \log \varrho'' = 8.7988101$$

$$\log \gamma'' = 1.9821651, \quad \frac{1}{2} \delta \log r'' = 366, \quad \frac{1}{2} \delta \log \varrho'' = 122.$$

Nun steht die Rechnung auf unsere Art also:

Für die Breite

$\log b$	5.7416019		
$\log r'$	8.7999270		
$\log \psi$	4.5415289	= 34796,"0	} Diff. . . . + 28, 3
$366 \times 9,^{\circ}66$	+ 3538		
$\log \psi'$	4.5418827	= 34824, 3	$\psi' = 9^{\circ} 39' 56,"0$
$\log a$	3.9570323		$\beta = 51^{\circ} 2' 9, 2$
$2 \log a$	7.9140646		$(\beta - \psi') = 41^{\circ} 21' 44, 9$
$\log \tan (\beta - \psi')$. .	9.9447075		$w = \quad \quad \quad 0, 7$
$\log \gamma''$	1.9821651		$\beta' = 41^{\circ} 21' 44, 2$
$122 \times 9,^{\circ}66$	+ 1178		<i>N. Méchains</i> Beob. 41 21 44, 9
$\log w$	9.8410550	= 0,"7	
Unterschied			0,"7

Für die Länge

$\log a$	3.9570323		
$\log \varphi''$	8.7988101	$2.75596 = \log \Phi$	
obige Corr.	+ 1178	$9.94471 = \log \tan (\beta - \psi')$	
$\log \Phi$	2.7559602	$4.26574 = \log \lambda$	
$\log \cos (\beta - \psi')$	9.8753760	6.06641	
$\log \lambda$	2.8805842	2	
	— 9	3.93282	
$\log \lambda'$	2.8805833		
$\lambda' = 759.6 = 12^\circ 39.6'$			
12 40. 1 nach der Base métrique l. o.			
Diff. . . 0. 5			

Nach der *Oriani'schen* Methode erhält man dasselbe, allein nach Hrn. *Buzengeiger's* Anweisung gerechnet, käme für die Breite von *Montjoux* $41^\circ 22' 12.5''$, folglich über eine halbe Minute falsch. Die Länge, da sie in diesem Falle sehr klein ist, stimmt genau.

Um unsere Rechnungsart noch einer andern Prüfung zu unterwerfen, so wählten wir ein Beyspiel, in welchem die Längen-Differenz sehr groß ist. Zu diesem Ende berechneten wir die Breite und Länge von *Brest*, als den vom Pariser Meridian allerentferntesten Orte. Nach *Cassini's Description géométrique de la France* ist der Abstand dieser Stadt vom Pariser Meridian 259206 Toisen, vom Perpendikel 14692 Toisen, In der Abplattung $\frac{1}{310}$ berechnet kömmt:

Nach uns die Breite

von *Brest* = $48^\circ 22' 35.7''$ Länge = $6^\circ 49' 50.9''$

Nach *Oriani* = $48^\circ 22' 35.5''$ — = $6^\circ 49' 51.1''$

Unterschied . . 0.2 0.2

Im XXVII. Bande der *M. C. S.* 255 steht die Berechnung der Länge und Breite der Böhmisches Riesens.

senkuppe aus Abständen vom Wiener Stephansthurm, nach der *Oriani'schen* Methode in der Abplattung $\frac{1}{310}$ berechnet. Wenn man die daselbst in Wiener Klaftern angegebenen Abstände in Pariser Toisen verwandelt, und aus der hier beyfolgenden Tafel die constanten Logarithmen für Wien nimmt, nemlich $\log r'' = 8.8001338$, $\log \varphi'' = 8.7988853$, $\log \gamma'' = 1.9823155$, $\frac{1}{2} \delta \log r'' = 366$, $\frac{1}{2} \delta \log \varphi'' = 122$; so erhält man damit die Breite der Riesenkuppe $= 50^\circ 44' 17''.2$, die Länge $= 38' 3''.0$, nur $0''.2$ in der Breite und $0''.5$ in der Länge von den daselbst berechneten verschieden.

Die Berechnung der Längen und Breiten durch die Krümmungs Halbmesser hat noch folgende Vortheile: Erstens, daß man die gesuchten Längen und Breiten nicht, wie bey allen andern sphäroidischen Rechnungen, durch trigonometrische Linien erhält, deren Auffuchungen und Interpolationen in den Sinus-Tafeln auf Secunden und Zehnthelle schon etwas mühsamer sind, besonders für Sinus und Tangenten kleiner Bögen. Nach unserer Rechnung erhält man alles durch die natürlichen Zahlen, und man braucht nur die Auffuchung des einzigen $\log \cos(\beta \pm \psi')$ auf die Secunde scharf. Zweytens, kann man bey dieser Methode alle Tafeln entbehren, welche z. B. bey der *Oriani'schen*, wenn man die Rechnung abkürzen will, nöthig sind; das beschwerliche dabey ist, daß man für verschiedene Abplattungen auch verschiedene Tafeln haben muß, welches bey uns nicht nöthig ist, weil man da nur die constanten Logarithmen für r'' , φ'' , γ'' in der verlangten Hypothese der Abplattung ein für allemahl zu berechnen braucht, und die man auch in der hier beyfolgenden Tafel findet:

Tafel

der Erd-Abplattung,

		$\frac{1}{330}$	$\frac{1}{340}$
		$\frac{6.5120828}{\log r - 7.7818575 \sin^2 \beta^2}$	$\frac{6.5121405}{\log r = \sqrt{(1 - 7.7689120 \sin^2 \beta^2)^2}}$
		$\frac{6.5147183}{\log \varrho - 7.7818575 \sin^2 \beta^2}$	$\frac{6.5146990}{\log \varrho = \sqrt{(1 - 7.7689120 \sin^2 \beta^2)}}$
Wien	Paris	8.8001046 8.7989608 1.9824665	$\log r'' = 8.8001123$ $\log \varrho'' = 8.7990020$ $\log \gamma'' = 1.9825489$
	München	8.8001524 8.7989767 1.9824983	$\log r'' = 8.8001588$ $\log \varrho'' = 8.7990175$ $\log \gamma'' = 1.9825799$
		8.8001477 8.7989751 1.9824951	$\log r'' = 8.8001542$ $\log \varrho'' = 8.7990160$ $\log \gamma'' = 1.9825769$
		$\frac{1}{3} \log r'' = 343, \frac{1}{3} \log \varrho'' = 1115$	$\frac{1}{3} \log r'' = 333, \frac{1}{3} \log \varrho'' = 1111$

uheiten.

LVIII.

Beobachtungen

des

zweyten Cometen vom Jahre 1813

angestellt

auf der Sternwarte zu Göttingen,

nebst

einigen Bemerkungen über die Berechnung
parabolischer Bahnen.

Von

Carl Friedrich Gauss

vorgelegt d. königl. Ges. d. Wiss. am 10. Septbr. 1813. *)

Den Cometen, welchen mein würdiger und geliebter College, Herr Professor *Harding*, am 3ten April dieses Jahres im Sternbilde des Poniatowskyschen Stieres entdeckte, beobachtete ich selbst seit dem 7ten April auf hiesiger Sternwarte. Folgendes sind die Bestimmungen, welche ich mit dem Kreis-Micrometer des zehnfüßigen Teleskops erhielt:

1813	Mittl. Zeit in Göttingen	Scheinbare ge- rade Aufsteig.	Scheinbare Abweichung
April 7	13 ^U 12' 2"	271° 7' 19,"3	5° 34' 36,"7 N.
9	13 35 40	270 10 33, 5	4 11 3, 4
11	13 17 43	269 1 19, 9	2 33 0, 7
14	13 7 36	266 44 5, 5	0 33 0, 8 S.
21	14 23 0	256 39 19, 3	12 57 56, 0

*) Aus dem Lateinischen übersetzt.

Nach-

Nachher machte Herr Professor *Harding* nachstehende Beobachtungen am Mauer-Quadranten :

1813	Mittl. Zeit in Göttingen	Scheinbare ge- rade Aufsteig.	Scheinbare Abweichung
April 21	15 ^U 7' 21"	256° 34' 19."6	13" 2' 26."5 S.
24	14 22 50	248 23 21	21 45 2
25	14 4 21	244 44 42	25 10 42

Den 24ten und 25ten April war der Comet auch mit bloßen Augen sichtbar. Nachher verhinderte theils ungünstiges Wetter, theils die starke Bewegung des Cometen nach Süden, noch ferner Beobachtungen anzustellen.

Es wäre überflüssig, hier noch einmal die parabolischen Elemente herzusetzen, welche ich selbst gleich anfangs aus den drey ersten Beobachtungen ableitete. Denn ich trug damals deren Verbesserung Herrn Doctor *Gerling* auf, und folgendes sind nun die corrigirten Elemente, welche dieser sehr geschickte und fertige Rechner herausgebracht hat, und die sich sowohl an die hiesigen Beobachtungen, als auch an die des Herrn Doctor *Olbers*, so genau als möglich anschließen :

Zeit des Durchganges durchs Perihelium, im Meridian von Göttingen . . .	1813 May 19.44507
Logarithmus des Abstandes im Perihel. . . .	0.0849212
Länge des Periheliums	197° 43' 7."7
Länge des aufsteig. Knotens	42 40 15, 2
Neigung der Bahn	81 2 11, 8
Bewegung rückläufig.	

Die Beobachtungen des Herrn Doctor Olbers waren folgende :

1813	Mittl. Zeit in Bremen	Scheinbare ge- rade Aufsteigung	Scheinbare Abweichung
April 14	13 ^U 31' 4"	266° 42' 51,2	0° 34' 22,8 S.
15	12 14 29	265 48 47,9	1 46 4,5
19	11 38 0	260 40 39,1	8 15 23,7
21	12 0 35	256 51 59,3	12 42 54,3
24	11 58 38	248 43 57,7	21 25 9,8
25	11 41 30	245 8 18,0	24 49 2,4
25	12 5 38	245 4 3,0	24 54 16,4

Nachfolgende Beobachtung wurde von Hrn. Bouvard auf der kaiserlichen Sternwarte zu Paris an-
gestellt :

1813	Mittl. Zeit in Paris	Scheinbare gerade Aufst.	Scheinbare Abweichung
April 13	16 ^U 22' 2"	267° 27' 18"	0° 24' 46" N.

Die Uebereinstimmung obiger Elemente mit allen
diesen Beobachtungen ist nach Herrn Doctor Ger-
ling's Rechnung folgende :

	Unterschied in		Name des Beobachters
	gerader Aufsteig.	Abwei- chung	
April 7	+ 3,8	+ 8,5	Gauss
9	+ 2,0	+ 34,3	Gauss
11	— 5,3	— 17,7	Gauss
13	— 1,6	— 0,4	Bouvard
14	— 7,4	— 28,6	Gauss
	+ 2,7	— 8,4	Olbers
15	— 0,9	+ 28,7	Olbers
19	— 25,1	+ 103,9	Olbers
21	— 56,6	— 59,2	Olbers
	— 30,1	— 5,2	Gauss
	— 22,8	— 24,1	Harding
24	— 45,2	— 41,4	Olbers
	+ 0,4	— 11,6	Harding
25	— 23,3	— 67,8	Olbers
	— 9,4	— 27,4	Olbers
	+ 9,7	+ 1,4	Harding

Boy

Bey dieser Vergleichung ist auf Aberration und Parallaxe gehörig Rücklicht genommen.

*

*

*

Es sey mir erlaubt, hier noch einige Rechnungs-Abkürzungen aus einander zu setzen, deren ich mich öfter, bey der ersten Bestimmung der parabolischen Bahn eines Cometen nach der Methode des Herrn Doctor *Olbers*, mit Vorthail bedient habe, und wodurch diese an sich schon so einfache Methode noch mehr zusammen gezogen und zur numerischen Rechnung noch bequemer gemacht werden kann. Sie beziehen sich auf die Berechnung der Radii Vectores, und besonders der Chorde zwischen dem ersten und dritten Orte. Zu dem Ende wendet Herr Doctor *Olbers* Ausdrücke von der Form $\sqrt{f+g\epsilon+h\epsilon\epsilon}$ an, und bestimmt die Coëfficienten f, g, h durch Formeln, die an sich zwar einfach genug sind, deren Zusammensetzung aber in den meisten Fällen keine hinreichende Genauigkeit verstattet, wenn man nicht etwa größere Logarithmen-Tafeln mit 6 oder 7 Decimalstellen anwenden will. Statt dieser Ausdrücke nun habe ich andere substituirt, die theils zur numerischen Rechnung geeigneter zu seyn scheinen, theils den Vorthail gewähren, daß man bey allen Operationen nur Tafeln mit 5 Decimalen anzuwenden nöthig hat. Das ganze Verfahren besteht in Folgendem:

Man bezeichne durch

\odot, \odot', \odot'' die Längen der Sonne in der ersten, zweyten und dritten Beobachtung,

R, R', R'' die Distanzen der Sonne von der Erde,

$\alpha, \alpha', \alpha''$ die geocentrischen Längen und

$\delta, \delta', \delta''$ die geocentrischen Breiten des Cometen,

r, r', r'' seine Entfernungen von der Sonne,

$\varrho, \varrho', \varrho''$ seine curtirten Abstände von der Erde,

t, t', t'' die Beobachtungszeiten,

k die Chorde zwischen dem ersten und dritten Orte des Cometen, und es sey

$$M = \frac{\varrho''}{\varrho},$$

so hat man

$$[1] \quad r = \sqrt{(\varrho \cos \alpha - R \cos \odot)^2 + (\varrho \sin \alpha - R \sin \odot)^2 + \varrho \varrho \tan^2 \delta^2}$$

$$[2] \quad r'' = \sqrt{(M \varrho \cos \alpha'' - R'' \cos \odot'')^2 + (M \varrho \sin \alpha'' - R'' \sin \odot'')^2 + M M \varrho \varrho \tan^2 \delta''^2}$$

$$[3] \quad k = \sqrt{(M \varrho \cos \alpha'' - \varrho \cos \alpha - R'' \cos \odot'' + R \cos \odot)^2 + (M \varrho \sin \alpha'' - \varrho \sin \alpha - R'' \sin \odot'' + R \sin \odot)^2 + (M \varrho \tan \delta'' - \varrho \tan \delta)^2}.$$

Die Gleichungen 1, 2 verwandeln sich in folgende :

$$r = \sqrt{\left(\frac{\varrho \varrho}{\cos \delta^2} - 2 \varrho R \cos(\alpha - \odot) + R R\right)}$$

$$r'' = \sqrt{\left(\frac{M M \varrho \varrho}{\cos \delta''^2} - 2 M \varrho R'' \cos(\alpha'' - \odot'') + R'' R''\right)}$$

Setzt man also

$$\cos \varnothing \cos (\alpha - \odot) = \cos \psi, R \sin \psi = B$$

$$\cos \varnothing'' \cos (\alpha'' - \odot'') = \cos \psi'', R'' \sin \psi'' = B''$$

so folgt

$$r = \sqrt{\left[\left(\frac{R}{\cos \varnothing} - R \cos \psi\right)^2 + BB\right]}$$

$$r'' = \sqrt{\left[\left(\frac{R''}{\cos \varnothing''} - R'' \cos \psi''\right)^2 + B''B''\right]}$$

Bestimmt man ferner fünf Hüllsgrößen g, G, h, H, ζ so, daß man habe

$$R'' \cos \odot'' - R \cos \odot = g \cos G$$

$$R'' \sin \odot'' - R \sin \odot = g \sin G$$

$$M \cos \alpha'' - \cos \alpha = h \cos \zeta \cos H$$

$$M \sin \alpha'' - \sin \alpha = h \cos \zeta \sin H$$

$$M \tan \varnothing'' - \tan \varnothing = h \sin \zeta$$

so verwandelt sich die Formel 3 in folgende:

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{(\varnothing h \cos \zeta \cos H - g \cos G)^2 + (\varnothing h \cos \zeta \sin H - g \sin G)^2 + \varnothing \varnothing h h \sin^2 \zeta} \\ &= \sqrt{\varnothing \varnothing h h - 2 \varnothing h g \cos \zeta \cos (G - H) + g g} \end{aligned}$$

Macht man also

$$\cos \zeta \cos (G - H) = \cos \varphi, g \sin \varphi = A$$

so wird

$$k = \sqrt{(\varnothing h - g \cos \varphi)^2 + A A}$$

oder, wenn man überdiß noch $\varnothing h - g \cos \varphi = u$ setzt,

$$k = \sqrt{(u u + A A)}$$

Es wird mehreren Lesern nicht unangenehm seyn, hier nicht nur alle zu diesen Umwandlungen

gen erforderliche Operationen noch einmal neben einander gestellt, sondern auch alle übrigen Operationen beygefügt zu sehen, um alles, was zur ersten Berechnung einer parabolischen Bahn gehört, hier pefammen zu haben. Zugleich werde ich dieses Verfahren durch ein von unserm Cometen hergenommenes Beyspiel erläutern. Zu dem Ende wähle ich meine Beobachtungen vom 7ten, 14ten und 21ten April, aus denen man nach gehöriger Reduction folgende Data erhält:

$t = 7,55002$	
$t' = 14,54694$	
$t'' = 21,59931$	
$\alpha = 271^{\circ} 16' 38''$	$\epsilon = + 29^{\circ} 2' 0''$
$\alpha' = 266 \quad 27 \quad 22$	$\epsilon' = + 22 \quad 52 \quad 18$
$\alpha'' = 256 \quad 48 \quad 8$	$\epsilon'' = + 9 \quad 53 \quad 12$
$\odot = 17 \quad 47 \quad 41$	$\log R = 0.00091$
$\odot' = 24 \quad 38 \quad 45$	$\log R' = 0.00175$
$\odot'' = 31 \quad 31 \quad 25$	$\log R'' = 0.00260$

I. Die erste Operation besteht in der genäherten Bestimmung der Gröfse M , wofür man folgenden Ausdruck hat

$$M = \frac{t'' - t'}{t' - t} \cdot \frac{\tan \epsilon' \sin(\alpha - \odot') - \tan \epsilon \sin(\alpha' - \odot')}{\tan \epsilon'' \sin(\alpha' - \odot') - \tan \epsilon' \sin(\alpha'' - \odot')}$$

Im gegenwärtigen Falle findet man $\log M = 9.75799$.

II. Alsdann müssen die Gröfsen g, G, h, H, z nach folgenden Formeln bestimmt werden, welche offenbar den obigen gleichgeltend, und für die Rechnung noch bequemer sind:

$$M \sin z \quad R''$$

$$\begin{aligned}
 R'' \cos (\odot'' - \odot) - R &= g \cos (G - \odot) \\
 R'' \sin (\odot'' - \odot) &= g \sin (G - \odot) \\
 M - \cos (\alpha'' - \alpha) &= h \cos \zeta \cos (H - \alpha'') \\
 \sin (\alpha'' - \alpha) &= h \cos \zeta \sin (H - \alpha'') \\
 M \tan g'' - \tan g &= h \sin \zeta
 \end{aligned}$$

In unserm Beyspiele erhält man

$$G = 113^{\circ} 43' 57''$$

$$\log g = 9.38029$$

$$H = 109^{\circ} 5' 49''$$

$$\zeta = 44 \quad 13 \quad 9$$

$$\log h = 9.81477.$$

III. Ferner setzt man

$$\cos \zeta \cos (G - H) = \cos \varphi$$

$$\cos \zeta \cos (\alpha - \odot) = \cos \psi$$

$$\cos \zeta'' \cos (\alpha'' - \odot'') = \cos \psi''$$

$$g \sin \varphi = A$$

$$R \sin \psi = B$$

$$R'' \sin \psi'' = B''.$$

Sollte es sich hier zufällig treffen, daß die Cosinus der Winkel φ , ψ , ψ'' nur wenig von der Einheit verschieden wären, so wird es gut seyn, bey dieser Rechnung Logarithmen mit 6 oder 7 Decimalen zu gebrauchen. Es ist übrigens nicht nöthig, die Winkel φ , ψ , ψ'' in Graden, Minuten und Secunden zu berechnen, sondern man kann sogleich in den Tafeln von den Logarithmen der Cosinus dieser Winkel zu denen der Sinus übergehen.

In unferm Beyspiele wird

$$\log A = 9.22527$$

$$\log B = 9.98706$$

$$\log B' = 9.86038$$

IV. Endlich setze man

$$h \cos \epsilon = b$$

$$\frac{h \cos \epsilon''}{M} = b''$$

$$g \cos \phi - b R \cos \psi = c$$

$$g \cos \phi - b' R' \cos \psi' = c''$$

In unferm Beyspiele ist

$$\log b = 9.75645$$

$$\log b'' = 0.05028$$

$$c = + 0.31365$$

$$c'' = + 0.95443$$

V. Nach diesen Transformationen hängen die Radii Vectores r , r'' und die Chorde k von der unbekannten Größe u auf folgende Art ab:

$$r = \sqrt{\left(\frac{u+c}{b}\right)^2 + B B}$$

$$r'' = \sqrt{\left(\frac{u+c''}{b''}\right)^2 + B'' B''}$$

$$k = \sqrt{(uu + A A)}$$

Hieraus muß u durch Versuche so bestimmt werden, daß dadurch der Gleichung

$$(r+r''+k)^{\frac{2}{3}} - (r+r''-k)^{\frac{2}{3}} = \frac{t''-t}{m}$$

ein

ein Genüge geschehe, in welcher m die Zeit von 9,6887401 Tagen bedeutet, wovon der Logarithmus $\log m = 0.9862673$. Der Gröfse $(r + r'' - k)^{\frac{3}{2}}$ müßte das Zeichen $+$ vorgesetzt werden, wenn der vom Cometen in der Zeit $t'' - t$ durchlaufene heliocentrische Bogen gröfser als 180° wäre. Dieser Fall kann indels bey den Voraussetzungen, worauf diese erste Bahnbestimmung sich gründet, nicht statt finden. Uebrigens wird es kaum nöthig seyn zu bemerken, dafs man bey der numerischen Berechnung von r einen Hülfswinkel θ einführt, so dafs

$$\frac{bB}{u+c} = \tan \theta$$

wodurch $r = \frac{B}{\cos \theta}$ wird, und eben so bey r'' und k . Auch sieht man leicht ein, dafs bey allen diesen Operationen meine Hülftafel zur unmittelbaren Auffindung der Logarithmen der Summen und Differenzen sehr gute Dienste leisten werde.

In unserm Beyspiele ist $\log \frac{t''-t}{m} = 0.16139$, und nach wenigen Versuchen findet man $u = 0.24388$.

VI. Ist u bekannt, so hat man

$$\varphi = \frac{u + g \cos \phi}{h}, \quad \varphi'' = M\varphi$$

(in unserm Beyspiele $\log \varphi = 9.80364$, $\log \varphi'' = 9.56163$).

Die nun folgenden Operationen sind zwar hinlänglich bekannt; damit indels hier alles beyfammen sey, so will ich auch die übrigen Formeln, deren ich mich gewöhnlich bediene, hersetzen. Es seyen demnach

LVIII. Beobacht. des zweyten Comet. v. J. 1813 etc. 5.

λ , λ'' die heliocentrischen Längen des Cometen bey
der ersten und dritten Beobachtung,

β , β'' die heliocentrischen Breiten,

v , v'' die Längen in der Bahn,

Ω die Länge des aufsteigenden Knotens,

i die Neigung der Bahn, die zwischen 0° und 90°
angenommen werden muß, wenn man, wie
gewöhnlich, *rechtläufige* und *rückläufige* Be-
wegung unterscheidet,

ω die Länge des Periheliums,

T die Zeit des Durchganges durchs Perihelium,

q der Abstand im Perihelio.

VII. Die heliocentrischen Positionen findet man
durch die Formeln

$$\varrho \cos(\alpha - \odot) - R = r \cos \beta \cos(\lambda - \odot)$$

$$\varrho \sin(\alpha - \odot) = r \cos \beta \sin(\lambda - \odot)$$

$$\varrho \tan \epsilon = r \sin \beta$$

$$\varrho'' \cos(\alpha'' - \odot'') - R'' = r'' \cos \beta'' \cos(\lambda'' - \odot'')$$

$$\varrho'' \sin(\alpha'' - \odot'') = r'' \cos \beta'' \sin(\lambda'' - \odot'')$$

$$\varrho'' \tan \epsilon'' = r'' \sin \beta''.$$

Stimmen die aus diesen Ausdrücken erhaltenen
Werthe für r , r'' mit denen überein, die vorhin aus
der Gröfse u abgeleitet waren, so wird dieses die
Richtigkeit der Rechnung bestätigen. Die Bewegung
des Cometen wird rechtläufig oder rückläufig seyn,
je nachdem λ'' gröfser oder kleiner ist als λ .

In unserm Beyspiele findet sich

$$\lambda = 225^\circ 4' 22'', \beta = + 14^\circ 51' 39'', \log r = 0.13896$$

$$\lambda'' = 223^\circ 6' 55'', \beta'' = + 2^\circ 49' 28'', \log r'' = 0.11068$$

Die Bewegung des Cometen ist also *rückläufig*.

VIII.

VIII. Zur Beſtimmung der Länge des aufſteigenden Knotens und der Neigung bediene ich mich folgender Formeln:

$$\pm \operatorname{tang} \beta = \operatorname{tang} i \sin (\lambda - \Omega)$$

$$\pm \frac{\operatorname{tang} \beta'' - \operatorname{tang} \beta \cos (\lambda'' - \lambda)}{\sin (\lambda'' - \lambda)} = \operatorname{tang} i \cos (\lambda - \Omega)$$

wo die obern Zeichen ſich auf rechtläufige, die untern auf rückläufige Bewegung beziehen. Die Längen in der Bahn erhält man dann durch die Ausdrücke

$$\frac{\operatorname{tang} (\lambda - \Omega)}{\cos i} = \operatorname{tang} (v - \Omega)$$

$$\frac{\operatorname{tang} (\lambda'' - \Omega)}{\cos i} = \operatorname{tang} (v'' - \Omega)$$

wo $v - \Omega$, $v'' - \Omega$ reſp. in denſelben Quadranten genommen werden müſſen, in denen $\lambda - \Omega$, $\lambda'' - \Omega$ ſind.

Für unſern Cometen erhält man

$$\Omega = 42^{\circ} 40' 8''$$

$$i = 81 \quad 1 \quad 3$$

$$v = 237 \quad 43 \quad 7$$

$$v'' = 225 \quad 31 \quad 32.$$

IX. Die Länge des Periheliums und die Diſtanz im Perihelio geben folgende Formeln:

$$\frac{1}{\sqrt{r}} = \frac{1}{\sqrt{q}} \cos \frac{1}{2} (v - \omega)$$

$$\frac{\cotg \frac{1}{2} (v'' - v)}{\sqrt{r}} = \frac{1}{\sin \frac{1}{2} (v'' - v) \cdot \sqrt{r''}} = \frac{1}{\sqrt{q}} \sin \frac{1}{2} (v - \omega)$$

Bey unſern Cometen wird $\omega = 197^{\circ} 37' 51''$,
 $\log q = 0.08469$. X.

X. Endlich nimmt man aus der *Barker'schen* Tafel die mittleren Bewegungen, welche den wahren Anomalieen $v - \omega$, $v'' - \omega$ oder $-v$, $\omega - v''$ entsprechen. Bezeichnet man sie durch M , M'' , so erhält man

$$T = t \mp M n q^{\frac{3}{2}} = t'' \mp M'' n q^{\frac{3}{2}}$$

wo die oberen Zeichen gelten, wenn bey rechtläufiger Bewegung $v > \omega$, $v'' > \omega$, oder bey rückläufiger $v < \omega$, $v'' < \omega$; die untern in entgegengesetzten Fällen. Die Gröſſe n ist eine Constante, und ihr Logarithmus $= 0.0398723$. Die Uebereinstimmung der beyden Werthe für T ist eine zweyte Bestätigung der Richtigkeit des Calculs.

In unserm Beyspiele findet man

$$T = 49,518$$

$$T = 49,517$$

so daß man für die Zeit des Durchganges durchs Perihelium annehmen kann May 19, 5175.

Berechnet man nach diesen Elementen den geocentrischen Ort des Cometen für die Zeit der mittlern Beobachtung, so findet sich die Länge $= 266^\circ 27' 15''$, die nördliche Breite $= 22^\circ 52' 18''$, jene bis auf $7''$, diese genau mit der Beobachtung übereinstimmend.

LIX.

Über das
Kalenderwesen der Griechen
und Römer.

Von
Herrn Profeffor *Ideler*.

Die Zeitrechnung, deren sich mit geringen Abweichungen sämmtliche chriftliche Völker bedienen, verdankt ihre Hauptzüge der von *Julius Cäſar* veranstalteten Reform des römischen Jahrs. Bey der Analogie, welche demnach zwischen unfrem Kalender und dem altrömischen ſtatt findet, verdient die Frage: *Welche Geſtalt hatte das Kalenderweſen der beyden vornehmſten Völker der alten Welt vor und unmittelbar nach jener Reform?* die Aufmerkſamkeit jedes wiſſenſchaftlich gebildeten Mannes, geſchweige des Alterthumsforſchers. Sie wo möglich genügender zu beantworten, als es bisher geſchehen zu ſeyn ſcheint, iſt der Zweck dieſer Vorleſung. *)

Die Griechen hatten, ſo weit die Geſchichte reicht, ein *gebundenes Mondjahr*, d. i. ſie ordneten ihre Monate nach den Wechſeln des Mondes und ihre Jahre nach dem Laufe der Sonne, indem ſie zu den zwölf Monaten des Mondjahrs, die bekanntlich das Sonnenjahr nicht völlig erſchöpfen, von Zeit zu Zeit

*) Gehalten in der *philomathiſchen Geſellſchaft* zu Berlin.

Zeit einen dreyzehnten zählten, um den Anfang ihres Jahrs in der Gegend der Sommer-Sonnenwende zu erhalten. Bey dieser Einrichtung mußte der Anfang eines jeden ihrer Monate in Ansehung der Nachtgleichen und Sonnenwenden in einem Zeitraume von etwa vier unserer Wochen umherschwanke, zur unausbleiblichen Verwirrung aller von bestimmten Jahrszeiten abhängenden Geschäfte des bürgerlichen Lebens. Sie waren daher, um die richtigen Momente derselben zu erkennen, genöthigt, sich nach Merkmalen in der Natur umzusehen, und woher konnten sie diese sicherer entlehnen, als von den periodisch wiederkehrenden Auf- und Untergängen der Gestirne? Es wird nöthig seyn, hierüber Einiges voranzuschicken.

Ueberall auf der Erde zwischen dem Aequator und den Polen ist eine Anzahl Sterne beständig sichtbar, eine andere beständig unsichtbar. Die übrigen gehen, wie die Sonne, täglich auf und unter, nur bey der veränderlichen Lage der Erde im Weltraum in immer andern Tageszeiten. Von diesem *täglichen* Auf- und Untergange ist hier nicht die Rede.

Eine Folge der von mehreren Alten geahnten aber erst durch die neuere Sternkunde außer Zweifel gesetzten Bewegung der Erde ist die scheinbare Bewegung der Sonne, vermöge welcher sie binnen einem Jahre von Westen gegen Osten um den Himmel läuft. Bey dieser Bewegung können diejenigen Gestirne, die sich jedesmahl in ihrer Nähe befinden, für uns nicht sichtbar seyn, indem sie zugleich mit ihr auf- und untergehen, mithin am Tage über dem Horizonte stehen. So wie sie ostwärts fortrückt, werden immer andere Sterne

Sterne in den Kreis der Unſichtbarkeit treten, und denſelben immer andere weſtwärts verlaſſen. Die ihr am Himmel gegenüberſtehenden Sterne werden aufgehen, wenn ſie untergeht, untergehen wenn ſie aufgeht, alſo während der Nacht über dem Horizonte ſeyn. Begreiflicherweiſe muß es hiernach für jeden auf- und untergehenden Stern einen Tag im Jahre geben, wo er in den Sonnenſtrahlen verſchwindet, einen andern, wo er aus denſelben hervortritt, und noch andere, wo er zugleich mit der Sonne, ſey es ihr nahe oder gegenüber, im Horizonte ſteht.

Um die Wechſel und Zwischenräume dieſer *jährlichen* Auf- und Untergänge etwas näher kennen zu lernen, richten wir unſere Aufmerkſamkeit auf den einige Grade ſüdlich von der Sonnenbahn entfernten Stern am Kopfe des Stiers, den die Araber *Aldebaran* genannt haben. Da hiebey die Polhöhe weſentlich in Betracht kommt, ſo wollen wir uns auf den Horizont Roms verſetzen, wo ſich nun bey anhaltender Beobachtung der Erſcheinungen des geſtirnten Himmels Folgendes ergeben wird:

Der Stern zeigt ſich im Frühlinge des Abends am Weſthimmel. Mit jedem Tage erſcheint er bey dem Anbruch der Nacht tiefer, und mit jedem Tage geht er früher unter, bis er ſich endlich bey Annäherung der Sonne den Blicken gänzlich entzieht. Es iſt der 9. May, wo er zum letztenmahl noch wenige Augenblicke bey ſeinem Untergange in der Nähe des Horizonts bemerklich iſt, oder, nach dem jetzt üblichen Kunſtausdrucke, *heliacisch untergeht*. Hierauf geht die Sonne vor ihm vorüber, und es iſt, wie ſich entweder durch Rechnung oder durch Anſicht einer künſt-

künstlichen Himmelskugel ergiebt, der 25. May, wo er zugleich mit ihr unter, und der 5. Junius, wo er zugleich mit ihr aufgeht. Beydes würde an Einem Tage geschehen, wenn er sich in der Ecliptik selbst befände. Erst am 26. Junius hat sich die Sonne so weit östlich von ihm entfernt, daß er bey seinem Aufgange während der Morgendämmerung auf einige Augenblicke in der Nähe des Horizonts sichtbar werden kann. Diese Wiedererscheinung in Osten wird der *heliacische Aufgang* genannt.

Bey Bestimmung der hier angegebenen Monats- tage habe ich eine Regel befolgt, die sich aus dem Alterthum durch Tradition zu uns fortgepflanzt hat, und allgemein von den arabischen so wie von den neuern Astronomen dem *Ptolemäus* beygelegt wird, obgleich in seinen noch vorhandenen Schriften nirgends davon die Rede ist, ich meine die, daß der *Sehungsbogen* oder die senkrechte Tiefe der Sonne unter dem Horizonte zwölf Grade betragen müsse, wenn ein Stern erster Größe untergehend zuletzt und aufgehend zuerst wahrgenommen werden soll. Die Berechnung der von den Alten beobachteten Fixstern-Erscheinungen lehrt in der That, daß dieser Bogen im Ganzen genommen mit den von ihnen gemachten Erfahrungen übereinstimmt, ob ihm gleich bey der so veränderlichen Durchsichtigkeit der Athmosphäre und Verschiedenheit der Sehkraft keine eigentliche Gränze gesetzt werden kann. *Plinius* sagt*), daß das Zeit-Intervall zwischen dem heliacischen Auf- oder Untergange eines Sterns und dem Auf-

*) H. N. XVIII. Sect. 53.

Auf- oder Untergänge der Sonne zum mindesten drey Viertelfstunden — *dodrantes horarum* — betrage, woraus sich für den Sehungsbogen nur etwa 7 bis 8 Grad ergeben, für ein sehr scharfes Auge und den römischen Himmel gewiß nicht zu wenig.

Nachdem Aldebaran in der Morgendämmerung sichtbar geworden ist, erscheint er mit jedem Tage früher im Horizont und länger über demselben. Am 12. August geht er bereits um Mitternacht und späterhin in den Abendstunden auf. Am 19. November ist sein *Aufgang* zum letztemahl sichtbar, indem dieser *akronychisch* oder beym Anbruch der Nacht erfolgt. Während er sich so von der Sonne entfernt hat, ist er mit jedem Morgen dem West-Horizonte näher gerückt, den er endlich am 11. December zum erstenmahl sichtbar erreicht, *kosmisch* oder beym Anbruch des Tages *untergehend*. Zwischen dem akronychischen Auf- und kosmischen Untergange geht er am 28. November beym Aufgange der Sonne unter und am 8. December beym Untergange der Sonne auf, dem unbewaffneten Auge natürlich nicht bemerkbar.

Ganz ähnliche Erscheinungen, wie die bisher beschriebenen, stellen alle übrige auf- und untergehende Sterne dar, nur dafs nach Verschiedenheit ihres Orts an der scheinbaren Himmelskugel, und besonders ihrer Entfernung von der Sonnenbahn, die Tage, Wechsel und Intervalle ihrer jährlichen Auf- und Untergänge verschieden ausfallen. So gehen die in beträchtlicher nördlicher Entfernung von der Ecliptik stehenden Sterne, z. B. Arctur, bey uns früher im Jahre heliacisch auf als unter, so dafs sie
 sich

sich nie auf eine ganze Nacht den Blicken des Beobachters entziehen können.

Man sieht, es sind überhaupt *acht* Auf- und Untergänge, welche durch die jährliche Bewegung der Sonne bestimmt werden und mit derselben periodisch wiederkehren. Nur vier davon sind ein Gegenstand der Beobachtung, und werden deshalb die *scheinbaren* genannt, zum Unterschiede der übrigen, welche die *wahren* heißen. Die ersten kommen hier allein in Betracht, nämlich der *heliacische Untergang*, der *heliacische Aufgang*, der *akronychische Aufgang* und der *kosmische Untergang**), wofür wir uns künftige mit dem Uebersetzer von Virgil's Landbau die Benennungen, *Spätuntergang*, *Früh- aufgang*, *Spätaufgang* und *Frühuntergang* gebrauchen wollen.

Was die Namen betrifft, die diese Erscheinungen bey den Alten führten, so bemerke ich, daß sie bey den Griechen gewöhnlich *επιτολή* und *δύσις*, bey den Römern *ortus* und *occasus* hießen, welche Wörter, mit Ausnahme des ersten, vom *täglichen* Auf und Untergange entlehnt sind. Kunstausdrücke zur Unterscheidung des zwiefachen Auf- und Untergangs finden sich nur bey den wissenschaftlichen Schriftstellern, *Geminus*, *Ptolemäus* und andern; im gemeinen Leben sprach man vom Auf- und Unter-

*) Die Kunstausdrücke *heliacisch* und *kosmisch* scheinen zuerst bey *Servius* vorzukommen. *Ad Virg. Georg. I.* 218. Von dem *akronychischen Aufgange* ist schon bey *Theophrast* die Rede. *De sign. pluviarum* p. 416 der Leidner Ausgabe von 1613.

Untergange schlechthin, und konnte darauf rechnen, verstanden zu werden. So dachte gleich jeder römische Leser des Horaz bey dem *saevus Arcturi cadentis impetus* an den Spätuntergang des Arctur, und auch wir können an keinen andern denken, wenn wir erwägen, daß dieser Untergang unter der Polhöhe und zur Zeit des Dichters im Anfange des Novembers, der Frühuntergang dagegen in der schönsten Jahreszeit eintraf.

Blicke nun das Verhältniß der Fixsterne zur Sonnenbahn unveränderlich, so würden sie unter jeder Polhöhe unwandelbare Merkmale der Jahreszeiten abgeben, die dem aufmerksamen Beobachter des Himmels die Stelle eines nach dem Laufe der Sonne eingerichteten Kalenders vertreten könnten. Sie sind aber einer gemeinschaftlichen Bewegung unterworfen, durch die sie in östlicher Richtung um die Pole der Ecliptik geführt werden, einer Bewegung, deren eigentliches Wesen sich durch den Namen *Vorrückung der Nachtgleichen* ausdrückt. Eine Folge davon ist, daß die jährlichen Auf- und Untergänge der Sterne allmählig an immer andern Tagen des Sonnenjahrs erfolgen, so daß es bey ihrer Bestimmung nicht bloß auf den Ort, sondern auch auf die Zeit der Beobachtung ankommt. So verlor sich Aldebaran, dessen Spätuntergang unter der Polhöhe Roms gegenwärtig, wie bemerkt worden, auf den 9. May trifft, zu Cäsar's Zeiten bereits am 19. April in den Strahlen der Abendsonne.

Schon aus der Vergleichung dieser beyden Monatstage ergibt sich indessen, daß die Bewegung der Fixsterne sehr langsam von Statten geht, und daß die

die Tage der jährlichen Auf- und Untergänge der Gestirne auf mehrere Menschenalter als unveränderlich gelten können. Die Alten, welche die Verschiebung derselben ohnedies sehr spät ahnten (erst *Hipparch* bemerkte die Vorrückung der Nachtgleichen), bedienten sich ihrer daher überall, wo es auf genaue Bestimmung der Zeiten des Sonnenjahres ankam, bey den Geschäften des Feldbaues, der Viehzucht, der Schifffahrt. Sie wußten am gestirnten Himmel, der sich in ihren Klimaten ungleich feltner getrübt darstellt, als in den unfrigen, so gut Bescheid, wie wir in unserm Kalender.

Ohne mich hier auf die Frage einzulassen, ob die Griechen in diesem Puncte ihre eignen Lehrer gewesen, oder ihnen die Erfahrungen und Einlichten von Völkern älterer Cultur zu Statten gekommen sind (letzteres behauptet der Scholiast des *Aratus*, der die nach den Erscheinungen der Fixsterne geordneten Kalender eine Erfindung der Aegypter und Chaldäer nennt*), bemerke ich bloß, daß die Benutzung der jährlichen Auf- und Untergänge der Gestirne zur Regulirung der Geschäfte des bürgerlichen Lebens über alle historische Zeit hinaufreicht, ja so alt ist, daß sich *Prometheus* bey *Aeschylus* als den

*) Ad *Dios.* v. 20. Auch *Ptolemäus* scheint dahin zu deuten, wenn er (*Almagest* Buch XIII. S. 321 des griechischen Textes), vom Sehungsbogen der Planeten handelnd, sagt, daß unter dem Parallel von 14 Stunden 15 Minuten, unter welchem die *Phönizier* und *Chaldäer* wohnten, die meisten und sichersten der dahin gehörigen Beobachtungen angestellt worden wären.

den Urheber davon angeben kann. „Es gebrach den Sterblichen,“ läßt ihn der Dichter sagen*), „an jedem sichern Merkmale des Winters, des blumigen, Frühlings und des fruchtbringenden Sommers; ohne Einlicht lagen sie ihren Geschäften ob, bis ich ihnen die Aufgänge der Gestirne und die schwer zu erkennenden Untergänge zeigte.“

Schon *Hesiodus* bedient sich in seinem Landbau der Fixstern-Erscheinungen zur Bestimmung der Hauptepochen des Jahres. Er knüpft den Anfang des Frühlings an den Spätaufgang des Arctur, die Zeit der Ernte an den Frühaufgang der Plejaden, die des Dreschens an den Frühaufgang des Orion, die der Weinlese an den Frühaufgang des Arctur, und die des Pflügens und der Stürme, womit sich die Schifffahrt der Alten zu endigen pflegte, an den Frühuntergang der Plejaden, der Hyaden und des Orion**). Wir kennen weder die Zeit noch die Gegend, wo er gelebt hat, mit Bestimmtheit. Setzen wir ihn aber in den Anfang des neunten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung und unter den Parallel von 38 Grad, der mitten über Griechenland läuft (Annahmen, welche nicht weit von der Wahrheit abweichen werden), so entsprechen den gedachten Epochen folgende Tage des anticipirten julianischen Kalenders: dem Anfange des Frühlings der 19. Februar, der Ernte der 15. Mai, der Dreschzeit der 8. Julius, der Weinlese der 19. September und dem Anfange der stürmischen Jahreszeit entweder der 7te, oder

*) v. 453.

**) v. 383, 564, 597, 608, 614.

oder der 12te, oder der 19te November*), je nachdem wir den Frühuntergang der Plejaden, oder der Hyaden, oder des Orion in Rechnung bringen, für die Hyaden den Aldebaran und für den Orion den mittelften Stern im Gürtel als Stellvertreter nehmend. Will man diese Tage mit denen des heutigen Jahres vergleichen, so muß man bemerken, daß die Nachtgleichen damals 20 Tage später nach dem julianischen Kalender eintrafen, als jetzt, mithin acht Tage später, als nach unserm gregorianischen.

Es finden sich noch zwey Zeitbestimmungen bey *Hesiodus*, die hier zu erwägen sind. Um aus dem beobachteten Spätuntergange der Plejaden ihren dem griechischen Landmanne wichtigen Frühaufgang durch Weiterzählung der Tage für den Fall herzuleiten, daß etwa trübe Witterung die Wahrnehmung hinderte, setzt er das Intervall beyder auf 40 Tage**), der Wahrheit nahe gemäß, indem dies Gestirn am 6. April unter und am 15. Mai aufgieng. Minder richtig läßt er den Spätaufgang des Arctur, womit er den Frühling beginnt, 60 Tage nach der Win-

*) Für den, der diese Data etwa kontrolliren möchte, bemerke ich, daß die Rechnung für diejenigen Jahre des Hesiodeischen Zeitalters angestellt ist, welche zwischen zwey Schaltjahren in der Mitte liegen. Die jährliche Präcession habe ich zu 50,1 Secunden und die Schiefe der Ecliptik zu 23° 54' angenommen. Für die Plejaden ist der Hauptstern Alcyone, dritter Größe, mit 14° Sehungsbogen in Rechnung gebracht.

**) v. 385.

Winter-Sonnenwende-eintreten *). Der Stern gieng am 19. Februar auf, und da die Sonnenwende damals auf den 29. December traf, so beträgt der Zwischenraum nur 52 Tage. Unmöglich können wir sein Zeitalter und seinen Wohnort so weit verschieben, bis die Angabe genau wird; wir müssen daher zu ihrer Rechtfertigung sagen, entweder dafs es ihm blofs auf eine runde Zahl von Tagen angekommen sey, oder dafs es seiner Zeit noch ganz an den Mitteln gefehlt habe, die Sonnenwenden auch nur mit einiger Genauigkeit zu bestimmen. **)

Dem Beyspiel des *Hesiodus* folgten nachmals alle griechische Schriftsteller, denen es um eine genaue Bezeichnung der Zeiten des Sonnenjahrs zu thun war. In diesem Falle sahen sich unter andern *Hippocrates*, *Aristoteles* und *Theophrast*, um nicht mehrere später lebende zu nennen. Der erste sagt ***), der Arzt müsse die Nachtgleichen und Sonnenwenden, wie auch die Aufgänge der Sterne, besonders die des Sirius und des Arctur, und den Untergang der Plejaden berücksichtigen. Es sind also hauptsächlich die Wechsel der Jahreszeiten, die er dem Arzt als kritisch zu beachten empfahl.

Ei

*) v. 564.

**) Nach *Hipparch* und *Ptolemäus* (*Almagest* B. III. S. 61) waren selbst die vierthalbhundert Jahre später von *Meton* und *Euctemon* beobachteten Solstitien nur ganz im Groben — ὀλοσχερέστερον — angesetzt. Viel früher konnte von eigentlichen astronomischen Beobachtungen bey den Griechen wol nicht die Rede seyn.

***) *De aëre, locis et aquis* Sect. III. p. 71 der Ausgabe von 1595.

Es kommt nämlich bey den Griechen eine doppelte Eintheilung des Jahres vor, in vier und in sieben Zeiten. Wer vier Jahreszeiten rechnete, begann den Frühling mit der Nachtgleiche*), den Sommer mit dem Frühaufgang der Plejaden, den Herbst mit dem Frühaufgang des Arctur und den Winter mit dem Frühuntergang der Plejaden. Diese Eintheilung findet sich im dritten Buch der Schrift *de Diaeta***), die des Hippocrates Namen trägt, aber vermuthlich nicht ihm, sondern einem seiner Zeitgenossen angehört. Wer sieben Jahreszeiten annahm, wie nach Galen's Versicherung***) Hippocrates in einem verloren gegangenen Werke, rechnete den Frühling — εἰς — und den Herbst — φθινόπωρον oder μετόπωρον — auf die eben gedachte Weise, theilte aber den Sommer und den Winter ihrer unverhältnißmäßigen Länge wegen aufs Neue, nämlich den Sommer in den Frühsommer — θέρος — und den Spätsommer — ὁπώρα — und den Winter in die Saatzeit — ἄρτος oder σπορητὸς —
in

*) Hesiodus hatte den Anfang des Frühjahrs an den Spätaufgang des Arctur geknüpft. Späterhin schob man ihn einen Monat tiefer ins Jahr hinein, weil man den Eintritt der Sonne in die nördliche Halbkugel für eine passendere Epoche halten mußte. Es fehlte aber zur Bezeichnung dieses Frühlingsanfanges an einem in die Augen fallenden Sternsignal; man mußte sich also begnügen, schlechtweg die Nachtgleiche zu nennen, ob sie gleich nur auf astronomischem Wege mit Sicherheit zu bestimmen war.

**) Sectio IV. p. 34.

***) Comun. in l. I. Epidemiorum p. 7. des neunten Bandes der Pariser Ausgabe der sämtlichen Werke.

in die stürmische Jahreszeit — χειμῶν — und in die Zeit der Baumpflanzung — φυταλία — indem er den Frühling von der Nachtgleiche, den Frühsommer vom Frühaufgang der Plejaden, den Spätsommer vom Frühaufgang des Sirius, den Herbst vom Frühaufgang des Arctur, die Saatzeit vom Frühuntergange der Plejaden, die stürmische Jahreszeit von der Sonnenwende, und die Zeit der Baumpflanzung vom Spätaufgange des Arctur rechnete. Diese sieben Epochen treffen unter dem Parallel von 38 Graden und ums Jahr 430 vor Chr. Geburt, wo sich *Hippocrates* bey einer Pest durch seine Kunst in Griechenland berühmt machte, auf den 26. März, den 17. Mai, den 28. Julius, den 22. September, den 10. November, den 26. December und den 22. Februar des julianischen Kalenders. Was insbesondre die *Opora* betrifft, so verstanden die Griechen darunter die mit dem Aufgange des Hundsterns oder Sirius eintretende heißeste Zeit des Jahres, wo man das Obst — ὀπώρα — einsammelte, was wir mit einem von den Alten auf uns gekommenen Ausdruck *Hundstage* nennen*). Man muß daher nicht, ὀπώρα mit φθινόπω-

809

*) Diesen Namen führen in unserm Kalender die Tage, welche die Sonne im Zeichen des Löwen zubringt. Genau so nimmt *Olympiodor* die ὀπώρα. Er sagt nämlich: "Der Sommer zerfällt in zwey Zeiten, in das θέρος, wo die Sonne den Krebs und die Jungfrau durchläuft, und in die ὀπώρα, wo sie im Löwen verweilt." *Comment. ad I. I. Meteor. Aristot.* S. 20. Hiernach bestand der Sommer eigentlich aus drey Theilen, wovon der erste und dritte θέρος und der mittlere ὀπώρα genannt wurde.

ποι verwechselnd, den ἀστὴρ ὀψωνίδης des Homer*) durch das *herbstliche Gestirn* übersetzen. Der Dichter meint den Sirius, von dem er anderswo sagt, daß er in der *Opora* aufgehe**). Dies ist zugleich die einzige Homerische Stelle, wo eine der Erscheinungen erwähnt wird, von denen hier die Rede ist.

Aristoteles und Theophrast gedenken der Auf- und Untergänge der Gestirne an mehreren Stellen ihrer Werke, der erste in der Thiergeschichte, den Büchern von den Meteoron und den Problemen, der andere in seinen meteorologischen und botanischen Schriften. Sie bedienen sich der Ausdrücke περὶ κυνός oder ὑπὸ τὸ ἄστρον, zur Zeit des Hundes oder des Gestirns, um den Frühaufgang des Sirius zu bezeichnen, der den Griechen allein wichtig war, indem der Spätaufgang und die beyden Untergänge auf Jahreszeiten von minder ausgezeichnetem Charakter trafen. Aehnliche Ausdrücke von den Plejaden gebraucht deuten allemahl auf den Frühauf- und Untergang, welche bey der Eintheilung des Jahres berücksichtigt wurden. Der Zusammenhang oder die beygesetzte Jahreszeit (beyde Erscheinungen lagen um sechs Monate auseinander) geben gewöhnlich zu erkennen, ob vom Auf- oder Untergange die Rede ist. Gleiche Bewandniss hat es mit den beyden Aufgängen des Arctur. Wenn diese Schriftsteller von den Stürmen ἐπὶ Ὀρίωνος, zur Zeit des Orion, sprechen ***), so verstehen sie diejeni-

gen,

*) Il. ε, 5.

**) Il. χ, 29.

***) Aristot. Problem. XXVI, 14. Theophr. de ventis p. 414.

gen, welche im griechischen und römischen Klima zur Zeit des Frühaufganges des Orion bald nach der Sommer-Sonnenwende, und des Frühunterganges in der letzten Hälfte des Novembers einzutreffen pflegen. Der Sprachgebrauch der Griechen hatte sich bey jedem einzelnen Gestirn aufs bestimmteste gebildet.

Mit den wenigen bisher erwähnten Fixstern-Erscheinungen, wodurch sich die Hauptepochen des Jahres kenntlich machten, scheinen sich die griechischen Landleute und Schifffahrer lange beholfen zu haben. Dafs ein jeder, dem es um dergleichen Signale zu thun war, den Himmel selbst befragt haben werde, läfst sich um so eher erwarten, da jene Volksklassen ihre Zeit meistens im Freyen zubringen. Einen eigentlichen Kalender, der die unmittelbare Beobachtung überflüssig machen konnte, lieferte zuerst *Meton*, einer der Hauptverbesserer der griechischen Zeitrechnung, von deren frühern Beschaffenheit hier ein paar Worte gesagt werden müssen.

Die Griechen gaben ihren Monaten ursprünglich in der Regel 30 Tage, wie die alte schon beym *Hesiodus* vorkommende Benennung Τριανὰς des letzten Monatstages lehrt, und führten durch Ausmerzung einzelner Tage und Einschaltung eines ganzen Monats die Anfänge der Monate zur ersten Mondphase und die des Jahrs zur Sommer-Sonnenwende zurück, so oft die Abweichung merklich ward. Dies geschah anfangs ohne Zweifel sehr willkührlich, da es lange an den dazu nöthigen genauern Kenntnissen des Mond- und Sonnenlaufes gebrach. Den ersten wesentlichen Schritt zur Verbesserung der Zeitrechnung that

that *Solon* dadurch, daß er die Monate abwechselnd voll und hohl, oder zu 30 und zu 29 Tagen, zu zählen gebot. Das Mondjahr war nun geordnet, und es blieb nur noch zu wünschen übrig, daß eine feste Regel zur Ausgleichung desselben mit dem Sonnenjahr, oder ein *Cyclus* von ganzen Jahren gefunden werde, der zugleich eine ganze Zahl von Monaten in sich begriff.

Einen solchen stellte *Cleostratus* aus *Tenedos* etwa hundert Jahre nach *Solon* auf. Ihm scheint nämlich die ursprüngliche *Octaeteris* der Griechen beygelegt werden zu müssen, welche, in einem Zeitraum von acht Sonnenjahren zu $365\frac{1}{4}$ Tagen, 96 voll und hohl gezählte Monate und drey eingeschaltete zu 30 Tagen enthielt. Sie stimmte mit der Sonne sehr gut überein, war aber in Vergleichung mit dem Monde um anderthalb Tage zu kurz, so daß Verbesserungen nöthig waren, mit denen sich bey erweiterter Kenntniß des Sonnen- und Mondlaufs *Dositheus*, *Eudoxus*, *Eratosthenes* und vielleicht noch andere beschäftigt haben.

Unterdessen machte der Athener *Meton* die Entdeckung, daß 235 Mondenmonate bis auf einen geringen Unterschied 19 Sonnenjahre geben. Dem gemäß konstruirte er einen neunzehnjährigen *Cyclus* — *ἑννεκάκαιεταετηρίς* — von 6940 Tagen, die er so geschickt in Monate zu theilen wußte, daß diese im Verlauf des ganzen Zeitraumes mit den Mondwechseln übereinstimmten. Welche Grundsätze er dabey befolgt habe, würde hier zu entwickeln nicht der Ort seyn, wenn wir auch vollständiger davon unterrichtet wären, als wir es leider sind. Ich bemerke

also

also nur, daß er das Jahr 432 vor unserer Zeitrechnung zum ersten seines Cyclus und zum Anfang desselben den Neumond machte, welcher der Sommer-Sonnenwende zunächst folgte.

Mit diesem Cyclus nun verband er einen *neunzehnjährigen Kalender*, dessen Einrichtung folgende gewesen seyn muß: Den attischen Monaten, deren Dauer seiner Theorie nach veränderlich war, standen die Feste und zugleich die Sonnenwenden, Nachtgleichen und die Fixstern-Erscheinungen beygeschrieben, an die man die Anfänge der Jahreszeiten knüpfte. Daß diese astronomischen Notizen in jedem Jahre eine andere Stelle in den ihnen entsprechenden Monaten erhalten mußten, und erst immer wieder durch den Schaltmonat in die ursprüngliche Gegend zurückgeführt wurden, folgt aus der Natur des Mondjahrs, das um 11 Tage kürzer ist, als das Sonnenjahr.

Mit jenen Fixstern-Erscheinungen begnügte sich jedoch *Meton* nicht. Er fügte ihnen die Auf- und Untergänge vieler anderer ausgezeichneten Sterne bey, neben welchen er zugleich die Winde und Wechsel der Witterung — *επισημασιαι* —, womit sie im Clima Athens der Regel nach begleitet sind, bemerkte. Nach *Theophrast* *) waren es *Cleostratus*, *Matricetas* und *Meton's* Lehrer *Phainus*, die dergleichen meteorologische Beobachtungen zuerst angestellt hatten, welche von nun an in keinem griechischen Kalender fehlen durften.

Dieser auf 19 Jahre gestellte, aber der Absicht seines Urhebers nach immerwährende Kalender wurde
in

*) *De signis pluviarum* l. c.

in Griechenland mit großem Beyfall aufgenommen. „*Meton*, heist es bey *Diodor* *), ist in Verkündigung der Erscheinungen der Sterne überaus glücklich gewesen; denn sie bewegen sich übereinstimmig mit seinen Angaben, und führen die angezeigten Veränderungen der Witterung herbey. Deshalb bedienen sich auch bis auf unsere Zeiten die meisten Griechen der *Ευσεχαιδεκαστης*, und verfehlen dabey die Wahrheit nicht.“ Die Alten sprechen von mehreren Steinen, auf die dieser Kalender aufgetragen war, und vielleicht ist man einst bey noch genauerer Durchsuchung des klassischen Bodens so glücklich, ein solches Monument zu finden, welches eine bedeutende Lücke in unserer chronologischen Kenntniß ausfüllen würde. Ueberhaupt war es die Gewohnheit der griechischen Astronomen, ihre Kalender auf Tafeln oder Säulen an öffentlichen Orten zur Einsicht des Publicum aufzustellen, weshalb sie ihnen auch den Namen *παράτηματα*, *Ausstellungen*, beylegen.

Meton's *Cyclus* von 6940 ganzen Tagen war in Ansehung der Sonne sowohl als des Mondes um mehrere Stunden zu lang. Er mußte sich daher allmählig verschieben, auf eine besonders am Monde leicht zu entdeckende Weise. *Callippus* aus *Cyzicus*, welcher hundert Jahre später lebte, schlug daher vor, ihn bey jeder vierten Wiederholung um einen Tag zu verkürzen. wodurch er ihn in eine sehr genaue Uebereinstimmung mit dem Himmel brachte. Zugleich änderte er den *Meton'schen* Kalender dahin ab, daß er grossentheils die wahren Auf- und Untergänge der Sterne, die ein Gegenstand bloßer Berechnung

*) Buch XII. S. 501 (*Wesseling*),

Berechnung sind, an die Stelle der *scheinbaren* setzte. Astrologische Grübeleien mochten ihn dazu veranlasst haben. Man kam nämlich bald dahin, die Veränderungen der Witterung, womit die Erscheinungen der Fixsterne sich gewöhnlich begleitet zeigten, als eine Wirkung derselben zu betrachten, ein Vorurtheil, gegen welches schon mehrere aufgeklärte Alte geeifert haben *). Wer davon angesteckt war, mußte natürlich die Conjunctionen und Oppositionen, in die die Sterne bey ihren wahren Auf- und Untergängen mit der Sonne treten, für wirksamer halten, als die nahen Zusammenkünfte bey den scheinbaren, also lieber jene in Rechnung ziehen wollen, als diese, zumal da man bey dem Gebrauch der Kalender der unmittelbaren Beobachtung des Himmels überhoben seyn konnte. Auch kann die Unbestimmtheit des Sehungsbogens, der für das scharfe Auge ein ganz anderer ist als für das schwache, Veranlassung zu dieser Neuerung des *Callippus* gegeben haben, welche übrigens im Alterthum wenig Beyfall gefunden zu haben scheint; denn es waren hauptsächlich *Meton's* und *Eudoxus Parapegmen*, welche sich in Ansehen erhielten.

Das letztere ist vermuthlich auf die *Octaëteris* gegründet gewesen, über die *Eudoxus* nach *Diogenes Laërtius* und *Suidas* geschrieben hat. Nach *Plinius* Versicherung **) nahm er einen vierjährigen Kreislauf der Witterung an. Vielleicht umfasste also sein Kalender auch nur einen vierjährigen Zeitraum, in welchem Fall wir annehmen müssen, daß er ihn ohne

*) Besonders *Geminus* im vierzehnten Capitel seiner *Isagoge*.

**) H. N. II. Sect. 48.

ohne Rücksicht auf die Mondwechsel an das bloße Sonnenjahr geknüpft hatte; denn eine vierjährige Ausgleichung des Sonnen- und Mondlaufs findet nicht Statt.

Er würde nicht der einzige gewesen seyn, der diesen Weg betrat. Denn da in Griechenland nicht überall einerlei Monatsnamen, Jahrenfänge und Schaltmethoden gebräuchlich waren, so kamen die griechischen Astronomen bald auf den Gedanken, ihre Kalender unmittelbar an den Sonnenlauf zu reihen; und da es ihrer Sprache an eignen Namen für die Monate eines Sonnenjahres gebrach, so bildeten sie dergleichen aus den Benennungen der Zeichen der Ecliptik. *Ptolemäus* hat uns verschiedene astronomische Beobachtungen aufbewahrt, die an die Monate *Ταυρῶν*, *Διδυμῶν*, *Λεοντῶν* u. a. m. geknüpft sind, welche, wie man sieht, dieses Gepräge tragen. War nun im *Parapegma* die Zahl der Tage bemerkt, welche die Sonne in jedem Zeichen zubringt, so durfte man nur durch eigne Ansicht des Himmels den Tag irgend eines darin angegebenen Auf- und Unterganges auszumitteln suchen, um durch Weiterzählen ohne alle fernere Beobachtung zu jeder andern Epoche zu gelangen.

Es ist noch ein solcher ganz astronomischer Kalender aus dem griechischen Alterthum vorhanden. Er findet sich zusammengetragen aus den *Parapegmen* des *Meton*, *Euctemon*, *Democritus*, *Dositheus*, *Callippus* und *Eudoxus* in des *Geminus* Einleitung zum *Aratus*, einem schätzbaren Lehrbuch der Cosmographie aus dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die Nachtgleichen, Sonnen-

nenwenden und Fixstern-Erscheinungen, mit einigen Witterungs-Anzeigen begleitet, sind hier an die Tage gereiht, die die Sonne in den verschiedenen Zeichen der Ecliptik zu bringt, deren Namen geradezu die Stelle der Monate vertreten. Diese Tafel ist für uns von großem Werth, weil wir ohne sie von den Beobachtungen jener Männer fast gar nicht unterrichtet seyn würden.

Von ganz anderer Beschaffenheit ist ein zweyter von den Griechen auf uns gekommener Kalender, welcher den Titel *Φάσεις ἀπλανῶν*, *Erscheinungen der Fixsterne*, führt. In ihm hat sein Verfasser *Ptolemäus* die Auf- und Untergänge der ausgezeichneten Sterne nicht nach den zum Theil unsichern Beobachtungen früherer Astronomen, sondern nach eigenen Berechnungen für fünf Parallelen angesetzt, von denen der südlichste durch *Syene* in Ober-Aegypten und der nördlichste durch den *Pontus* geht, und damit die Wechsel der Witterung nach den Wahrnehmungen des *Meton*, *Euctemon*, *Democritus*, *Eudoxus*, *Callippus*, *Hipparchus*, *Cäsar* und anderer verbunden. Das Ganze ist an die Monate des festen alexandrinischen Jahres geknüpft. *)

So viel vom Kalenderwesen der *Griechen*! Erst mit dem Uebergange zur christlichen Religion nahmen sie das julianische Jahr und mit ihm den römischen Kalender an, der damals bereits eine der heutigen ganz analoge Gestalt gewonnen hatte. Der

Meton's.

*) Abgedruckt in des *Petavius Uranologium*, wo sich auch die bis jetzt beste Ausgabe der *Isagoge* des *Geminus* findet, der eine neue Bearbeitung sehr zu wünschen wäre.

Meton'sche Cyclus war unterdessen die Grundlage der neuern jüdischen Zeitrechnung, geworden, so wie er es ein paar Jahrhunderte später von der christlichen Festrechnung ward.

Die Römer hatten vor *Julius Cäsar* ein Jahr von 355 Tagen, das man sehr uneigentlich deshalb ein *Mondjahr* nennt, weil seine Dauer nach dem Monde bestimmt war, der in 354 Tagen und etwa neun Stunden zwölfmal sein Licht erneuert. Denn wenn das bürgerliche Jahr eines Volks dieses Prädicat mit Recht führen soll, so müssen die einzelnen Monate nach dem Monde abgemessen seyn, was bey den Römern keinesweges der Fall war. Ueberdies schalteten sie, um ihr Jahr mit der Sonne in Uebereinkimmung zu bringen, ein Jahr ums andere einen Monat abwechselnd von 22 und 23 Tagen ein, welches Verfahren mit der Mondrechnung ganz unverträglich ist.

Livius (spricht *) von einer vier und zwanzigjährigen Schaltperiode, nach deren Umlauf sich das alte römische Jahr vollkommen mit der Sonne ausgeglichen haben soll. *Macrobius*, der diese Nachricht bestätigt**), fügt hinzu, daß man alle 24 Jahr eben so viele Tage ausgemerzt habe, welche bey jener Einschaltung, wenn sie nie unterbrochen worden wäre, zu viel gerechnet seyn würden. Dadurch erhielt die Periode 8766 Tage oder gerade 24 julianische Jahre, so daß sie den Anfang des bürgerlichen Jahres zu demselben Tage des julianischen, und die Monatstage zu denselben Fixstern-Erscheinungen

*) I. 19.

**) Saturn. I. 12.

nungen zurückführte, von welchen sie 24 Jahre früher ausgegangen waren.

So vollkommen aber auch die Theorie seyn mochte, so mangelhaft war ihre Anwendung. Die Pontifices, denen die Anordnung des Kalenders oblag, gebrauchten ihn als ein Werkzeug zur Begünstigung oder Bedrückung bald dieses Consuls, bald jenes Generalpächters. "Sie allein, sagt *Plutarch* *), wußten um die Zeit. Plötzlich, und ohne daß es jemand abnte, schoben sie den Schaltmonat ein." Dadurch gerieth das Jahr in solche Verwirrung, daß der Anfang desselben aus seiner ursprünglichen Gegend, der Bruma, allmählig bis in die Nähe der Herbst-Nachtleiche zurückwich.

Bey dieser Unordnung in der Zeitrechnung, von der die Geschichte keines andern kultivirten Volks ein Beyspiel aufstellt, sahen sich alle diejenigen, denen die Erkennung und richtige Beachtung der Jahreszeiten ein Bedürfnis war, genöthigt, sich nach den Auf- und Untergängen der Gestirne zu richten. Wir sehen aus *Columella* **), daß die alten Kalender des *Meton* und *Eudoxus* noch zu seiner Zeit den römischen Landleuten ganz geläufig waren. Den Weg, den diese anfangs aus Noth betreten hatten, schlugen nachmals, auch da der Noth längst abgeholfen war, die Schriftsteller über Landbau, Heilkunde und andere Gegenstände mehr ein. Besonders häufig aber spielen die römischen Dichter auf die jährlichen Auf- und Untergänge der Sterne an; die
man

*) *Vita Caesaris* p. 735, D.

**) R. R. IX, 14.

man daher zum Unterschiede von den täglichen unschicklich genug die *poetischen* genannt hat.

Julius Cäsar unterzog sich als Pontifex maximus, welche Würde er in seinen letztern Jahren unter den höchsten im Staate bekleidete, dem wohlthätigen Geschäft einer Kalender-Reform. Mit Hülfe des alexandrinischen Mathematikers *Sofigenes* traf er folgende Einrichtung: Er gab dem Jahre 708 der Stadt oder 46 vor unserer Zeitrechnung 445 Tage, um den 1. Januar in die Gegend der Bruma zurückzuführen *), vermehrte die Zahl der Tage des Jahrs um 10, und setzte an die Stelle des Schaltmonats, der bis dahin zwischen den 23. und 24. Februar eingeschoben worden war, einen alle vier Jahre wiederkehrenden Schalttag. Dadurch wurde das römische Jahr zu einem Sonnenjahr von $365\frac{1}{4}$ Tagen, dessen Dauer und Form, eine vom Papste *Gregor XIII.* eingeführte Modification in der Einschaltung abgerechnet, sich bis auf unsere Zeit erhalten hat.

Der Character dieses Jahres machte die Angaben der Auf- und Untergänge der Gestirne ganz entbehrlich. *Cäsar* vernachlässigte sie indessen nicht, vermuthlich um die Römer mit den Tagen bekannt zu machen, die den Erscheinungen, nach welchen sie sich so lange gerichtet hatten, entsprachen. Auch die Witterungs-Anzeigen, an die sie durch die griechischen Parapegmen gewöhnt waren, nahm er in seinen

*) Nicht mit der Bruma selbst, sondern mit dem Neumonde, der ihr zunächst folgte, fing er sein erstes rectificirtes Jahr an. S. *historische Untersuchungen über die astronomischen Beobachtungen der Alten* S. 368.

seinen Kalender auf. Es ist sehr zu bedauern, daß sich die astronomische Partie desselben bey keinem alten Schriftsteller vollständig und im Zusammenhange erhalten hat *), auch durch kein altes Denkmal der Nachwelt überliefert worden ist, obgleich mehrere Kalender aus den ersten Zeiten der Reform auf Marmor vorhanden sind. Ich mache nur auf zwey aufmerksam, die sich in *Gruter's* Sammlung alter Inschriften finden **). Der erste gewährt eine Uebersicht der römischen Feste. Das Jahr ist vom 1. Januar an in seine *Nundinas* getheilt, deren Tage mit den immer wiederkehrenden acht ersten Buchstaben des Alphabets bezeichnet sind. Die Buchstaben C, F, N, die neben den Monatstagen stehen, deuten die *dies comitiales*, *fasti* und *nefasti* an. Neben den römischen Festen finden sich ein Paar die Regierung *August's* betreffende historische Notizen. Der andere giebt in den zwölf Monats-Columnen die Dauer eines jeden Monats, die Stelle der *Nonae*, von der bekanntlich im römischen Kalender die Benennungen der einzelnen Monatstage abhiengen, die jedesmalige Länge des Tages und der Nacht, das Zeichen der Sonne, den Namen des Gottes, dem der Monat geweiht war, und die Hauptbeschäftigungen des Landmanns an.

Wenn aber auch *Cäsar's* astronomischer Kalender nicht mehr vollständig vorhanden ist, so finden
sich

*) Sie ist, wie es scheint, zugleich mit seiner griechischen Schrift *de astris* untergegangen, die *Plinius* unter den bey seinem achtzehnten Buche gebrauchten Quellen nennt. Auch *Macrobius* erwähnt ihrer. *Sat.* I. 16.

**) P. 133 und 138.

sich doch so viele Bruchstücke davon bey *Varro*, bey dem ältern *Plinius* und *Columella*, daß wir das Wesen desselben hinlänglich kennen. Diese Schriftsteller geben nämlich einen Ruralkalender, ich meine eine Darstellung der vornehmsten im Verlaufe des Jahrs zu verrichtenden Geschäfte des Landmanns*), und legen dabey die neugeordnete Zeitrechnung zum Grunde. Aus ihnen ersehen wir, daß *Cäsar's* Jahr in acht Zeiten zerfiel, denen eben so viele gleiche Theile der Sonnenbahn angehörten. Die Einschnitte wurden durch die Nachtgleichen und Sonnenwenden bestimmt, hätten also eigentlich den Anfängen des Widders, Krebses, der Waage und des Steinbocks, so wie den Mitten des Stiers, Löwen, Scorpions und Wassermanns entsprechen sollen; allein *Cäsar* setzte die Nachtgleichen und Sonnenwenden auf die achten Grade ihrer Zeichen**), nicht etwa diese Punkte um acht Grade von ihren wahren Stellen östlich, sondern die Anfänge der Zeichen um eben so viele Grade westlich schiebend. Dadurch wurden die vier übrigen Einschnitte aus den funfzehnten Graden ihrer Zeichen in die drey und zwanzigsten gerückt, und es ergaben sich für die Anfänge der acht Jahrszeiten nach seiner Rechnung folgende Monatstage: Für den Anfang des Frühlings oder den *Favonius*, wie die Römer diesen Zeitpunkt von den ihn gewöhnlich begleitenden lauen Westwinden nannten, der

*) *Varro* R. R. I, 28. *Plinius* H. N. XVIII, c. 25 ff. *Columella* R. R. XI, 2.

**) Nach dem Vorgange des *Meton* und *Eudoxus*, von denen es *Columella* versichert. R. R. IX, 14.

der 7. Februar, für die Frühlings-Nachtgliche der 24. März, für den Anfang des Sommers der 9. Mai, für die Sommer-Sonnenwende der 26. Junius, für den Anfang des Herbstes der 11. August, für die Herbst-Nachtgliche der 26. September, für den Anfang des Winters der 10. November, und für die Winter-Sonnenwende oder *Bruma* der 24. December*).

Die Intervalle zwischen den Nachtgleichen und Sonnenwenden stimmen hier ganz mit der Hipparchischen Theorie des Sonnenlaufes überein. Eben so wenig, wie *Cäsar* und sein Gehülfe *Sofigenes* in diesem Puncte von eigenen Forschungen ausgegangen sind, scheinen sie auch die Auf- und Untergänge der Sterne nach eigenen Beobachtungen angesetzt zu haben. Bey näherer Untersuchung findet sich nämlich, daß die meisten Data von Fixstern Erscheinungen, die von den römischen Schriftstellern erwähnt werden, und wol zunächst aus *Cäsar's* Kalender entlehnt waren, auf ein früheres Zeitalter und einen südlichern Parallel passen, also aus alten griechischen Kalendern geflossen seyn müssen**).

So

*) Die Data der Frühlings - Nachtgleiche und der Sommer - und Winter - Sonnenwende sind nach unsern Tafeln um eine Einheit zu vermindern.

**) *Lalande* sagt (*Astronomie* Tom. II. p. 272), man müsse bey Berechnung der Auf- und Untergänge der Sterne 38° von ihren Längen im Jahr 1770 abziehen, um Resultate zu erhalten, die mit den Angaben des *Ovid*, *Plinius* und anderer Römer übereinstimmten. Auf diese Weise gelangt man zur Zeit des *Hesiodus* und noch darüber

So knüpfte Cäsar, wie wir aus *Varro* ersehen, den Anfang des Sommers, der seiner Eintheilung des Jahres nach auf den 9. Mai traf, nach griechischer Gewohnheit zugleich an den Frühaufgang der Plejaden, ungeachtet dieser zu seiner Zeit und unter der Polhöhe Roms erst am 22. Mai erfolgte.

Die feste Jahrform, die dem julianischen Kalender zum Grunde lag, entwöhnte die Landleute allmählig von der Beachtung der Auf- und Untergänge der Gestirne. *Columella*, der am Ende des ersten Jahrhunderts der Reform schrieb, hielt es noch für nöthig, überall neben den Monatstagen die zugleich eintreffenden Fixstern-Erscheinungen zu erwähnen, dahingegen der etwa hundert Jahre später lebende *Palladius* seinen Rural-Kalender bloß an die Montage geknüpft hat.

Nachschrift.

Während das Vorstehende geschrieben wurde, sind Herrn *Mollweide's Commentationes mathematico-philologicae* erschienen. Diese Sammlung, die allen Alterthumsforschern und Mathematikern, besonders aber solchen, die beydes zugleich sind, ein sehr schätzbares Geschenk seyn wird, enthält unter andern eine Abhandlung *de Pisce quem occidens Ple-*

über hinaus. Es ist aber nicht nöthig, weiter als bis auf das Zeitalter des *Meton* zurück zu gehen, und man wird in den meisten Fällen hinlänglich übereinstimmende Resultate finden, wenn man die Längen der Sterne um 30 bis 31° vermindert, und die Rechnung für den Parallel von 38° anstellt.

Pleias fugit, ad explicandum locum in Virgilio Georg. IV. 231–235, worin eine neue Erklärung einer Stelle versucht wird, die von jeher die Ausleger beunruhigt hat, und von *Petau* geradehin *inextricabilis* genannt wird. Sie lautet, von der Gewinnung des Honigs handelnd, also;

*Bis gravidos cogunt fetus, duo tempora messis;
Taygete simul os terris ostendit honestum
Plejas, et Oceani spretos pede reppulit amnes,
Aut eadem sidus fugiens ubi Piscis aquosus
Tristior hibernas coelo descendit in undas,*

Es ist klar, daß der Dichter als die für die Einsammlung des Honigs schicklichen Zeiten den Fröh- und Untergang der Plejaden angiebt, eben jene Zeiten, die so häufig von den Alten als Hauptepochen für die Geschäfte des Feldbaues und der Schifffahrt genannt werden. Die Schwierigkeit liegt bloß in dem Verhältniß, worin man sich die untergehenden Plejaden zu dem *piscis aquosus* zu denken hat. Herr *Mollweide* versteht den südlichen Fisch — *piscis notius* — indem er die Flucht der Plejaden vor demselben dahin erklärt, daß jene in eben der Jahreszeit des Morgens untergehen, wo dieser des Abends aufgeht. So gelehrt und scharfsinnig aber auch seine Hypothese durchgeführt ist, so fürchte ich doch, daß sie keine strenge Prüfung aushalten wird. Meine Bedenklichkeiten sind folgende:

Es ist zuvörderst hart, bey jenem Verhältniß beyder Gestirne das eine vor dem andern sich als fliehend vorstellen zu sollen. *Hesiodus* sagt allerdings sehr treffend, daß die Plejaden vor dem Orion fliehen,

fliehen, der unmittelbar nach ihnen untergeht, und *Aratus* eben so treffend, daß der Hase bey der täglichen Bewegung stets vom Hunde verfolgt wird, und daß der aufgehende Scorpion den untergehenden Orion, den er einst auf Befehl der Diana tödtete, unter den Horizont scheucht. In welcher Beziehung könnte aber wol von den untergehenden Plejaden gesagt werden, daß sie vor dem zu einer ganz andern Tageszeit aufgehenden südlichen Fisch flöhen? Die Parallelstelle, die Herr *Mollweide* aus dem *Virgil* anführt:

*Caridius auratis aperit quum cornibus annum
Taurus, et adverso cedens Canis occidit astro,*

Georg. I. 217.

sagt meines Erachtens das nicht, was er in sie legt. Er glaubt nämlich, daß der Dichter den Frühaufgang der im Stier stehenden Plejaden, an den die Alten den Anfang des Sommers knüpften, und den nicht viel früher im Jahr erfolgenden Spätuntergang des Hundes gemeint habe. Der Dichter will aber schwerlich weiter etwas sagen, als: "wann die Sonne in den Stier tritt und zugleich der Hund sich in ihren Strahlen verliert," welche himmlische Ereignisse zu seiner Zeit und unter seinem Parallel in der That beynahe gleichzeitig waren. Wegen des *adverso cedens astro* verweise ich auf *Vossens* Erklärung, die mir ganz genügend scheint, und füge nur noch hinzu, daß von dem rückwärts aufgehenden und sich zum Horizont niederduckenden Stier meines Bedünkens ganz unschicklich gesagt werden würde, daß er mit seinen Hörnern das Jahr eröffne. Auch

Auch stehen ja die Plejaden nicht an seinen Hörnern, vielmehr werden sie von den Römern öfters *cauda Tauri* genannt.

Zweytens traten nicht einmal der Spätaufgang des südlichen Fisches und der Frühuntergang der Plejaden in gleichen Zeiten des Jahres ein. Nach einer mit aller Schärfe geführten Rechnung erfolgte unter der Polhöhe und zur Zeit des Dichters der scheinbare Spätaufgang des *Fomalhaut* bey einem Sehungsbogen von 12 Grad am 30. August, der wahre am 30. September*), der wahre Frühuntergang der Plejaden am 29. October und der scheinbare am 14. November. Vergleichen wir also den scheinbaren Aufgang des Fisches mit dem scheinbaren Untergange der Plejaden, die der Dichter bey seiner bildlichen Zusammenstellung beyder Gestirne doch wol nur gemeint haben könnte, so ergiebt sich ein Unterschied von dritthalb Monaten, bey welchem das Fischen des einen Gestirns vor dem andern

*) Herr *Mollweide* findet den 8. October. Die bedeutende Verschiedenheit dieser beyden Resultate liegt wol hauptsächlich in unserer verschiedenen Annahme des Elements der Breite. Er setzt sie mit *Ptolemäus* auf 23 Grad. Allein bey dieser Zahl ist offenbar ein Beobachtungs- oder Schreibfehler im Spiel. Denn da die Breite nach unsern Sterntafeln nur $21^{\circ} 4'$ beträgt, so konnte sie, ihre Variation seit *Ptolemäus* möglichst hoch angeschlagen, damals doch nur wenige Minuten anders ausfallen. Eine Vergrößerung der Breite um 2° muß aber bey der schiefen Lage der Ecliptik am Westhorizont in der Gegend der Herbstnachtgleiche den Untergangspunct um einen ansehnlichen Bogen verschieben.

andern völlig unbegreiflich wird. Nicht im *Osthorizont* stand der südliche Fisch am Abend zu der Zeit, wann die Plejaden den Westhorizont am Morgen erreichten, sondern im *Meridian*.

Drittens zweifle ich sehr, daß der südliche Fisch zu den Gestirnen gehöre, die eine Hauptrolle in den Parapegmen der Alten gespielt haben. Mir ist keine Stelle eines alten Dichters oder Schriftstellers über landwirthschaftliche Gegenstände bekannt, wo von den Erscheinungen desselben die Rede wäre. Er stand für die Griechen und Römer um 9 bis 10 Grade weiter vom Aequator entfernt, als für uns, und zeigte sich ihnen daher nur niedrig und immer nur auf kurze Zeit, den letztern bey einer Mittagshöhe von 9 Grad nur etwa 7 Stunden. Er konnte also dem großen Publicum, für welches die Parapegmen bestimmt waren, nicht geläufig werden.

Daß *Ptolemäus* in seinen *Fixstern-Erscheinungen* den Spät- und Frühaufgang dieses Gestirns an giebt, dient nicht zu einem Beweise des Gegentheils. Führt er doch auch den hellen im Fluß, den Canopus und α im Centauren auf, von welchen den Griechen die beyden ersten gar nicht und der letztere nur sehr niedrig aufgieng. Es kam ihm darauf an, für fünf angenommene Parallelen, von denen der südlichste durch *Syene* in Oberägypten gieng, die Auf- und Untergänge der ausgezeichnetsten Sterne anzugeben, und dies leistete er durch eigene Berechnung, nicht durch Sammlung der etwa vorhandenen Beobachtungen früherer Astronomen. Die aus den Parapegmen der Aegypter, der Griechen und des Cäsar entlehnten Witterungs-Anzeigen, die er
 seinem

ſeinem Kalender beyfügte, beziehen ſich nicht allemal auf die Fixſtern Erſcheinungen, neben welchen ſie ſtehen, ſondern gemeinlich nur auf die Tage des feſten ägyptiſchen Jahres, an die er das Ganze geknüpft, und auf die er die Zeiten der gebrauchten Parapegmen reducirt hat. Dieß erhellet ſchon daraus, daß er öfters die Witterung bey einer Erſcheinung, die unter dem Parallel von 15 Stunden erfolgte, nach den *Aegyptern*, und bey einer andern, die für den Parallel von 13 Stunden gehört, nach *Callippus* und *Cäſar* anſetzt. Wenn er alſo neben den beyden Aufgängen des ſüdlichen Fiſches meteorologiſche Wahrnehmungen des *Hipparchus*, *Dofitheus* und *Cäſar* anführt, ſo folgt daraus gerade nicht, daß in den Kalendern dieſer Männer an denſelben Tagen dieſelben Aufgänge bemerkt ſtanden.

Nach dem bisherigen ſehe ich mich genöthigt zu wiederholen, was einſt *Muſonius* über dieſe bereits von *Servius* aufgeſtellte Hypotheſe geurtheilt hat: *Sane mihi haec interpretatio ingenioſa videtur, ſed parum vera.*

Wenn man nicht ein grobes Verſehen bey einem der correcteſten Dichter des Alterthums annehmen will, ſo kann ich mich bey keiner andern Auskunft beruhigen, als bey der von *Coſtard* vorgeschlagenen*), ich meine, daß man lieſt:

Aut eadem ſidus fugiens Orionis aquoſi,

wo denn ſtatt des hinwegfallenden *ubi* das *ſimul* aus dem Vorhergehenden eben ſo gut hinzugedacht wird. Es iſt ſehr bekannt, daß Orion den Alten für ein Sturm

*) *History of Astronomy* p. 90.

Sturm und Regen bringendes Gestirn galt. *Virgil* giebt ihm das Epithet *nimbofus* :

Quum subito assurgens fluctu nimbofus Orion,
Aen. I. 535.

ja einmahl eben dasselbe, welches er in unserer Stelle der *Georgica* gebraucht :

Dum pelago desaevit hiems et aquosus Orion,
Aen. IV. 52.

Wie passend von den untergehenden Plejaden gesagt werde, daß sie den Orion fliehen, lehrt ein Blick auf die Himmelskugel. *Costard* führt als Parallelstelle folgende Verse des *Quintus Smyrnaeus* an :

Πληιάς εὐτ' ἀνάμαντος ἐς ὠκεανοιο ῥέεθρα
Δύσθ', ἐποπτώσσοις περιλυτὴν Ὀρίωνα,
V. 367.

Noch treffender hätte er folgende des *Hesiodus* citiren können, die *Virgil*, so wie *Quintus*, höchst wahrscheinlich vor Augen gehabt hat :

Εὐτ' ἂν Πληιάδες σθένο; ἐβριμον Ὀρίωνος
Φεύγεται πίπτωσιν ἐς ἡεροειδέα πόντον,
Δὴ τότε παντείων ἀνέμων θέουσιν αἴηται.
Egy. 619.

Die Möglichkeit, daß schon zu *Servius* Zeiten sich falsche Lesarten in den *Virgil* eingeschlichen haben konnten, wird man hoffentlich zugeben. Die einzige Schwierigkeit verursacht die Quantität des Wortes *Orion*, dessen beyde ersten gewöhnlich lang vorkommenden Sylben hier kurz werden würden. Wenn *Costard* sagt, daß sie auch *Quintus* in obigen

gen Versen kurz gebrauchte, so hat er sie falsch scandirt. Die Sylben finden sich aber einzeln bey guten Schriftstellern kurz, die erste bey *Virgil* selbst, in den beyden angeführten Verlen, die zweyte, wie mir Herr *Buttmann* bemerkt, bey *Euripides*. Vielleicht war es eine gewagte Neuerung, daß *Virgil* beyde Sylben zugleich kurz gebrauchte, eine Neuerung, die wol gar zur frühzeitigen Corruption der Stelle Anlaß gegeben hat, indem man sie durch den für den *Orion* gesetzten *piscis* zu berichtigen wähnte.

Herr *Buttmann*, dem ich meine ins Gebiet der Philologie streifende Nachschrift mitgetheilt habe, giebt mir die Erlaubniß, folgende Bemerkungen von seiner Hand dem Publicum mitzutheilen. Sie scheinen mir alle fernere Discussion über die in Rede stehende Stelle überflüssig zu machen.

“Ich gehe schwer daran, sehr schwer, etwas zur Unterstützung einer kritischen Mafsregel zu sagen, wodurch eine schwierige Stelle, ohne die mindeste diplomatische Spur der ehemaligen Verderbung, durch eine so auffallende Aenderung geheilt wird, als in dem vorliegenden Verse durch die von *ubi piscis* in *Orionis*. Aber ich gehe auch schwer daran, und noch schwerer, zu glauben, daß der Verfasser eines der ausgebildetesten Gedichte etwas von allen Seiten unwahres solle gesagt haben, während um ihn her alle Hülfsmittel lagen, woraus er (wenn man ihn selbst für unwissend annehmen will) wahres nehmen konnte. Und zwar etwas unwahres, wobey sich weder die Spur des wahren zeigt, das er mißverstanden haben könnte, noch irgend eine poetische Ansicht das rechtfertigte, was die Wissenschaft verleugnen muß.

Eine solche würde die *Mollweid'sche* Erklärung allenfalls gewähren. Der Begriff von Aufgang und Untergang möchte

möchte sich poetisch auch hier verbinden lassen, wenn gleich zwischen einem kosmischen Untergang und einem akronychischen Aufgang keine Correlation statt finden kann; da aber das Factum selbst, wie *Ideler* zeigt, auf schwachen Füßen steht, so kann es uns auch nicht veranlassen, nach einer so erzwungenen poetischen Ansicht zu greifen.

Eben so wenig genügt *Heyne's* Erklärung, der in dem *piscis aquosus* hier wie bey *Ovid* (*Met.* 10, 165) die Fische im Thierkreise versteht, das *fugiens* aber nicht auf den Akt des Untergehens bezogen wissen will. Als untergehendes Gestirn, meint er, fliehe allerdings der Stier die Fische nicht, sondern er folge ihnen; allein *fugiens* beziehe sich hier auf die Lage der Gestirne auf der Sphäre. Hier sey der Stier von jeher so gezeichnet, daß er das Haupt von den westlichern Gestirnen also auch von den Fischen abwende. Er fliehe sie also *stets*. So ungeschickt diese Ansicht vom Dichter gerade hier angebracht wäre, wo von dem *Untergange* die Rede ist, der uns durch das entgegengesetzte Verhältniß ganz verwirren würde, so wollten wir es doch vom Stiere selbst noch gelten lassen, wenn er genannt, und folglich sein Bild, wie es auf der Sphäre steht, in uns erweckt wäre. Aber da der Dichter die Plejas ganz personificirt und mit dem Namen *Taygete* einführt, wie kann er da verlangen, daß wir denken sollen, sie fliehe vor den Fischen, denen sie nacheilt, weil sie *in dem Stiere steht*, dessen Gestalt von den Fischen abgewandt ist?

So wäre also kein Rath, als wir müßten das, was wissenschaftlich und poetisch falsch ist, weg schaffen, und was wahr ist, dafür hinsetzen. Es ist denn doch am Ende nicht das einzige Beyspiel, wo statt der erwiesenen wahren Lesart eine ganz andere in die Abschriften gekommen ist, ohne daß man einsähe, wie sie entstanden. Ja der Vorgang des *Hesiodus* scheint die Aenderung *Orionis* gebieterisch zu fordern. Das Werk dieses Alten war vor *Virgils* Seele, als er den Landbau schrieb, niemals zugemacht. Wenn in diesem der Untergang der Plejaden als eine Flucht vor dem schrecklichen

lichen Orion dargestellt ist, wie konnte er in dies absichtlich beybehaltene schöne Bild ein anderes Gestirn ziehen, wodurch es wahr und schön zu seyn zugleich aufhörte?

Aber *Orionis* mit Verkürzung der zwey ersten Sylben, geht das? Wenn es muß, warum nicht? Zäher kann in dieser Hinsicht nichts seyn, als von jeher *Orion* war. Ὠρίων hieß er erst, und kömmt noch öfters so vor. Dann ward er dreysylbig Ὠρίων. Aber alle diese drey Sylben (von der dritten kann hier nur in der Biegung die Rede seyn), die aller Analogie nach lang sind, und auch meist so erscheinen (Hom. τὸ τε στένος Ὠρίωνος, Virg. *circumspicit Ōriona*), lassen sich demungeachtet kurz gebrauchen. Die dritte bietet uns *Ovid* mehr als Einmal so dar: — *strictumque Orionis ens*. Wollte man an der Verkürzung der ersten zweifeln, weil auf diese Art drey ursprüngliche Zeiten, *wa*, in Eine, *o*, zusammenschnupfen, so heißen *Virgil* und *Horaz* uns schweigen, welche beyde, so oft sie sie auch lang haben, doch kein Bedenken tragen, ihre Verse zu schliessen mit *aquosus Orion*, *nautis infestus Orion*. Die Mittelsylbe vollends ist durch ihre Natur schon schwankend. Diese allein kurz können wir jedoch in den Lateinern deswegen nicht nachweisen, weil das Wort so in den Hexameter nicht geht, und wir zu wenig anderes von diesen Dichtern haben. Dafür dient uns aber noch besser *Euripides* (*Ion*. 1153. *Cyclop.* 212); der längern Form Ὠρίων zu geschweigen, die das bey Griechen und Lateinern immer verkürzt. Ist nun aber die Verkürzung jeder dieser drey Sylben an sich schon, eben als Abweichung, der seltene Fall, so muß natürlich die Vereinigung zweyer solcher Verkürzungen, wie in *Ōrionis*, noch seltner seyn; und somit wäre das nur einmalige Vorkommen dieses Falles in dem Virgilischen Verse, so wie auch dessen, als einer unerhört scheinenden Freyheit, nachherige Verdrängung hinreichend begründet.

Ich habe gethan was ich konnte, und alles zusammengestellt, was eine so auffallende Aenderung empfehlen könnte.

te.

te. Allein nun muß ich als Kritiker meine Seele retten, und doch dagegen protestiren. Die Noth, welche zu dieser Emendation berechtigen könnte, ist nach meiner Uebersetzung nicht vorhanden. Unsere Astronomen haben auf *Vossens* Erklärung, vielleicht eben weil sie ihnen nicht astronomisch genug war, nicht genug geachtet. Die Plejaden, so sagt er, sind ein Sommergestirn; sie gehen unter, weil der Winter naht; sie *fliehen* also den Winter. Statt des Winters setzt der Dichter hier eines der Winterzeichen, und weil der Winter jener Gegend hauptsächlich in Regengüssen sich äußert, mit Wahl ein Gestirn, das an Wasser mahnt. Das *fugiens*, sagt *Voss*, ist also gar nicht astronomisch zu nehmen. Warum nicht? frage ich. Ist denn *fugere* ein technischer Ausdruck? Wenn an andern Stellen dies Verbum gebraucht wird von dem Untergang eines Gestirns in Beziehung auf ein anderes, das entweder ihm bald nachfolgt, oder das zur selbigen Zeit aufgeht: so sind alles das eben so gut bloß poetische und ganz willkührliche Darstellungen, und unser Dichter braucht es mit gleichem Rechte hier von dem Untergange der Plejaden, die den Anblick der wintrigen Fische gleichsam scheuend einige Zeit vorher untergehen, ehe jene erscheinen. Um es aber noch astronomischer zu machen, so denke man doch nur daran, daß die Plejaden im Stier und die Fische beyde zum Thierkreis gehören. Jedes Zeichen in diesem kann angesehen werden als jedem der übrigen folgend, und jedes der übrigen fliehend. Den jährlichen Tanz derselben eröffnen die Frühlings- und Sommerzeichen, ihn beschließen die Winterzeichen, und von diesen sind die letzten die Fische. Vor ihnen fliehen alle, namentlich die sommerlichen Plejaden."

Buttmann,

LX.

Über die
eigenen Bewegungen einiger Sterne.Von Herrn *Burckhardt*,

Mitglied des Pariser Instituts.

Die folgende Tafel enthält Resultate der Vergleichen naher Sterne, aus *Flamsteed's* Beobachtungen gezogen; sie giebt also nur *relative* nicht *absolute* Bewegungen. Nahe Sterne mußten desßwegen gewählt werden, damit die Fehler des Mauer-Quadranten und seine Lage keinen merklichen Einfluß auf das Resultat haben konnten. Diese Arbeit habe ich sehr früh angefangen bey Gelegenheit einer Mars-Opposition, die ich aus *Flamsteed* berechnen wollte, wo ein schöner Stern γ Virginis ein schlechtes Resultat wegen der eignen Bewegung gab, ein kleiner, von *Flamsteed* mehrmals beobachteter, aber nicht in sein Verzeichniß aufgenommen, Stern hingegen ein richtiges. Diese Arbeit blieb unvollendet, bis die wichtige Bemerkung des Herrn *Bessel* über die eigne Bewegung des 6ten Sterns im Schwan von Neuem meine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand lenkte. Nach diesem Stern haben der 30te der Cassiopee und der 40te des Eridanus die beträchtlichsten Bewegungen, von ungefähr 4" jährlich, auf einen größten Kreis reducirt. Die Bewegung des letztern war im vergangenen Jahre, wo ich

ich diese Tafel dem *Bureau des Longitudes* vorlegte, noch nicht bekannt, jetzt ist dies wol nicht mehr der Fall. Sie scheint mir dadurch Aufmerksamkeit zu verdienen, daß sie dem Punkte ungefähr entgegengesetzt ist, nach welchem das Sonnensystem sich nach der Hypothese einiger Astronomen bewegt; denn die gerade Aufsteigung des Sterns ist $4^{\text{u}} 6'$, und die Abweichung $8''$ südlich. Die gerade Aufsteigung nimmt jährlich um $2'',25$ ab, die südliche Abweichung wird um $3'',25$ größer.

Nro. 41 und 43 im Orion sind um $7''$ in Zeit und $93''$ in Abweichung nach *Flamsteed* verschieden. Dies stimmt mit *Piazzi*, der $6'',59$ und $92'',8$ angiebt; aber *Bradley* hat $5'',25$ und $89'',8$, er ist also um $20''$ im Bogen von den beyden erstern verschieden. Die Beobachtung allein kann entscheiden, ob dieser Unterschied von eigener Bewegung, von Parallaxe, oder davon abhängt, daß 41 Orionis ein vierfacher Stern ist.

Der 77te der Fische ist ein Doppelstern. Einer von beyden hat entweder eine starke Parallaxe oder eine außerordentliche Bewegung. *Bradley* und *Lefrançois* haben $1'',5$ Zeit für den Unterschied der geraden Aufsteigungen gefunden, zu andern Zeiten haben *d'Agelet*, *Piazzi* und *Lefrançois* $2'',5$ gefunden. Eine Parallaxe von $13''$ würde einem Theile dieser Beobachtungen Genüge thun, allein künftige Beobachtungen können allein die wahre Ursache dieser Irregularität zu erkennen geben.

Der 30te des Widders ist doppelt; Unterschied der R. $1''$ nach *Bradley*, $2'',5$ nach *Lefrançois*, $2'',96$ nach *Piazzi*. *Flamsteed* bemerkt auch, daß

er doppelt ist, und daß beyde Sterne dieselbe Höhe haben. Man kann 0,"6 für die Bewegung in *AR.* annehmen, für die Abweichung scheint die Bewegung unmerklich.

θ des Adlers ist nach *Bradley* doppelt, nach den andern Astronomen nicht. Ich habe ihn einigemal betrachtet, und einfach gesehen; allein das Wetter war nicht gut, und ich wage also nicht zu entscheiden, ob beyde Sterne jetzt einander decken.

In der folgenden Tafel enthält die erste Columnne die beyläufige gerade Aufsteigung, um die verglichenen Sterne leichter in den Catalogen aufzufinden; die zweyte enthält die Namen der verglichenen Sterne; die dritte giebt an, um wie viel der Unterschied der geraden Aufsteigung beyder Sterne jährlich in Bogen-Secunden zunimmt (— zeigt also eine Abnahme an); die vierte Columnne, um wie viel der Declinations-Unterschied jährlich zunimmt; die fünfte Columnne enthält die Anzahl der *Flamsteed'schen* Beobachtungen; wenn zwey Nummern angegeben sind, so bezieht sich die erste auf die Rectascension, die zweyte auf die Declination.

Tafel für die eignen Bewegungen
einiger Sterne:

ch	28'	α und δ Androm.	+0,"28	+0,"19	4
	51	γ und ϵ Piscium	+0, 53	+0, 14	1
	55	μ und θ Cassiop.	-5, 3	+1, 73	1
I	4	86 Piscium doppelt	0, 0	0, 0	2
	4	86 und 88 Piscium	-0, 13	0, 0	8
	14	44 und 45. θ Ceti	-0, 30	+0, 12	2
	14	37 und derselbe	-0, 15	+0, 40	3
	42	2 und 12 Triang.	-0, 10	+0, 24	3
	46	7 und 9. λ Arietis	+0, 00	+0, 00	3
	46	49 und 51 Cassiop.	0, 00	. . .	1
	48	52 und 53 Cassiop.	0, 00	0, 00	1
	52	112 und 113 Piscium	-0, 11	-0, 25	12

LX. Ueber die eignen Bewegungen einiger Sterne. 555

1 ^h	56'	9. λ und 13. α Arietis	+0,26	+0,12	4 und 7
2	2	19 und 37. σ Arietis	-0,18	0,00	2
	4	8 und 7. χ Persei	-0,35	-0,31	1
	5	8. δ und 9. γ Triang.	-1,26	-0,14	3
	5	4. β und 8. δ Triang.	+0,96	+0,20	3
	5	folglich zwischen β u. γ	-0,30	+0,06	3
	10	68. σ und 71 Ceti	+0,00	+0,20	2 und 4
	22	35 und 41 Arietis	+0,00	+0,15	3
	22	33 und 41 Arietis	+0,00	-0,12	3
	30	69 und 82. δ Ceti	+0,10	-0,00	1 und 2
	51	8. ρ^1 und 9. ρ^2 Eridani	-1	-0,3	1
	52	92. α und 93 Ceti	+0,12	+0,10	8
3	1	22. θ^1 und 57. δ Arietis	+0,00	-0,00	2
	1	23. θ und 57. δ Arietis	+0,28	+0,17	2
	1	26 und 57. δ Arietis	-0,06	+0,00	3
	1	34. μ und 57. δ Arietis	-0,08	-0,29	3
	6	13. ζ und 14 Eridani	-0,27	-0,00	1
	23	13 und 18. ϵ Eridani	+0,91	+0,17	2
	29	39. δ und 48. c Persei	+0,14	+0,00	2
	34	18. ϵ und 23. δ Eridani	+0,88	-0,67	1
	36	17 und 25. η Tauri	0,00	0,00	19
	36	25. η und 28. h Tauri	+0,19	-0,22	20
	38	27 und 28 Tauri	+0,20	-0,63	1
4	2	37 und 38. ϵ^1 Eridani	0,00	+0,09	1
	2	38. ϵ^1 und 40. d Eridani	-2,0	+3,44	2
			-2,2	+3,2	n. Bradley
	9	57 und 60 Tauri	+0,82	-0,15	1
	9	54. γ und 71 Tauri	0,00	0,00	4
	9	54. γ und 58. h Tauri	0,00	0,00	11
	12	δ^1 und δ^2 Tauri	0,00	0,00	8
	12	δ^1 und ϵ^3 Tauri	-0,05	-0,13	13
	24	82 und α Tauri	-0,27	-0,30	5
	38	96 und 101 Tauri *)	+0,20	-2,1	1
5	14	112. β und 136 Tauri	+0,03	-0,16	4
	14	22 Aurigae und 112 Tauri	+0,02	+0,20	4
	27	125 und 139 Tauri	+0,13	+0,04	2
	36	12 und 13. γ Leporis	-0,15	+0,44	1
	37	121 und 132 Tauri	-0,00	+0,11	2
	42	36. ν und 55 Orionis	-1,1	0,00	1
6	2	7. η und 13. μ Gemin.	+0,12	-0,10	82
	14	2. β und 8. ν Canis maj.	+0,09	-0,00	1
	28	6. ν^1 und 7. ν^2 Canis maj.	-0,17	+0,30	2
	32	27. ϵ und 57. A Gemin.	0,00	-0,29	4
	51	ϵ und 31. η Can. maj.	-0,76	-0,00	2
7	1	52. h und 57. A Gemin.	+0,03	-0,05	3
	1	25. δ und 28 Can. maj.	-0,04	+0,29	3
	1	25. δ und 27. c Can. maj.	-0,03	-0,09	1

*) 96 scheint - 0,5 in AR. und - 2,8 in Decl. zu haben.
101 - 0,8 - 4,9

7 ^h	22'	61. δ und 66. α Gemin.	-0, 15	-0, 29	2 und 3
	29	Procyon und 307 Mayeri	+0, 65	. . .	2
	29	Procyon u. kleiner Stern	+0, 6	. . .	1
	33	β Gemin. und 6 Cancr	+0, 99	+0, 02	1
	41	7. ξ und 15 Navis	-0, 2	+0, 12	2
	42	79 und 85. ι Gemin.	-0, 04	-0, 09	2
8	5	328 Mayeri und β Cancr	+0, 26	+0, 03	1
			-0, 02	-0, 06	n. Mayer
	32	10. μ und 43. γ Cancr	0, 00	0, 00	5
	58	77 und 79 Cancr	-0, 12	-0, 05	2 und 3
9	2	81. π und 82 Cancr	+0, 43	+0, 24	10
	18	24 und 30. α Hydrae	+0, 17	0, 00	2
	19	25. θ und 26 Urf. maj.	+1, 50	+0, 43	4
	34	17 ϵ und 22. δ Leonis	-0, 18	-0, 24	3
	50	11 Sextant. und 29. π Leon.	+0, 04	+0, 06	3
	58	18 und 32. α Leonis	-0, 11	-0, 44	4
10	6	35 und 36. ξ Leonis	+0, 35	0, 00	7 und 2
	9	40 und 41. γ Leonis	+0, 53	+0, 07	13
	50	b und 7. α Hydr. et Crat.	-0, 4	-0, 07	2
	56	9. χ^1 und χ^2 Hydrae	0, 00	0, 00	1
11	4	b und 68. δ Leonis	+0, 13	-0, 27	4
	7	75 und 76 Leonis	-0, 17	-0, 07	4
	9	76 und 79 Leonis	0, 00	-0, 05	4
	11	77. σ Leon. und 3 v Virgin.	-0, 10	-0, 85	7
	35	2 und 4 Virginis	-0, 14	+0, 06	6
	39	β und r Virginis	-0, 73	+0, 02	7
12	9	13. π und 15. η Virginis	-0, 14	-0, 04	15
	31	29. γ Virg. u. e. kleiner Stern	+0, 47	+0, 17	3
	43	38 und 44 Virginis	+0, 25	-0, 10	4
	43	38 und 48 Virginis	+0, 36	0, 00	2
	46	7. b und 43. δ Virginis	+0, 3	+0, 15	3
	46	43 δ und o Virginis	+0, 18	+0, 16	3
	58	49. g und 50 Virginis	0, 00	-0, 03	6
13	o	51. θ und 12 Virginis	0, 00	0, 00	7
	o	51. θ und 12 Virginis	0, 00	0, 00	3 und 5
	14	49. g und 67. α Virginis	-0, 15	-0, 13	4
	16	79. ζ und 80 Urf. maj.	0, 00	-0, 05	3 und 5
	45	7 und 8. η Bootis	klein	+0, 35	3
14	4	14 und 18 Bootis	+0, 36	0, 00	3
	7	17. π und 23. θ Bootis	-0, 55	-0, 4	2
	7	17. π und 21 Bootis	-0, 35	0, 0	2
	40	α^1 und α^2 Librae	+0, 018	+0, 019	23
	43	13 und 14 Librae	0, 00	0, 00	9
15	7	27. β und 37 Librae	+0, 27	+0, 24	2
	21	11. γ^1 und 13. γ^2 Urf. min.	0, 00	-0, 11	2
			0, 00	-0, 3	n. 1 Beob.
					v. LaCail.
	33	α^2 und η Librae	+0, 04	0, 00	4
	33	29. σ^1 und η Librae	-0, 07	+0, 14	2
	37	28. β und 29 Serpentis	-0, 05	-0, 21	1

LX. Ueber die eignen Bewegungen einiger Sterne. 557

15 ^h	40	32. μ und 36 Serpentis	+0, 12	-0, 09	2
	54	8. β und 14. γ Scorpii	-0, 03	-0, 00	20
16	15	20. γ^1 und 21. γ^2 Scorpii	-0, 13	-0, 06	3
17	3	29 Scorpii und 36 Ophiuchi	-0, 56	-1, 1	1
	5	32 Oph. und α Herculis	. . .	+0, 05	2
	10	42. θ und 44. b Ophiuchi	-0, 12	-0, 07	7
	10	32 Scorp. und 42. θ Oph.	+0, 07	0, 03	1
	25	54 und 55. α Ophiuchi	+0, 45	-0, 4	1
	25	55. α und 56 Ophiuchi	-0, 25	+0, 07	1
	26	691 Mayeri und 55 Serpent.	-0, 17	+0, 04	4
			-0, 15	+0, 14	11. Mayer
	38	γ und η Ophiuchi	-0, 3	+1, 0	3
	53	γ und δ Sagittae	-0, 15	+0, 25	4
18	13	107 und 108 Herculis	-0, 16	0, 00	1
	16	22. λ und 42. ψ Sagittarii	+0, 15	-0, 6	3
	51	δ und ζ Sagittarii	0, 00	. . .	3
	51	39. σ und 50 Sagittarii	-0, 14	+0, 10	52
	57	10 und ζ Aquilae	+0, 14	0, 00	2
	57	11 und ζ Aquilae	+0, 06	-0, 10	2
19	55	14 und 15 Sagittae	-0, 4	-0, 55	1
	55	7. δ und 14 Sagittae	+1, 4	. . .	1
	59	64. α^1 und 65. α^2 Draconis	unmerk.	unmerk.	
20	2	65. θ und 66 Aquilae	0, 00	-0, 04	8
	5	69 Draconis	+0, 5	. . .	
	6	α^1 und α^2 Capricorni	+0, 03	+0, 03	49
	9	β^1 und β^2 Capricorni	+0, 04	+0, 05	2 und 1
	37	2. ϵ und 7 Aquarii	-0, 1	+0, 05	2
	40	75 Draconis	0, 25	. . .	
	48	1 Equulei	0, 9	. . .	
21	1	5. γ und 6 Equulei	+0, 05	-0, 18	2
	30	40. γ und 49. δ Capricorni	-0, 05	-0, 33	28
	30	32. i und 40. γ Capricorni	+0, 07	+0, 14	12
	31	42 und 44 Capricorni	+0, 23	-0, 32	3
	31	42 und 45 Capricorni	+0, 35	-0, 30	3
	35	6 Equulei und ϵ Pegasi	-0, 07	-0, 12	2
	35	7 Equulei und ϵ Pegasi	-0, 10	-0, 44	2
	35	32 und 49. δ Capricorni	-0, 17	-0, 33	12
	42	51. μ Capric. und 33 Aquar.	-0, 29	+0, 08	10
	55	32 und 34 α Aquarii	+0, 03	+0, 03	4
22	7	43. θ und 46. ρ Aquarii	-0, 08	-0, 02	15
	37	69. τ und 71. τ^2 Aquarii	-0, 15	+0, 04	3
	44	76. δ und 77 Aquarii	+0, 08	+0, 11	4
	47	21 Aquar. und Fomalhaut	+0, 42	+0, 12	1
	47	19 Aquar. und Fomalhaut	+0, 38	+0, 28	1
	53	1 und 2 Andromedae	-0, 11	. . .	2
23	17	8 und 9 Piscium	-0, 01	0, 00	15

Ich habe in dieser Tafel auch die Vergleichenungen
beybehalten, wo sich nur eine Beobachtung bey
Flam-

Flamsteed befindet, weil dieß wenigstens dazu dient, vergebenes Nachschlagen und Auffuchen zu vermeiden.

LXI.

Auszug aus einer Abhandlung
des

Hrn. Dr. *W. Herschel*

über den großen Cometen von 1811.

Vorgelesen am 19. Decbr. 1811.

(*Beschluß.*)

Nachdem wir im vorigen Hefte unsern Lesern die Beobachtungen *Herschel's* über den großen Cometen von 1811 im Auszuge mitgetheilt haben, lassen wir nunmehr die Resultate und Ansichten folgen, auf welche der Verfasser durch sie geleitet worden ist. Wir halten es hier für zweckmäßiger, ihn bey dieser Darstellung seiner Ideen selbst reden zu lassen, und führen demnach zuerst sein *Raisonnement über die Gestalt des Cometen im Allgemeinen* an:

“Nach den Gesetzen der Schwere könnte man zwar *a priori* beweisen, daß der planetarische Körper, welcher aus der eigentlichen festen Cometenmasse besteht, sphärisch geformt sey; allein die wirkliche Beobachtung giebt dafür einen directern Beweis. Denn in keinem Theile der langen geocentrischen
Bahn

Bahn des Cometen sahlich die kleine Scheibe des planetarischen Körpers anders, als unter einer kreisförmigen Gestalt. Unmöglich würde aber dieselbe sich beständig unter dieser Form haben zeigen können, wenn sie nicht wirklich sphärisch gewesen wäre.

Wenn man sich an das erinnert, was ich früher über die runden Nebelflecke gesagt habe, so wird man nicht annehmen können, daß der Kopf des Cometen, welcher sich stets wie ein runder Nebelfleck zeigte, eine andere Form gehabt habe, als die einer Kugel. Immer beruhten meine Beweise für die sphärische Gestalt der von mir entdeckten Nebelflecke einzig und allein (obgleich mit überzeugender Gewissheit) auf der Theorie der Wahrscheinlichkeit und den bekannten Wirkungen der Schwere. Diese Nebelflecke sind aber unbeweglich, während dagegen unser Comet in der Dauer seiner Sichtbarkeit einen geocentrischen Bogen von ungefähr 90 Graden durchlief; und doch zeigte sich der Kopf desselben beständig rund. Hieraus geht also um so mehr hervor, daß er vollkommen, oder doch beynahe, die Gestalt einer Kugel gehabt habe.

Was die durchsichtige Athmosphäre des Cometen betrifft, so wird ihre wirklich sphärische Gestalt nicht allein dadurch bewiesen, daß sie während der langen Dauer der Beobachtungen niemals unter einer andern Form erschien, sondern ich habe auch schon oben aus den Beobachtungen selbst gezeigt, daß sie elastisch sey; und dieser einzige Umstand würde hinreichen, um die Kugelgestalt derselben aufser allen Zweifel zu setzen.

In

In Beziehung auf die Lichthülle, wovon die Cometen-Athmosphäre umgeben war, muß man aber eine höchst merkwürdige Eigenthümlichkeit annehmen. Es kann nämlich die Form, unter welcher sie sich stets mit ihren beyden divergirenden Zweigen zeigte, nicht wohl anders erklärt werden, als wenn man ihr die Figur eines umgekehrten hohlen Kegels zukommen läßt, welcher an seinem Scheitel von einem ebenfalls hohlen, ungefähr hemisphärischen Deckel begrenzt war. Ueberdies konnten die Seitenflächen dieses hohlen Kegels von keiner besondern Dicke seyn. — Diese Conformation der Lichthülle leite ich aus dem Umstände ab, daß dieselbe während der ganzen Reihe der Beobachtungen mit der durchsichtigen Atmosphäre überall ungefähr concentrisch erschien. Wenn aber der Theil der Lichthülle, welcher den Cometen auf der der Sonne zugekehrten Seite unter einer halbkreisförmigen Gestalt umgab, nicht wirklich hemisphärisch gewesen wäre, sondern etwa nur ein Theil eines Ringes, so wie wir es bey dem Saturn erblicken: so würde derselbe nach und nach die Gestalt eines Halbkreises verloren, und dagegen die einer geraden Linie angenommen haben, indem sich der Comet bey der Größe des geocentrischen Bogens von ungefähr 90 Graden, welchen er in der langen Periode seiner Sichtbarkeit durchlief, unter sehr verschiedenen Aspecten zeigte.

Man kann nach dem höchst schwachen Lichte und der Durchsichtigkeit des Theils der Atmosphäre, welcher von dem hemisphärischen Lichtdeckel eingeschlossen wurde, vermuthen, daß letzterer verhält-

hältnissmässig sehr dünn gewesen seyn müsse; denn wenn der Theil der Lichtmasse, welcher die Athmosphäre zunächst umgab, von einer etwas beträchtlichen Dichtigkeit gewesen wäre, so würden seine sich ausbreitenden Lichtstrahlen die Dunkelheit der Athmosphäre modificirt haben, und letztere würde also nicht durchsichtig genug geblieben seyn, um die kleinsten Sterne durchblicken zu lassen.

Es bleibt jetzt noch übrig, jenen halbkreisförmigen Streifen, von welchem die Lichthülle beständig umgeben war, zu erklären. Man sieht aber leicht, dass dieser eine nothwendige Folge von der grössern Dichtigkeit des Lichts an der äussern Oberfläche der Lichthülle war. Z. B., den 6ten Octbr. war der Halbmesser dieser äussern Oberfläche 9' 30", der innern 7' 30"; und da das stärkste Licht sich weit mehr in der Nähe der äussern Peripherie befand, so kann man 8 $\frac{1}{2}$ Minuten für den mittlern Radius annehmen. Berechnet man hiernach die wirkliche Grösse dieses Halbmessers der Lichtmasse, so wird man ihn nicht unter 248000 Meilen finden, während dagegen da, wo die Athmosphäre am dunkelsten war, derselbe nur etwa 50000 Meilen betrug. Die auf diese Art entstehende 5mal grössere Intensität des äussern Lichtes musste also nothwendig das merkwürdige Phänomen eines glänzenden Halbkreises, welcher den Cometen in der beobachteten Distanz vom Mittelpuncte umgab, hervorbringen.

Eben so ist die Entstehungsart der beyden divergirenden Lichtstreifen, welche den Schweif des Cometen begrenzten, zu erklären. Wenn man nämlich als den Ursprung derselben den kreisförmigen Rand
eines

eines hohlen hemisphärischen Deckels annimmt, so muß sich die Lichtmasse, indem sie sich von jenem Rande divergirend erhebt, in der Form eines hohlen Kegels ausbreiten. Was also von der Erscheinung der Lichthülle, insofern man sie von der Seite sah, angeführt wurde, gilt ebenfalls von dem seitwärts gesehenen Lichtkegel, welcher hiernach zwey den Schweif begrenzende helle Streifen bilden mußte.

Zieht man nun hierbey noch den Umstand in Betrachtung, daß sich die beyden divergirenden Lichtstreifen auf jeder Seite des Schweifes fortwährend in allen Theilen der geocentrischen Bahn des Cometen zeigten, so wird man behaupten können, daß die wirkliche Existenz jenes hohlen Lichtkegels rings um den Cometen-Schweif durch die Beobachtungen selbst dargethan sey.

Das schwächere Licht des Schweifs, in dem Raume zwischen den beyden Lichtstreifen, erklärt sich hinlänglich aus der geringern Dichtigkeit der Lichtmaterie des hohlen Kegels in der Nähe seiner Axe, verglichen mit dem weit stärkern Lichte an den Rändern desselben, insofern beydes seitwärts beobachtet wird. — So beweiset auf der einen Seite das schwächere Licht zwischen den beyden Streifen, und auf der andern die Durchsichtigkeit der Atmosphäre innerhalb der Lichthülle, daß diese beyden Theile des Cometen hohl waren; denn wären sie ebenfalls solid gewesen, so würde sowohl der Lichtkegel selbst, als auch seine hemisphärische Scheitelbedeckung, in der Mitte heller und glänzender erschienen seyn, als an den Rändern, wovon man aber gerade das Gegentheil beobachtet hat."

Nach.

Nachdem der Verfasser auf diese Art im Allgemeinen die physische Conformation des Cometen gehörig untersucht und ungezwungen erklärt hat, sucht er nunmehr die successiven Veränderungen zu erläutern, welche durch den *Einfluss der Sonne* in den Phänomenen hervorgebracht wurden.

„Wenn sich ein Comet seinem Perihelium nähert, so wird er immer mehr und mehr der Wirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt, von denen wir wissen, daß sie Licht, Wärme und chemische Wirkungen hervorbringen. Der Einfluss dieser Kräfte auf unsern Cometen verursachte eine Ausdehnung und Zersetzung des Cometenstoffes, so wie es die allmähliche Vergrößerung des Schweifes, und die Natur seines Lichtes, das phosphorischer Art zu seyn schien, bewiesen hat. Wir wollen jetzt sehen, wie man alle diese Wirkungen erklären kann.“

Die den Kopf des Cometen bildende Materie mußte nothwendig durch die Wirkung der Sonne sich ausdehnen, vorzüglich aber in der dem Einfluss derselben am meisten ausgesetzten Hemisphäre. Indem sich also dadurch die Materie an dieser Seite mehr anhäufte, als an der entgegengesetzten, so mußte sie dadurch in Beziehung auf den planetarischen Körper eine excentrische Lage erhalten. Weil aber der Kopf des Cometen wegen seines vorzüglichen Glanzes am meisten unser Auge auf sich zog, so mußte nothwendig der kleine planetarische Körper in der excentrischen Position erscheinen, in welcher man ihn beobachtete.

Weil man ferner nach den beobachteten Erscheinungen mit gutem Grunde annehmen kann, daß
der

der Comet von einer durchsichtigen, elastischen und sehr ausgedehnten Athmosphäre umgeben sey, so wird die nebelartige Materie, welche, so lange noch der Comet von seinem Perihelium entfernt ist, wahrscheinlich unter einer sphärischen Gestalt rings um den Kopf angehäuft bleibt, sich bey immer gröfserer Annäherung an die Sonne weiter ausdehnen, und in der Cometen-Athmosphäre bis zu einem gewissen Gleichgewichte erheben müssen, wo sie sich einige Zeit hindurch halten kann, indem sie der ununterbrochenen Wirkung der Sonne ausgesetzt bleibt. — Auf diese Art ist es möglich, dafs man die durchsichtige Athmosphäre erkennen konnte, welche sonst ohne die Suspension der Lichtmaterie vielleicht nie zum Vorschein gekommen seyn würde. Auch hat man kein Mittel, um zu erfahren, bis wie weit die durchsichtige Athmosphäre sich noch ausserhalb desjenigen Theils, der die phosphorische Substanz enthielt, forterstrecken konnte; und wegen des dunkeln durch die Athmosphäre verursachten Zwischenraums nahm die in derselben suspendirte Lichtmaterie das Ansehn einer hellglänzenden Lichthülle an.

Dieses starke Licht, und seine gelbliche Farbe, die von der des Kopfes so sehr verschieden war, und wahrscheinlich durch eine Vermischung der phosphorischen Materie mit der der Athmosphäre hervorgebracht wurde, beweisen die unaufhörliche Wirkung der Sonne auf die Lichtmaterie, selbst da sie schon so sehr zerstreut und ausgebreitet war. Und wenn wir annehmen, dafs die Verdünnung und Zersetzung dieser Materie so lange fort dauere, bis die
Bestand-

Bestandtheile derselben hinlänglich subtil geworden sind, um durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen in eine bemerkbare Bewegung gesetzt werden zu können, so werden allmählig diese Theilchen sich von der der Sonne zugekehrten Hemisphäre entfernen, und sich nach der entgegengesetzten Gegend in einer merklich divergirenden Richtung erheben.

Dafs solch eine Operation Statt gehabt haben müsse, wird evident genug, wenn man erwägt, dafs die allmählige Erhebung der Lichtmasse, und die immer mehr zunehmende Ausdehnung des Cometen-Schweifes beobachtete Facta sind. Und wenn wir die phosphorische Materie, so lange sie in der Cometen-Athmosphäre suspendirt war, in der Gestalt einer Hülle erblickten, so mußte sie nothwendig nachher, als sie sich immer mehr und mehr erhob, in der Form der beyden glänzenden Reifen erscheinen, welche während einer so langen Zeit den Schweif des Cometen eingeschlossen haben.

Nachdem sowohl die kreisförmige Gestalt der Lichtmaterie, als auch die beyden Streifen, welche durch sie gebildet wurden, erklärt sind, so begreift man leicht, warum sie nur die Form eines Kegels erhalten konnte. Denn da die eine Hemisphäre der Hülle ganz der Wirkung der Sonne ausgeleitet war, so mußte die Materie nothwendig auf allen Seiten gleichförmig in die Höhe steigen. — Die Beobachtungen zeigten auch, dafs die Lichtmaterie, welche sich in der Gestalt eines hohlen Kegels erhob, keinen Zuwachs erhielt, als nur von der der Wirkung der Sonne exponirten Hemisphäre. Denn ungeachtet des großen Umfangs des Kegels, in der Distanz
von

von 6 Graden vom Kopfe, bemerkte man doch niemals, daß das Licht daselbst vermehrt sey, obgleich der Durchmesser eines Kreis-Abschnitts des Kegels an dieser Stelle nahe an 15 Millionen Meilen betragen mußte, indess derselbe in der Nähe des Kopfes kaum eine halbe Million ausmachte.

Diese Betrachtung führt auch dahin, um sich eine Idee von der außerordentlichen Schwäche der Lichtmaterie am äußersten Ende des Schweifes zu machen. Denn wenn dieselbe gleich in der vorhin angeführten Entfernung vom Kerne noch ziemlich dicht war, so mußte sie doch daselbst schon ungefähr 524mal schwächer seyn, als bey ihrem Ursprunge; und gegen das Ende des Schweifes, wo sie kaum noch einen bemerkbaren gleichförmig vertheilten Schimmer hervorbrachte, mußte also der Grad ihrer Ausdehnung und Verdünnung ganz außerordentlich groß seyn.

Die nebelartige Materie, welche nach ihrer Aufwallung von der der Sonne zugekehrten Hemisphäre nach der Richtung des Schweifs in die Höhe gestiegen war, wurde wahrscheinlich durch neue Theilchen dieser Materie, die von der andern Hemisphäre herüberkamen, wieder ersetzt, oder auch wol durch die Wirkung der Rotation des Cometen um seine Axe. Auf diese Art fuhr wahrscheinlich die Materie fort, sich beständig zu zersetzen, um so den beobachteten Effect hervorzubringen.

Die Beobachtungen, welche nach dem Durchgange des Cometen durchs Perihelium angestellt wurden, scheinen jene Vermuthung zu begünstigen. Denn der Raum zwischen den beyden Lichtstreifen
des

des Schweifes, ganz nahe am Kopfe des Cometen, erhielt nach und nach ein immer lebhafteres und lichtvolleres Ansehen, was eine vorhin dafelbst Statt gehabte Abwesenheit der nebligten Materie anzeigte.

Eine Rotations-Bewegung des Cometen-Körpers (so wie einige sie annehmen) würde ebenfalls die häufigen Veränderungen erklären, welche in Ansehung der Länge der beyden den Schweif einschliessenden Reifen vorgiengen. Denn wenn etwa ein Theil des Cometenstoffs zu einer solchen Decomposition des Lichts geeigneter war, als ein anderer, so würde durch eine rotatorische Bewegung jener Theil in verschiedene Lagen gebracht worden seyn, und also an verschiedenen Stellen eine grössere oder geringere Lichtausströmung verursacht haben.

Die Wahrscheinlichkeit einer rotatorischen Bewegung des Cometen vermehrt sich noch durch die Beobachtung der doppelten, schwach beleuchteten und kurzen Äste, welche ihren Ursprung in dem Scheitel oder den Seiten der einige Zeit nach dem Durchgange durchs Perihelium schon ziemlich geschwächten Lichthülle zu haben schienen. Denn die sehr veränderliche Erscheinung dieser kleinen Lichtzweige konnte davon herrühren, dals zu der Zeit, wo die ganze Dunstmaterie schon beynahe gänzlich aufgelöst war, einige vielleicht weniger verdünnte Theile derselben periodisch der Wirkung der Sonne ausgesetzt wurden."

Es folgt hier in diesem zweyten Theile von *Herschel's* Abhandlung nun noch ein dritter Abschnitt:
Von dem Resultate des Durchganges eines Cometen
durch

durch sein Perihelium. Allein, da der Verfasser in diesem Abschnitte seiner Einbildungskraft einen etwas zu freyen Lauf läßt, und die darin aufgestellten Hypothesen unserer Meinung nach zu weit hergeholt sind, als daß sie einige Wahrscheinlichkeit mit sich führen könnten, so halten wir es für überflüssig, in diesem Auszuge etwas davon mitzutheilen.

LXII.

Beschreibung zweyer neuen Multiplicationskreise zu Höhenmessungen.

Von J. G. Geisler.

Wie die so glückliche Idee des verdienstvollen T. Mayer, Vermessungen durch reflectirende Instrumente unmittelbar zu vervielfachen, auch auf refrangirende Instrumente übertragen worden, ist bekannt; allein daß Borda hierin nicht ganz so glücklich gewesen, wie bey reflectirenden Instrumenten, beweisen die vielen Abänderungen, die man in der Bauart seines Multiplicationskreises mit zwey Fernröhren in der Folge vorgeschlagen hat. Herr Hofrath Tabor hat verschiedene Mängel dieses Instruments angegeben; allein sein eigener Vorschlag scheint jedoch eben nicht entsprechend zu seyn. Herrn Reichenbach's Kreis dieser Art habe ich nicht gesehen; allein nach dem zu urtheilen, was mir darüber bekannt

kannt geworden, scheinen die Abänderungen gleichfalls nicht weit zu gehen.

Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß die große Complizirung in der Bauart des ursprünglichen *Borda'schen* Kreises, und die Verwickelung der Operationen bey dem Gebrauche desselben, so richtig auch die Theorie ist, und wenn man diese beseitiget, so groß auch die Genauigkeit der Resultate seyn kann, — wichtige Einwürfe gegen dieses Instrument sind, ausserdem daß in geometrischer Hinsicht die dadurch erhaltenen schiefen Winkel erst auf den Horizont reducirt werden müssen, und in astronomischer Rücksicht Entfernungen zweyer Gegenstände unter schiefen Lagen nicht so genau, wie bey ähnlichen reflectirenden Kreisen, genommen werden können, da diese Gegenstände ihre Orte stets verändern, daher man auch in dieser Hinsicht sich dieses Kreises vielleicht nie bedient hat.

Allein auch für senkrechte Höhen hat dieser Kreis vorzüglich große Unbequemlichkeiten, in Hinsicht des unmittelbaren Beystands eines Gehülfen für die jedesmalige Einstellung der Libelle, der auch in der That bey der angenommenen und beybehaltenen Bauart dieses Instruments auf keine Weise entbehrt werden kann. Ich beschränke mich auch hier nur darauf, und erlaube mir daher, dem Publikum ein Paar Einrichtungen von wirklich ausgeführten ähnlichen Instrumenten vorzulegen, deren Erfolg auch allerdings der Erwartung entsprochen hat, und die ich hier um so mehr ohne besondre Verzeichnung geben kann, als sie jedem, der mit ähnlichen Instrumenten bekannt ist, leicht verständlich seyn werden.

Ohnstreitig ist wol die leichteste, bequemste und am wenigsten komplizirte Art, Höhenwinkel zu vervielfachen, das man auf das Fernrohr an einem Kreise eine sehr empfindliche Libelle setzt, um damit bey der bekannten Einrichtung eines solchen Instruments, das wechselsweise der Kreis nebst dem Fernrohre, und sodann letzteres für sich beweglich ist, immer wieder auf die Horizontallinie zurückgehen zu können. Auf diesen Grundsatz baute ich vor ohngefähr 8 Jahren ein ähnliches Instrument. Eine starke Trag säule, die inwendig durchaus hohl war, und ein Senkel enthielt, das unter dem Fusse in ein untergesetztes Gefäß mit Wasser spielen konnte, und dessen Lage durch eine Art von einem kleinen Fernrohre mit einer verschiebbaren Oeffnung auf *Troughton'sche* Art bestimmt wurde, um auf diese Art die senkrechte Lage des Instruments zu erhalten, enthielt oberhalb eine Platte, welche sich sanft horizontal im vollen Kreise bewegte. Diese Platte trug quer über die Axe der Trag säule eine kurze Röhre, durch welche die Axe gieng, an deren einem Ende der Kreis, am andern aber ein Gegengewicht, wie bey dem *Borda'schen* Kreise, nebst der ganzen Vorkehrung, wie ebendasselbst, zur Stellung befestigt war. Auch gab ich dieser Röhre noch die Einrichtung, das sie durch Gegenschrauben auf der vorerwähnten Platte gestellt werden konnte, um die senkrechte Lage des Kreises genau zu erhalten, zu deren Berichtigung ich oberhalb der Röhre eine kleine Libelle, wie bey dem *Borda'schen* Kreise, anbrachte. An die vordere Fläche des Kreises legte ich auf die gewöhnliche Art die Alhidade mit doppelten

Ver

Verniers nebst der Vorrichtung zum Einstellen, und auf diese schraubte ich das Fernrohr fest, so dafs es sich mit derselben herumbewegte, auf welches ich endlich eine empfindliche Libelle mit der Vorrichtung zu ihrer Einstellung und Justirung setzte.

Man sieht leicht, wie hiermit die bequemste und leichteste Art der Vervielfachung irgend einer Observation erhalten werden kann, und die, wie ich kürzlich gefunden, auch von Dr. *Benzenberg* angegeben worden ist. Es sey z. B. die Alhidade nebst dem Fernrohre auf 0° des Kreises gestellt, und Kreis und Fernrohr nach dem Gegenstande gerichtet. Befestigt man nun hier den Kreis, und stellt die Alhidade nebst dem Fernrohre so, dafs die Libelle desselben horizontal einspielt, so erhält man die erste Höhe des Gegenstandes. So fahre man nun fort, Kreis und Fernrohr vereinigt wieder auf den Gegenstand zu richten, und sodann das Fernrohr wieder so zu bewegen, dafs die Libelle horizontal steht, so erhält man die zweyte Observation u. s. f. Oder man kehre den Proceß um, je nachdem die Theilung des Instruments fortgeht, und bringe den Kreis nebst dem Fernrohre zum horizontalen Einspielen der Libelle, und richte das Fernrohr einzeln gegen den Gegenstand.

Dieses Verfahren gewährt eine sehr schnelle Vervielfachung der Observationen vom Horizonte aus, und solchemnach die Höhenwinkel einfach. Indessen sind freylich keinesweges die Vorthelle zu verkennen, ähnliche Observationen durch die doppelten Zenithwinkel zu erhalten, die zwar auch durch dieses Instrument durch Umkehrung des Kreises er-

Q q 2

halten

halten werden könnten; allein ungleich zuverlässiger erhält man dieses durch folgendes, worauf mich vorzüglich ein Gedanke des Herrn Vice-Kanzlers *Behrnauer* brachte.

Das ganze Instrument hat die Gestalt eines *Trough-ton'schen* Meridiankreises. Auf der Azimuthalplatte, welche horizontal bewegt werden kann, sind nämlich im Durchmesser derselben zwey Tragsäulen aufgerichtet. Auf diesen ruht die Axe, welche durch eine Oeffnung in der Mitte das Fernrohr aufnimmt, neben welchem zur Seite der Kreis beweglich angeschoben ist. Dieser Kreis ist eben so, wie bey dem *Borda'schen* Instrumente, in der Mitte seiner Stärke mit einer Fuge versehen, und hat zu beyden Seiten vorstehende Ränder für die doppelten Arretirungen, deren jede mit Mikrometer-Schrauben versehen sind, und wovon die eine an einer Tragsäule, die andere am Fernrohre befestigt ist; jene zur Bewegung des Kreises allein, diese zur gemeinschaftlichen Bewegung des Kreises nebst dem Fernrohre. Die eine Säule zunächst dem Kreise trägt eine Regel horizontal, die an dem Kreise so nahe anliegt, daß zu beyden Seiten daran befestigte Verniers diametralement an den Limbus des Kreises hinstreifen, indess diese Regel selbst eine sehr empfindliche Libelle nebst ihrer Vorrichtung zum Einstellen trägt.

Man sieht auf diese Art leicht, wie die Vervielfachungen der Observationen mit diesem Instrumente erfolgen, indem man mit den Bewegungen des Kreises allein, und den verbundenen des Fernrohrs und Kreises zugleich, wechselt, indess jedesmal der Kreis horizontal um 180° herumgedrehet wird, ohne dabey

bey eines Gehülfen nöthig zu haben, der die Libelle einstellt, wie es bey dem *Borda'schen* Instrumente erforderlich ist.

Ersteres Instrument hatte ich vor mehr als 8 Jahren verfertigt, und gewährt noch jetzt sehr gute Observationen, die denen mit andern ähnlichen Instrumenten vollkommen entsprechen, ausserdem dafs damit mehr als die Hälfte geschwinder operirt werden kann. Auch noch jetzt finde ich keine Ursache zur Abänderung, ausser dafs zur gemeinschaftlichen Bewegung die Vorrichtung an der Trommel des Gegengewichts vielleicht vortheilhafter mit einer andern an der Röhre vermittelst eines Arms vertauscht werden könnte.

Noch ungleich vortheilhafter ist indessen nun aber wohl das zweyte Instrument, gewifs ein unverkennbarer Gedanke des Herrn Vice-Kanzlers *Behrnauer*, dessen Schärfe in astronomischen Beobachtungen zu bekannt ist. Die ganze Einrichtung dieses Instruments macht es zugleich auch als vollkommenes Theodolit brauchbar, so wie es nicht weniger als Meridiankreis dient, und wenn die Axe durchbohrt wird, so können durch Einlegung eines Planspiegels die Mikrometer-Fäden leicht erleuchtet werden. Auch hat sie bewegliche Zapfenlager auf den beyden Trägern, um sie zu justiren.

LXIII.

Auszug aus zweyen Schreiben des Hrn. Professor Gauss.

Göttingen, den 8. Dec. 1813.

.... Dem Beobachten ist das Wetter, wie gewöhnlich in dieser Jahreszeit, sehr ungünstig gewesen. Meine Zeitbestimmung mache ich jetzt, da correspondirende Sonnenhöhen jetzt nie gelingen, indem es nur auf einzelne Stunden zuweilen sich etwas aufklärt, durch Stern-Azimuthen, die ich (am Tage) mit dem Theodoliten beobachte. Ich vergleiche α Aurigae jetzt gegen Sonnenuntergang mit einem 4000 Meter entfernten Thurm, dessen Azimuth im Sommer bestimmt wurde, und es geht recht gut damit.

Die Juno habe ich nur ein einzigesmal beobachten können, aber die Beobachtung ist an sich sehr gut, und am Tage der Opposition selbst gemacht. Der Planet hatte die achte Grösse.

1813	Mittl. Zeit in Göttingen	Gerade Aufsteig. \dagger	Südl. Abweich. \ddagger
Nov. 19	9 ^h 46' 46"	60° 30' 35,"0	3° 5' 9,"3

Die scheinbare Position des verglichenen Sterns wurde aus der *Hist. Cél.* bestimmt

$R. = 60^{\circ} 47' 50,"0$ Decl. $= 3^{\circ} 0' 16,"0$ südl.

Ich habe aus dieser Beobachtung ganz unbedenklich die Opposition abgeleitet, da schwerlich anderswoher Beobachtungen eintreffen werden.

Achte

Achte Opposition der Juno:

1813 Nov. 19. 18^U 11' 25" M. Z. in Göttingen
 Wahre Länge 57° 33' 58,"0
 Geocentr. Breite 23 18 46,8 südl.

Fortsetzung vom 9. Decbr. 10^U.

Heute Abend habe ich, bey starkem Nebel und Mondschein, zwar noch nicht den Platz, wo ich die Juno am 19. Nov. beobachtet habe, wieder nachgesehen, aber die Juno selbst wieder aufgefunden. *Verhältnißmäßig* schien sie heute *heller* als am 19. Novbr., wenigstens war sie bedeutend heller, als der Stern achter Größe, womit sie heute verglichen wurde, da sie am 19. Nov. dem verglichenen Sterne achter Größe kaum gleich kam. Ich erfuhe Herrn Nicolai, die Beobachtung zu reduciren, und mit den nachher folgenden Elementen zu vergleichen. Die Beobachtung beruht zwar nur auf drey kümmerlichen Vergleichen mit einem Sterne der *Hift. Cél.*, welcher am 20. Jan. 1798 am zweyten Faden 3^U 42' 48,"5 beobachtet ist, kann aber doch zur Controlle dienen.

1813 Dec. 9. 0^U 22' 2" St. Z., † folgt auf d. Stern 3' 49,"75
 Zeit = 57' 26,"25 Bogen
 0^U 32' 4" — † ist südlicher 5' 0,"9.

Ungefähr folgt daraus

$R. = 56^{\circ} 56\frac{1}{2}'$ Decl. = $3^{\circ} 56\frac{1}{2}'$ südl. *)

Die

*) Das Resultat meiner Reduction und Vergleichung obiger Beobachtung ist folgendes:

Schein-

Die Elemente, auf die Oppositionen von 1810, 1811, 1812, 1813 gegründet, ſind folgende (X):

Epoche 1814, Meridian von Göttingen $65^{\circ} 19' 23,8$

Tägliche tropiſche Bewegung . . . $812,709$

Logarithm der halben Axe . . . 0.4267631

Perihelium (1814) . . . $53^{\circ} 10' 0,40$

Excentricitäts-Winkel . . . $14\ 43\ 7,97$

Aufſteigender Knoten (1814) . . . $171\ 10\ 33,00$

Neigung . . . $13\ 4\ 12,03$

Die Vergleichung dieſer Elemente, beſonders der mittlern Bewegung, mit den Elementen (VIII), welche auf die Oppositionen von 1804, 1806, 1807, 1808 gegründet waren, zeigt, wie ſtark ſich die Jupiters-Störungen äußern, *)

Göttingen

Scheinbare Poſition des verglichenen Sterns

1813 Decbr. 9. AR. = $55^{\circ} 59' 21,2$,

Decl. = $3\ 51\ 34,0$ ſüdl.

Hieraus ergibt ſich für die Juno, wenn die Beobachtung der Declination auf die der Rectaſcenſion reducirt wird,

1813	Mittl. Zeit in Göttingen	Gerade Aufſteig. †	Südl. Abweich. ‡
Decbr. 9	$7^h 9' 38''$	$56^{\circ} 56' 47,4$	$3^{\circ} 56' 35,3$

Unteſchied mit den Elementen:

in AR. — $16,8$, in Decl. + $16,0$.

N.

*) In einem ſpättern Schreiben theilte mir Hr. Profeſſor Gauss noch folgendes über die Juno mit:

”Da Bessel mir ſeine Beobachtungen geſchickt hatte †),

lo

†) Dieſe Beobachtungen des Hrn. Prof. Bessel ſind folgende:

1813	M. Z. in Königsberg	Ger. Aufſt.	Südl. Abw.
Novbr. 18	$12^h 12' 26,5$	$60^{\circ} 41' 21,5$	$3^{\circ} 58' 27,2$
21	$11\ 58\ 20,4$	$60\ 46\ 42,5$	
Decbr. 11	$10\ 25\ 54,9$	$56\ 39\ 0,8$	

N.

Göttingen, den 16. Dec. 1813.

. . . . Ich habe mir doch die Mühe gegeben,
 auch der letzten IX. Opposition der Pallas die Ele-
 mente anzupassen. Die Correctionen sind äußerst
 gering, nämlich:

Länge des Knotens	— 2, 7
Neigung der Bahn	— 1, 4
Länge des Perihels	— 9, 4
Excentricitäts-Winkel	+ 1, 8
Epoche 1810	— 4, 2
Tägliche Bewegung	— 0, 00569
Logarithm der halben Axe	+ 0.0000021

Die

so veranlaßte ich Herrn Möbius, die Resultate danach
 noch zu berichtigen. Er verglich also sämtliche Be-
 obachtungen mit meinen letzten Elementen, und fand
 folgende Unterschiede:

1813	AR.	Decl.	Beobachter
Novbr. 18	— 19, 9	Bessel
19	— 11, 4	+ 20, 6	Gauß
21	— 16, 4	Bessel
Dec. 9	— 14, 4	+ 17, 2	Gauß
11	+ 3, 7	+ 25, 3	Bessel

Sein neues Resultat für die Opposition, aus den drey er-
 sten Beobachtungen, ist nun

1813 Nov. 19. 18^U 12' 0" M. Z. in Göttingen
 Wahre Länge . . . 57° 34' 2, 1
 Geocentr. Breite . . 23 18 46, 1 südl.

und für die berichtigten Elemente

Epoche 1810, Merid. von Göttingen . . . 95° 29' 53, 2
 Tägliche tropische Bewegung 812, 714
 Länge des Perihels (1810) 53° 6' 43, 0
 Länge des aufsteig. Knotens (1810) . . . 171 6 45, 0
 Excentricitäts-Winkel 14 43 9, 5
 Neigung der Bahn 13 4 12, 9
 Logarithm der halben großen Axe . . . 0.4267616.

N.

Die Uebereinstimmung der 9 Oppositionen mit den verbesserten Elementen ist nun folgende :

Unterschied:

Oppof.	Mittlere Länge	Heliocentr. Breite
I	— 1, 3	— 5, 3
II	— 12, 9	— 11, 9
III	— 20, 4	— 0, 4
IV	+ 2, 5	— 6, 8
V	+ 23, 5	+ 9, 0
VI	+ 21, 5	— 3, 1
VII	+ 14, 1	— 7, 2
VIII	— 16, 1	+ 4, 0
IX	— 10, 9	— 0, 0

Ich bin sehr neugierig, wie die Unterschiede anfallen werden, wenn erst die Saturns-Störungen dazu kommen.

LXIV.

Lauf der Juno

vom 7. Nov. 1814 bis zum 29. Jul. 1815,
für Mitternacht im Meridian von Göttingen berechnet.

Von Herrn Möbius in Göttingen.

1814	R.	Declin.	Log. Dist. a δ
Nov. 7	179° 3'	0° 57' S.	0.5258
11	180 24	1 22	0.5217
15	181 42	1 47	0.5174
19	182 58	2 11	0.5127
23	184 13	2 34	0.5078
27	185 25	2 56	0.5026
Dec. 1	186 36	3 16	0.4971
5	187 44	3 35	0.4913
9	188 49	3 53	0.4853
13	189 52	4 9	0.4789
17	190 53	4 24	0.4724
21	191 50	4 36	0.4655
25	192 44	4 47	0.4585
29	193 35	4 56	0.4512
1815 Jan. 2	194 22	5 4	0.4437
6	195 5	5 9	0.4360
10	195 45	5 12	0.4281
14	196 20	5 12	0.4202
18	196 50	5 16	0.4121
22	197 16	5 6	0.4040
26	197 37	5 0	0.3958
30	197 53	4 50	0.3877
Febr. 3	198 4	4 38	0.3797
7	198 10	4 24	0.3719
11	198 9	4 7	0.3642
15	198 4	3 47	0.3569
19	197 53	3 24	0.3499
23	197 36	3 0	0.3434
27	197 15	2 33	0.3375

1815		R.	Declin.	Log. Diff. a δ
März	3	196° 48'	2° 4' S.	0.3322
	7	196 17	1 33	0.3275
	11	195 41	1 0	0.3237
	15	195 2	0 27	0.3207
	19	194 20	0 7 N.	0.3187
	23	193 35	0 42	0.3176
	27	192 49	1 16	0.3175
	31	192 1	1 50	0.3183
April	4	191 14	2 23	0.3202
	8	190 28	2 55	0.3230
	12	189 43	3 25	0.3268
	16	189 0	3 52	0.3315
	20	188 20	4 17	0.3370
	24	187 43	4 39	0.3432
	28	187 10	4 59	0.3501
Mai	2	186 42	5 16	0.3576
	6	186 17	5 30	0.3656
	10	185 58	5 42	0.3740
	14	185 43	5 50	0.3828
	18	185 33	5 56	0.3918
	22	185 28	5 59	0.4010
	26	185 27	5 59	0.4104
	30	185 31	5 57	0.4198
Jun.	3	185 40	5 53	0.4293
	7	185 53	5 47	0.4388
	11	186 10	5 38	0.4482
	15	186 31	5 28	0.4575
	19	186 56	5 16	0.4666
	23	187 24	5 3	0.4757
	27	187 56	4 47	0.4846
Jul.	1	188 31	4 31	0.4932
	5	189 9	4 13	0.5017
	9	189 50	3 54	0.5100
	13	190 34	3 34	0.5180
	17	191 20	3 14	0.5258
	21	192 9	2 52	0.5333
	25	193 0	2 29	0.5406
	29	193 53	2 6	0.5477

*An die Leser der Monatlichen
Correspondenz.*

Die Zeit-Umstände haben mich veranlaßt, für die Dauer des jetzigen Feldzugs in den Generalstab Sr. Durchlaucht dem regierenden *Herzog von Weimar*, Commandeur des 3ten Deutschen Armee-Corps, zu treten. Die Sternwarte *Seeberg* wird durch meine Abwesenheit nicht verwaiset, indem deren interimistische Verwaltung dem unsern astronomischen Lesern schon rühmlichst bekannten Hrn. *Nicolai* übertragen worden ist. Die Monatl. Correspondenz ist bis zum Schluß des Jahres 1813 fortgeführt; allein nun muß ich, wenn auch ungern, von meinen Lesern einen temporären Abschied nehmen, da der ganze Zustand unseres jetzigen literarischen Verkehrs die Fortsetzung der Monatl. Correspondenz für die Dauer meiner Abwesenheit nicht gestattet,
und

und es wird daher in der Herausgabe dieser Zeitschrift bis zu meiner Rückkunft eine Unterbrechung Statt finden, wenn nicht vielleicht von dem Freyherrn von Zach anderweite Mafsregeln deshalb genommen werden.

Die Erscheinung meines vor einigen Monaten angekündigten Werkes "*Leben des Astronomen*" bleibt bis zu meiner Wiederkunft ausgesetzt. Im Voraus freue ich mich darauf, nun aus eigner Ansicht und Erfahrung den Contrast zwischen dem Leben auf einer ruhig-friedlichen Sternwarte und dem im kriegerischen Lager schildern zu können. Doch nur im Aeußern liegt die Verschiedenheit, des Menschen inneres Leben bleibt überall dasselbe; veränderte Umgebungen vermögen wol äußere Formen zu umstalten, doch nicht des Geistes Sinn und Zweck.

Bernhard von Lindenau,
Obrist-Lieutenant und General-Adjutant
beym Commandeur des 3ten
Deutschen Armee-
Corps.

I N H A L T.

	Seite
LVII. Ueber die Berechnung der Längen und Breiten aus gemessenen Abständen vom Meridian und Perpendikel eines Orts. Vom <i>Herausgeber</i>	489
LVIII. Beobachtungen des zweyten Cometen vom Jahre 1813 angestellt auf der Sternwarte zu Göttingen, nebst einigen Bemerkungen über die Berechnung parabolischer Bahnen. Von <i>Carl Friedrich Gauss</i> . * Vorgelegt der königl. Gesellschaft der Wissenschaften am 10. Septbr. 1813	501
LIX. Ueber das Kalenderwesen der Griechen und Römer. Von Herrn Professor <i>Ideler</i>	514
LX. Ueber die eignen Bewegungen einiger Sterne. Von Herrn <i>Burckhardt</i> , Mitglied des Pariser Instituts.	552
LXI. Auszug aus einer Abhandlung des Hrn. Dr. <i>W. Herschel</i> , über den großen Cometen von 1811; vorgelesen am 19. Dec 1811. (Beschluss.)	558
LXII. Beschreibung zweyer neuen Multiplications-Kreise zu Höhenmessungen. Von <i>J. G. Geissler</i>	568
LXIII. Auszug aus zweyen Schreiben des Herrn Professor <i>Gauss</i>	574
LXIV. Lauf der Juno vom 7. November 1814 bis zum 29. Jul. 1815, für Mitternacht im Meridian von Göttingen berechnet. Von Herrn <i>Möbius</i> in Göttingen	579
<i>An die Leser der Monatlichen Correspondenz</i>	581

R E G I S T E R

zum XXVIII. Bande.

A.

- Aar**, Fluß, Höhe desselben an mehreren Orten d. Schweiz, 266.
- Aberrations-Tafeln**, Vorschlag zu neuen, 482 f.
- Abián**, in Arabien, 232.
- Abplattung der Erde**, nach Puissant, 258.
- Abstände d. Planeten**, größte nördl. u. südl. helioc. v. d. Ecliptik, 313 f.
- Abu Kobés**, Berg in Arabien, 359.
- Adam's Handbuch d. Röm. Alterth.**, 396.
- Adams**, Verfertiger eines Thermometrograph's, 66.
- Aden**, St. in Jemen, 231; — geogr. Lage, 353; — astron. Beobb. daselbst, 369.
- Abb**, St. in Arabien, geogr. Lage, 353; — astron. Beobb. daselbst, 367.
- Ainos**, Abbildungen davon, 63.
- Akronychischer Aufgang der Sterne**, Erklärung, 518.
- Albani**, Buonajuto, Venet. Reisender, 450.
- Alnwich**, Herschel beob. daselbst d. gr. Cometen. v. 1811, 461.
- Altenburg**, die, geogr. Lage, 297 f.
- Altomünster**, Bestimmung seines Azimuths, 167 f.
- Ambrosianische Bibliothek** in Mailand, 447.
- Amoretti**, Bemerkungen über dessen Brief im Journal de Paris, 379; — will die Geographie des Ptolemaeus herausgeben, 449; — *Memorie storiche su la vita... di Leonardo da Vinci*, 450.
- Amstäg**, Höhe über dem Meere, 269.
- Anmerkung zur M. C. Mayheft** 1812 S. 426, 291.

Ant-

- | | |
|--|--|
| <p>Antwerpen, Hafen-Arbeiten daselbst, 87.</p> <p>Appenzeller Alpen, Höhe über dem Meere, 267.</p> <p>Arabien, astr. Beob. das. 354 f.</p> <p>Araeometer, zur Bestimm. des specif. Gewichts des Meerwassers, 69.</p> <p>Arago, Arbeit. üb. d. Mond, 58.</p> <p>Armenianische Mönche in St. Lorenzo, 447.</p> | <p>Athmosphäre in Lappland und der Schweiz, 278.</p> <p>Attraction der Sphäroiden 37 f., 125 f.</p> <p>Aufkirchen, Azimuth, 168.</p> <p>Aufschrift, auf Clavius Denkmal, 308.</p> <p>Augustin, Bestimmung d. Breite v. Wien und Raab, 138.</p> <p>der Rosalien-Capelle, 139.</p> |
|--|--|

B.

- | | |
|---|--|
| <p>Babel Mandeb, 234.</p> <p>Babenburg, f. Altenburg.</p> <p>Bahrên, Inseln, 251.</p> <p>de Baillou, Geschichte der Geographie des Mittelalters, 441; — Spiegazione delle Tavole riguardanti etc., 441.</p> <p>Baily, Arbeiten über Temperatur des Meerwassers, 68.</p> <p>Bali, arabische Münze, 243.</p> <p>Bamberg, geogr. Lage, 297 f.</p> <p>Barometer-Messungen, in der Schweiz, 266.</p> <p>Barometer, Oscillationen derselben zwischen den Wendekreisen, 71; — Stand desselb. im Niveau des Meeres, 75.</p> <p>Bayerische Landesvermessung, Vortrefflichkeit derselben, 135 f.</p> <p>Bayonne, Hafen-Arbeiten daselbst, 87.</p> <p>Bembo, Giovanni u. Ambrogio, Venet. Reisende, 450.</p> <p><i>Mon. Corr. XXVIII. B. 1813.</i></p> | <p>Bene, Höhe üb. d. Meere, 487.</p> <p>Benincasa, Karte von 1471, 435.</p> <p>Bessel, Arbeiten über den grossen Cometen von 1811, 25; — Auszug aus einem Briefe, betreffend die v. Zach'schen Beob. d. gr. Comet. v. 1811, 92; — Bestimm. d. Schiefe d. Ecl., 284, 334; — Bemerkungen über seine Abhandl. über das Integral $\int \frac{dx}{1x}$, 373; — Auszug aus einem Briefe, enthaltend die Beschreibung d. neuen Königsberger Sternwarte, Bemerkungen über den. gr. Com. v. 1811, Vorschlag zu neuen Aberrations- und Nutations-Tafeln, Bemerkungen über die Pond'schen Declinationen u. eine Sternbedeckung, 475 f.; — Beob. d. Juno i. J. 1813, 576.</p> <p style="text-align: center;">R r</p> <p style="text-align: right;">Bêt.</p> |
|---|--|

- Bêt-el-Fakih, geogr. Lage 353; — astron. Beob. d. selbst, 362.
- Bianco, Andrea, alter Atlas, 445, 446.
- Biot, Attraction der Sphäroiden, 40.
- Bir Achmed, Dorf in Arabien, 233.
- Bliss, Unzuverlässigkeit seiner Beob., 321 f.
- Bober, Fluß, Höhe über dem Meere an mehreren Orten Schlesiens, 183.
- Bochára, blühende Stadt der Tartarey, 248.
- Bode, unrichtig bestimmte Sterne, 26, 33.
- Bologna, alte Landkarten d. selbst, 444.
- Bonne's Projection, 255.
- Boscovich, Ziehung der Mittaglinie, 413.
- Bouvard, Arbeiten über den Uranus, 4; — ü. d. Mond, 58; — Beob. des Mars in der größt. nördl. hel. Breite, 326; — Unrichtigkeit in seinen Jupiters- u. Saturns-Tafeln, 473; — Druckfehler in den Saturns-Tafeln, 474; — Beob. d. zweyten Comet. v. 1813, 503.
- Bouvet, Jesuit, beobachtete d. Cometen v. 1695, 429.
- Bradley, Beob. des Mars in der größten süd. u. nördl. helioc. Breite, 320, 324.
- Brancaleone, Niccolò, Vened. Reisender, 450.
- Breite, geogr., Berechn. ders. aus Abst. vom Merid. u. Perpendikel, 489 f.
- Breite, heliocentr., Formel zu deren Berechnung, 474; — Formel für deren Aenderung, 333.
- Brest, geogr. Lage, 499.
- Brief, Auszug daraus, Bemerk. ü. e. Stelle in d. Recens. von Gerling's Dissertation, 371.
- Brocardi, Pellegrino, Vened. Reisender, 450.
- Brunnen, Ziehung der Mittaglinie darin, 411.
- Buchdrucker-Werkstatt, Sternbild, Verzeichniß einiger schlecht bestimmter Sterne darin, 33.
- Bürg, Arbeiten über d. Mond, 59; — Bestimm. der Breite von Commorn, Wels und Salzburg, 139; — Ausz. a. e. Briefe, enth. Bemerk. ü. d. Greenw. Zen. Dist., 280 f.
- Bugge, über Neigung der Venusbahn, 338.
- Burchhardt, Auszug a. e. Briefe, enth. Beob. u. Elem. d. zweit. Comet. v. 1813, und Bemerk. ü. seine Mondstafeln, 100; — Ausz. a. e. Briefe,

- fe, enth. Beob. d. Pallas u. Sternbedeck., 198; — Berechn. d. Störungen d. Vesta, 222; — über die eignen Beweg. einiger Sterne, 552.
- Busca, Höhe üb. d. Meere, 487.
- Buttmann, Erklärung e. Stelle in Virgils Landbau, 548.
- Buzengeiger, Ausz. a. e. Briefe, üb. d. Integral $\int \frac{dx}{x^2}$, 373; — Unrichtigkeit in seiner Methode, d. Längen- u. Breiten-Differenz zweyer Oerter zu berechnen, 489 f.

C.

- Caesar, Verbeß. d. Kalenders, 537 f.
- Caetano da Soufa, Besitzer eines Orang-Outang, 64.
- Callippus, Aenderung am Meton'schen Kalender, 531.
- Canal de St. Quentin, de l'Ouroque, d'Arles, du Midi, 87.
- Carignan, Kirche in Genua, 441.
- Carli, sulla scoperta dell' America, 450.
- Carlini, Beob. d. Juno, 341.
- Casal, Höhe üb. d. Meere, 487.
- Cassel, Beob. zur Bestimm. d. geogr. Lage, 382.
- Cassini, üb. d. Cometen von 1668, 428; — Description géométrique de la France, 499.
- Caturegli, Astronom, Auszug a. e. Briefe über ältere Landkarten, 433 f.
- Chardin, über den Cometen von 1668, 428.
- v. Charpentier, Darstellung d. Höhen versch. Berge, Flüsse u. Orte Schlesiens, 175 f.
- Cheibar, in Arabien, 243.
- Chiminello, Bestimm. d. Breite von Padua, 137.
- Chinesische Handschrift, 309; — geograph. Darstell., 444.
- Chur, mittl. Temp. das., 276.
- Ciccolini, 433.
- Clavius, Notizen v. ihm, 306.
- Collimations-Fehler d. Greenwicher Mauer-Quadr., 282; — scheint mit von d. Temperatur abzuhängen, 321.
- Collimations-Fehler d. Repetitionskreises, Wandelbarkeit desselben durch die zu schnelle Erwärmung des Werkzeugs, 378.
- Colombo, della Patria di Cristoforo Colombo, 450.
- Cometen, ältere unberechnete, 426 f.
- Cometen Bahnen, leichte Methode zur ersten Berechnung derselben, 504 f.
- Comet, von 1602, 427; — v. 1647, 428; — v. 1666, 428; Comet

- Comet v. 1668, 428; — v. 1680, ellipt. Bahn desselben, 24; — v. 1695, 429; — v. 1732, 430; — v. 1750, 430.
- Comet, großer v. 1811, rectificirte Beob. i. ersten Zweige seiner Bahn, 24, 94; — wurde nach seiner Conjunction, d. Sonne wieder beob., 96; — ellipt. Elem. und Vergl. ders. mit d. Beob. 31, 32; — Beob. desselb. von Herschel, 455 f., 558 f.
- Comet, zweyter v. 1813, Beob. u. Elem., 99, 100, 501.
- Commorn, geogr. Lage, 139, 140.
- Conti, Andrea, ellipt. Elem. d. gr. Comet. v. 1811, u. Vergleichung mit d. Beobacht., 31, 32.
- Cook, Beob. d. Barometer-Standes im Niveau des Meeres, 75.
- Corrections- Factor für d. aus v. Lindenau's Marstafeln berechn. helioc. Breiten, 330.
- Courtin, Arbeiten d. Brücken- und Wegebau - Ingenieurs etc., 84.
- Crugeri Disputatio de Cometis, 427.
- Curfus Astronomiae, e. Hand. schrift, 431.

D.

- Damâr, geogr. Lage, 353; — astron. Beob. das., 366.
- Dandolo, Benedetto, - Venet. Reisender, 450.
- Daussy, Elemente des zweyten Cometen v. 1813, 100; — Bestimm. d. Monds-Durchmessers, 102; — Beob. einiger Stern-Bedeck., 198; — Berechn. d. Bahn d. zweyten Cometen von 1737, 432.
- Declinationen, die Pond'schen m. d. Piazzii's vergl., 286.
- Delambre, Arbeiten über Mercurstheorie, 4; — Bestimmung der Massen v. Venus u.
- Mars, 5; — Verbesserung seiner Uranus - Tafeln, 289.
- Delhi, große Stadt Indiens, 245.
- Denkmal, des Clavins, 308.
- Derâya, Sitz der Wuhabisten, 243; — Entfernung v. Medine und Mecca, 243.
- Diano Marino, Stadt in Frankreich, 440.
- Distanzen, des Mondes v. d. Sonne, beob. in Mekka, 355; — in Hodêde, 360; — in Sebid, 364; — in Aden, 369.
- Dûân, Name ein. Thales, 242.
- Doffar, in Arabien, 228.

Dorân,

- Dorân**, in Arabien, 365.
Druckfehler - Anzeige, 383 f.
Dschemmâd el áual, Monatsname, 365.
Dschemmâd el tány, Monatsname, 366.
Dschibbal Fórrid, Berg in Arabien, wahrscheinlich einerley mit d. Vorgeb. des heil. Antons, 233.
Dubbâb, Dorf in Arabien, 234.
Dünkirchen, geogr. Br., 498.
Duisburg, Berechn. d. geogr. Länge u. Breite, 496, 498.
Du - Tal, widerlegt Cassini, 428.

E.

- Ecliptik**, f. Schiefe d. Ecliptik.
Eddoffa, in Arabien, 227.
Einhorn, Sternbild, Verzeichniss einiger schlecht bestimmter Sterne darin, 33.
El Krû'schaschije, eine Gasse in Mekka, 354.
Ellipse, ein sie betreffendes Theorem, 260.
v. Ende, Auszug a. e. Briefe über die Pond'schen Declinationen, 286.
Engelberg, Höhe, 269.
Enke, Elem. d. zweyten Cometen v. 1813, 99.
Enontekis, mittl. Temperatur daselbst, 275.
Entlibuch, Höhe, 268, 269.
Epochen, wo Mars beobachtet zu werden verdient, 338.
Erlauer Sternwarte, geog. Länge, 139, 140.
Erythraeus, Pinacotheca, 412.
Espenberg, über den Gesundheits-Zustand d. Mannschaft auf der Nadeshda, 76.
Euler, ein analytisches Theorem, 374.

F.

- Feer**, geograph. Bestimmungen im Rheinthal, 201.
Finsler, Veranstaltung e. Triangulirung d. nörd. Schweizer-Cantone, 203.
Fixmiller, Beobb. des Mars in d. grössten südl. heliocentr. Breite, 321.
Fixsterne, Verzeichn. einiger schlecht bestimmter im Einhorn u. der Buchdr. Werkstätt, 33 f.; — eigne Beweg. einiger, 552.
Flamsteed, Beobb. des Comet. v. 1680, 24; — Unrichtigk. in dess. Stern-Verzeichniss, 35; — Mond-Beobachtungen, 58, 59; — Projection, 255.

- 255, 258; — Beobachtungen naher Sterne, 552.
 Florenz, Bibliothek. daf., 441.
 Föddel, in Arabien, 232.
 Formaleoni, dessen Schriften, 441, 445, 446.
 Forster, Arbeiten über Temperatur des Meerwassers, 68.
 Foscari, 445; — Letteratura Venez., 446.
 Fra Mauro, alte Karte, 445, 446.
 Francesconi, illustr. di un Urnetta all Agemina, 450.
 Franz Maria II., Herzog von Urbino, 412.
 Frislandia, Insel, 444.

G.

- Gallen, Sanct, geogr. Lage, 201 f.
 Gallenstock, Höhe, 270.
 Gauss, Attraction der Sphäroiden, 37 f., 125 f.; — Ausz. aus zwey Briefen, enth. das Pond'sche Declinations-Verzeichniss, und Beobb. und Elem. d. zweyten Comet. v. 1813, 97; — Ausz. a. e. Briefe, Pallas-Beobb. enthaltend, 197; — Anzeige von Druckfehlern in seiner Abhandl. über d. Attr. d. Sph., 385; — Abhandl. über den zweyt. Com. v. 1813, 501 f.; — Ausz. aus zwey Briefen, die Juno u. Pallas betreffend, 574.
 Gerling, Abhandl. über die orthogr. Proj. Meth. bey parallact. Rechnungen, 185 f.; — Ausz. a. e. Schreib. über die Mondfinst. vom 11. Aug. 1813, 196; — Auszug a. e. Schreiben über d. geogr. Lage v. Cassel, 382; — Rechnungen über d. zweyten Cometen von 1813, 502, 503.
 Geisler, Ueberf. d. Werks v. Courtin üb. die Arbeiten der Brücken- u. Wegebau-Ingenieurs, 86.
 Geisler, J. G., Beschr. zweyer neuen Multipl. Kreise, 568 f.
 Gerbert, Geometrie, 405.
 Gerlach, Höhe, 269.
 Glarus, Höhe, 269.
 Goehus, edit. script. rei agrar., 396, 405.
 Gotthardt-Hospice, mittlere Temper., 276.
 Gottigniez, de figuris cometarum etc., 429.
 Gradenigo, Tommaso, Venet. Reisender, 450.
 Grammatici, Jesuit, Dissert. astron. de cometa annorum 1729 et 1730, 430.
 Greenwich, Corr. d. daselbst beob. Zen. Dist., 280 f. — Collimations-Fehler des dorti-

dortigen Mauer-Quadr., f. Gulph-Stream, an der Küste
Collimationsfehler. v. America, 68.

H.

- Hadramût, neuere Nachrichten davon, 239.
- Hager, Prof. in Mailand, 444.
- Hales, Vorrichtung zur Bestimm. d. Temp. d. Meerwassers, 66.
- Halley, Bestimm. d. Umlaufzeit d. Comet. v. 1680, 24.
- Halley'scher Comet, 427.
- Hamjaritische Innschrift, 228.
- Hamse, f. Schech Hamse.
- Handschrift, eine astronomische, 431.
- Handschriften, Chinesisch, 309.
- Hanow, Bericht üb. d. Comet. v. 1732, 430.
- Harding, Sternverzeichniss, 310; — Himmelskarten, IV. Lieferung, 452; — Beobb. d. zweyten Cometen v. 1813, 502.
- Hauâschib, e. Beduinenstamm, 230.
- Häuta, Stadt in Arabien, astr. Beobb. daselbst, 368.
- Heliacischer Unter- u. Aufgang der Sterne, Erklärung, 516.
- Helder, Hafen-Arbeit. das., 87.
- Henry, Anmerkung zu seinen Mém. sur la proj. des cartes géograph., 291.
- Henry, Bestimmung des Azimuths von Aufkirchen, 168.
- Herculeus lapis, 443.
- Herschel, Beobb. d. gr. Com. v. 1811, 455 f., 558 f.
- Hevelius, Bericht über d. Cometen v. 1647, 428.
- Heyne, Erkl. e. Stelle in Virgils Landbau, 549.
- Himmelskarten, f. Harding.
- Hodêde, geogr. Lage, 353; — astronom. Beobb. das., 360 f.
- Höhenmessungen, barometrische, in der Schweiz, 266.
- Höms, alte Phönic Stadt, 251.
- Horizont, künstlicher, ein hölzerner Träger desselben ist in den Tropenländern unanwendbar, 368.
- Horner, über Temp. d. Meerwassers, 66; — specif. Gewicht d. Meerwassers, 69; — über d. Oscill. des Baromet. zwisch. d. Wendekreisen, 71; — Berechnung der Höhen nach dessen Baromet. Tafeln, 270.
- Hospital, Höhe, 270.
- v. Humboldt, Beobb. d. Oscillat. des Barom., 73.
- Hygin, Ziehung der Mittagslinie, 397, 405; 406.

Jacob

I.

- Jacob, Jesuit, beob. den Co-
meten v. 1695, 429.
- Jacobs, Johann, Beobachter
im Jesuiten-Collegium zu
Bamberg, 299
- Ideler, über das Kalenderwe-
sen der Griechen u. Römer,
514 f.
- Im Weiler, Höhe, 269.
- Inghirami, Berechn. d. Stern-
bedeck. für 1814, 211.
- Inschriften, hamjiritische, 228.
- Jocko, f. Orang-Outang.
- Irwing, Arbeiten über Tem-
perat. d. Meerwassers, 68.
- Ifenstock, Höhe, 270.
- Juno, Opposition von 1810,
340; — Beobb. v. Carlini,
341; — Elemente, 344; —
beob. Gegenschein v. 1813 u.
neue Elemente, 575, 576; —
Ephemeride für 1814 u. 1815,
579.
- Jupiter, Neigung d. Bahn, 339.
- Ivory, Abhandl. über d. Attra-
ction d. Sphäroiden, 134.

K.

- Kaddáhha, Dorf in Arab., 234.
- Kalenderwesen der Griechen
und Römer, 514 f.
- Kamtschadalen, Abbildungen
davon, 63.
- Kapelle auf dem Staffelftein,
f. Staffelftein.
- Karte, alte geographische in
Paris, f. Paris.
- Karten, zu Valentin's Reise ge-
hörig, 353.
- Katzbach, Fluß, Höhe über d.
Meere an mehreren Orten
Schlesiens, 183.
- Katzenfö, Höhe, 267.
- Kepler'scher Stern, 427.
- Kirch, Beobb. d. Cometen v.
1680, 24.
- Knoten, aufsteig. der Plane-
tenbahnen, 391; — Sac. Aen-
derungen derselben, 393.
- Knotenpunkte, die, der drey
obersten Planetenbahnen lie-
gen sehr nahe zusamm., 395.
- Knox, Beschreibung v. Cey-
lon, 428.
- Kosmischer Untergang d. Ster-
ne, Erklärung, 518.
- v. Krusenstern, Reise um die
Welt, III. Th., 62; — ver-
spricht noch einen Supple-
mentband zu seiner Reise,
62; — über beob. Strömun-
gen, 77; — über die Fluth-
beob. im Hafen v. Nangala-
ki, 79.
- Kyene, Berechn. d. Scherer's-
chen Beobb., 206.

Länge

L.

- Länge, geogr., Berechn. ders. | Lappland, verglichen mit der
aus Abst. v. Merid. und Per- | Schweiz, 272.
pendikol, 489 f. |
LaGrange, Attract. d. Sphäroi- | Le Genère, Attraction d. Sphä-
den, 38, 40. | roiden, 39; — über sphä-
La Harpe, Comp. de Viaggi, | roidische Dreyecke, 260.
446. | Le Gentil, über die Neigung
Láhhak, in Arabien, 231; — | der Marsbahn, 337, 338.
geogr. Lage, 353; — astro- | Leo de Balneolis, Verf. einer
nom. Beob. daf., 368. | astron. Handschrift, 431.
La Hire, Mond-Beob., 58. | Letzner, Beschr. der Cometen
La Lande, Arbeiten über Mer- | von Anfang der Welt her, 427.
curstheorie, 4; — unrich- | Liesganig, Bestimm. d. geogr.
tig bestimmte Sterne, 26; — | Breite v. Wien, 138.
über die Neigung der Jupi- |
tersbahn, 339. | v. Lindenau, Vergleichung
Landen, beob. den Cometen | seiner Barometertafeln mit
v. 1668, 428. | d. Horner'schen, 270; —
La Perouse, Beob. des Barom. | Druckfehler in dessen Mars-
Standes im Niveau d. Meers, | tafeln, 317; — Beob. des
75; — Auffuchung einer In- | Mars in d. größten südl. u.
sel, 82. | nördl. hel. Breite, 318, 327;
La Place, Bestimm. der Venus- | — Fehler in dessen Mercurs-
masse, 5; — jährl. Aend. d. | tafeln, 383.
Knot. d. Mercursbahn, 15; |
— jährl. Aend. d. Aph. u. d. | Lorenzo, Sct., Armenianische
Excentr. d. Mercursbahn, 21, | Mönche daf., 447.
23; — Attract. d. Sphäroi- | Loth, am Mauer Quadr., Be-
den, 39; — über die Glei- | merk. darüber, 283.
chung von langer Periode in | Loxodromische Linie, Glei-
der Mondstheorie, 58 f. | chung derselben, 261.
Lubienetzky, Bericht von d. |
Cometen v. 1602, 427.
Lyon, Bibliothek daselbst, 431.

M.

- Maánwijáh, Dorf in Arabien, | Mac-Laurin, Attract. d. Sphä-
229. | roiden, 38.

Mage-

- Mageroe, mittl. Temper., 275.
 Maggi, Carlo, Venet. Rei-
 sender, 450.
 Magnetnadel, Bemerkungen
 darüber, 77.
 Mailand, Bibliothek das., 447.
 Makalla, Hafen von Hadra-
 mit, 244.
 Maldonado, Nachtrag zur Un-
 tersuchung üb. dessen Schiff-
 fahrt, 379.
 Malte-Brun, Bemerk. über e.
 Brief v. Amoretti, 380.
 Mamole insulae, 443.
 Mandaraffy, Bestimm. d. Brei-
 te d. Erlauer Sternwarte, 139.
 Manosque, Stadt, 381.
 Marcus, Sct., Bibliothek in
 Venedig, 445.
 Mars, größte nördl. und süd-
 liche heliocentr. Breiten,
 313 f.; — Oppos. v. 1813,
 317, 318; — Correct für
 dessen helioc. Breite, 330; —
 jährl. Aend. d. Neig., 331;
 — period. Breitenförm., 332;
 — Epochen, wo er beob. zu
 werden verdient, 333; —
 Tafeln, f. v. Lindenau.
 Marschlin, mittl. Temperat.,
 276.
 Marseille, Hafenarbeit, das., 87.
 Martinello, Cecchino, Venet.
 Reisender, 450.
 Maskelyne, Beob. d. Mars in
 der größten süd. hel. Brei-
 te, 320; — jährl. Aend. sei-
 ner Fundamental-Sterne, 484.
 Matsko, Programme, astron.
 Beob. enthaltend, 382.
 Maüffim, f. Monfon.
 Mayer, Tob., geogr. Lage v.
 Bamberg, 302.
 Mazzuchellianische Biblioth.
 in Florenz, 441.
 Méchain, über die Neig. der
 Marsbahn, 337.
 Meerwasser, Temper. desselb.,
 66 f.; — dieselbe wird con-
 stant bey einer gewiss. geogr.
 Breite, 68, 69; — specifi-
 sches Gewicht, 69, 70.
 Mekka, astr. Beob. das., 354 f.
 Mercator'sche Projection, 255,
 261.
 Mercur, neue Untersuch. üb.
 dessen Bahn, 3 f., 105 f.; —
 ältere Elemente, 6; — Be-
 stimm. d. Knotens u. d. Nei-
 gung aus d. Durchgängen, 9;
 — beob. Durchgänge, 13;
 — Bestimm. d. mittl. Bewe-
 gung u. jährl. Aend. d. Aph.,
 15; — Bestimm. d. eigentl.
 ellipt. Elem., 105; — Be-
 stimm. v. Neig. u. Knoten a.
 d. beob. geoc. Breiten, 115;
 — neue Elemente, 116 —
 119; — Vergl. sammtl. Be-
 ob. mit diesen, 120 f.
 Meteore, sind seltner in Lapp-
 land als i. d. Schweiz, 277.

Meteo-

- Meteoroscopium, 410.
 Meton, Verbesserung d. Griechischen Kalenders, 529.
 Minerva de Letterati d'Italia, 446.
 Mirabeau, Dorf, 381.
 Mittagslinie, Ziehung ders., 396 f.
 Mochà, schöne Seefstadt Arabiens, 235.
 Möbius, Rechnungen üb. die Juno, 577, 579.
 Mohammed, f. Seid Moham-med.
 Mollweide, üb. die Ziehung d. Mittagslinie, 396 f.; — Bemerk. über seine Erklär. einer Stelle in Virgils Landbau, 541 f.
 Mond, Gleichung v. langer Periode in der Theorie desselben, 58, welche von der Differenz beyder Erdhalbkugeln abhängt, 61; — Einfluß desselben auf die Barometer-Oscillationen, 74.
 Mond-Distanzen v. d. Sonne, f. Distanzen.
 Mondfinsterniß vom 11. Aug. 1813, Beob. derselb., 196.
 Mondknoten, Berichtigung desselben in einer Tafel der M. C., 385.
 Monson, e. erfrischender Süd-Westwind, 235.
 v. Montalivet, Bericht üb. d. Zustand d. Franz. Reichs in d. Jahren 1811 u. 1812, 91.
 Montcquis, Höhe üb. d. Meere, 487.
 Montjouy, Fort, Berechn. d. geogr. Länge u. Breite, 498.
 Monumenti Veneziani di varia Letteratura etc., 449.
 Morelli, 445; — Dissertazione intorno etc., 446, 450.
 Müdda, e Gasse in Mekka, 354.
 Müller I., Regierungsrath, Erbauer d. Königsberg. Sternwarte, 476.
 v. Münchow, Ausz. a. e. Briefe, die neue Sternwarte zu Jena betreffend, 192.
 Muratori, 448.
 Muzio Oddi, italienischer Mathematiker, 412.

N.

- Nadeshda, tabellarisches Journal derselben, 82.
 Nangasaki, Hafen, beobachtete Fluthen in demselb., 79.
 Neigung der Planetenbahnen, 391; — Saecular-Aenderung derselb., 393.
 Neifse, Fluß, Höhe üb. dem Meere an mehreren Orten Schlesiens, 182.
 Neu-Tcherkask, das. wurde d. gr. Comet v. 1811 nach d. Conjunct. mit d. Sonne wieder beobachtet, 96.

New-

- Newton, Aeußerung, daß wahrscheinl. alle Cometenbahnen v. d. Parabel abweichen, 24; — Attraction der Sphäroiden, 38.
- Nicolai, Berechn. der Oppos. d. Juno v. 1810, 340; — Rechnungen über die Pallas, 345 — 351; — Anzeige v. Druck- und Schreibe-Fehlern, 383; — Entwicklung von Differenzialformeln, 393.
- Nizza, Höhe üb. d. Meere, 487.
- Noel, Observ. mathem., 429.
- Nukahiwer, Abbild. dav., 63.
- Nutations-Tafeln, Vorschlag zu neuen, 484.

O.

- Oberalp-See, Höhe, 270.
- Octaëteris der Griechen, 539.
- Oder, Fluß, Höhe über dem Meere an mehreren Orten Schleßens, 181.
- Oesterreichische Landes-Vermessung, Vortrefflichkeit derselben, 135 f.
- Ofen, geogr. Lage, 139, 140.
- Ohlau, Fluß, Höhe über d. Meere an mehreren Orten Schleßens, 181.
- Olbers, Beob. d. zweyt. Comet. von 1813, 99; — Vereinfachung seiner Methode, die Cometenbahnen zu berechnen, 504 f.
- Oltmanns, Vergleichung seiner Barometertafeln mit den Horner'schen, 270.
- Ophir, Nachträge zu Seetzen's Abhandlung darüber, 250.
- Orang-Outang von Borneo, 64 f.
- Oriani, Arbeiten über Mercurstheorie, 4.
- Ozanam, Récréations mathématiques, 412.

P.

- Padua, geogr. Breite, 137.
- Pallas, Beob. u. Opposition v. 1813, 346, 347; — Elemente und vorausberechnete Oppos. v. 1814, 348; — Ephemeride für 1814 u. 1815, 349; — neue Verbesserung der Elemente, 577.
- Pappus, Commentar über d. Almagest, 410.
- Parapegmen der Alten, Erklärung, 531.
- Paris, daselbst die älteste geograph. Karte v. J. 1346, 434; — nähere Beschreib. dieser Karte, 437 f.
- Pasquich, Bestimm. d. Breite v. Raab, 138, u. von Erlau, 139.
- Peissenberg, mittl. Temperatur, 276.

Per-

- Pertuis, Stadt, 381.
- Pez, Herausgeber d. Gerbert'schen Geometrie, 495.
- Pezzana, Bibliothekar zu Parma, 434.
- Phipps, Arbeiten über Temperatur des Meerwassers, 68.
- Piazzi, Druckfehler in dessen Stern-Verzeichniß, 35; — Schiefe d. Ekliptik, 283.
- Pingré, Chronologie des Eclipses, 381.
- Pitiscus, Druckfehler in dessen großen Sinus-Tafeln, 293.
- Pizzigani, Verf. von geogr. Karten, 434.
- Plana, Attraction der Sphäroiden, 40; — barom. u. thermometr. Beob., 487.
- Planetenbahnen, relative Lage derselben, 389 f.
- Pleßis, Berechn. d. Coord. für 80000 Punkte zur Construct. geogr. Karten, 258.
- Pond, Verzeichniß von Stern-Declinat., 97; — Vergleichung derselben mit denen von Piazzi, 286; — Uebereinstimmung derselben mit denen von Bradley, 486.
- Preisfragen auswärtiger Academieen, 294.
- Priuli, Antonio, Venet. Reisender, 450.
- Projections, s. Puissant.
- Ptolemäus, giebt keine Anweisung, die Mittagslinie zu ziehen, 409; — ist auch Verf. der Geographie, 410; — Codices von seiner Geographie, 441 — 443, 448; — die Codices seines Almagests sind selten, 449.
- Puissant, Supplément au second livre du Traité de Topographie, 254 f.

Q.

- Quadrant, der Greenwicher M. Q., s. Greenwich und Collimationsfehler.
- Quellen, Vergleichung ihrer Temperat. mit der der Luft, 277.

R.

- Raab, geogr. Lage, 138, 140.
- Rabia el Ainal, Monatsname, 360.
- Ramusio, 441.
- Realp, Höhe, 270.
- Refraction, unzulässige Correction derselben, 337.
- Reise um die Welt von Ru-
sentern, III. Th., 62 f.

Rhein,

- Rhein, Höhe desselben an verschiedenen Ort. d. Schweiz, 266.
 Rheinthal, f. Feer.
 Ricerche storico-critiche sull'opportunità della laguna Veneta etc., 450.
 del Rico, Berechn. der Sternbedeck. für 1814, 211.
 Riefenkuppe, Böhmisches, geograph. Lage, 500.
 Rigaltius, 409.
 Riqueti, Comte de Mirabeau, 381.
 Rochefort, Hafenarbeiten daselbst, 87.
 Rothenbach, de Cometis Tractatus, 427.
 Rosalien-Capelle, geograph. Breite ders., 139.
 Rössboden (Badur), Höhe, 270.
 Rössbodengrat, Höhe, 270.
 Rössbodenstock, Höhe, 270.
 Rossius, f. Erythraeus.
 Rudland, engl. Resident in Mochâ, 235.

S.

- Sala dello Scudo, 445, 446.
 Saluzzo, Höhe über d. Meere, 487.
 Salzburg, geographische Breite, 139.
 Samarkand, Stadt in der Tartarey, 248.
 Sana, f. Szanna.
 Sanct Gallen, geograph. Lage, 201 f.
 Sanct Marcus-Bibliothek in Venedig, 445.
 San Lorenzo, Bibliothek, 441.
 Sanuto, 441.
 Saffi, 448.
 Saturn, beob. Gegenchein im J. 1813, 470 f.
 Schall, Jesuit, Verf. einer grossen Sammlung von Handschriften, 432.
 Schech Hamse, Gehülfe von Seetzen, 360.
 Scherer, Bestimmung der geographischen Lage von St. Gallen, 202 f.
 Scherif von Mekka, 357.
 Schiefe der Ekliptik, bey deren Abnahme findet wahrscheinlich eine periodische Gleichung statt, 5; — Bestimmung derselb. für 1778, 284; — jährl. Aenderung, 334.
 Schiegg, Bestimmung d. geographischen Lage von Bamberg, 297.
 Schooten, Exerc. math., 412.
 Schreibfehler-Anzeige, 383.
 Schweiz, über Veget. u. Clima ders., 263 f.
 Sebid,

- Sebid, geogr. Lage, 353; — afr. Beob. daf., 363.
- Seebblasen, e. Thiergeschlecht, 63 f.
- Seetzen, Auszug aus einem Schreiben über seine Reise, 227; — astronomische Beobachtungen in Arabien, 352 f.
- Segerberg, Höhe, 266.
- Seid Mohammed, Gehülfe v. Seetzen, 354.
- Sentifer Alpen, Höhe, 268.
- Sidlinen Alp, Höhe, 270.
- Signale, mittelst eines Tuches, 301.
- Sinde insulae, 443.
- Sitter, die, Höhe, 267.
- Skiotheren, Schattenfucher, 409, 410.
- Soderini, Giannantonio, Venet. Reisender, 450.
- Soldner, Bemerkungen über Burckhardt's Mondstafeln, 101; — Bestimmung des Azimuths von Altomünster, 167 f.
- Solon, Verbesserung des Griechischen Kalenders, 529.
- Sonne, berichtigte Epochen derselben in einer Tafel der M. C., 384.
- Sonnenfinsterniss, vom 31. Januar 1813, Beob. derselb. 160, 166; — am 7. Septbr. 1820, vorausberechnet, 190; — vom Jahre 1239, 381.
- Sonnenfinsternisse, neue Art sie zu beobachten, 151 f.
- Sonnenhöhen, in Arabien beobachtet, 354 — 370.
- Soligenes, Verbesserung des Kalenders, 537.
- Spina celeste, 428.
- Staffelstein, Azimuth desselben, 303.
- Sternbedeckungen durch den Mond für 1814 berechnet, 211 f.
- Sternbedeckungen, beobachtete,
- α Tauri, d. 8. März 1813 in Florenz, 103.
- γ Librae, d. 17. April 1813 à la Capellette, 103.
- 23 u. 27 Leonis, d. 7. May 1813 in Paris, 198.
- ξ Librae, den 7. Jul. 1813 in Paris, 198.
- μ¹ Sagittarii, d. 11. Jul. 1813 in Paris, 198.
- π Sagittarii, d. 13. Jul. 1813 in Paris, 198.
- ψ Aquarii, d. 13. Aug. 1813 auf Seeberg, 199.
- ξ² Ceti, d. 13. Sept. 1813 à la Capellette, 474.
- 1 ψ Aquarii, d. 7. Oct. 1813 in Königsberg, 487.
- Sternverzeichniss, Harding's, 310
- Strömungen, beobachtete, 77.
- Suidas, 410.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Syene, 411, 545. | mische Beobachtungen das, |
| Sylvester II., f. Gerbert. | 365. |
| Szanna, schöne Landstadt Ara- | Széffar, Monatsname, 354. |
| biens, 235; — geographi- | Szobbaehh, Beduinenstamm, |
| sche Lage, 353; — astrono- | 232. |

T.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Taäs, Stadt am Berge Száb- | Orang - Outang von Bor- |
| bar, 229. | neo, 64. |
| Tafel, zur Correct. der helio- | Tiraboschi, 445. |
| centr. Marsbreite, 330. | Toaldo, Bestimm. der Breite |
| el Táker, Berg mit vielen | von Padua, 157. |
| Heuschrecken, 228. | Toggenburger Alpen, Höhe, |
| Taprobane insula, 442, 443. | 267. |
| Temperatur der Erde u. Luft, | Trevifano, Paolo, Venet. Rei- |
| 277. | sender, 450. |
| Theodosii sphaerica, 413. | Triesnecker, Arbeiten üb. Mer- |
| Theon, Commentator des Pto- | curstheorie, 4; — Bestim- |
| lemaeus, 410. | mung der Massen von Venus |
| Theorem, die Ellipse betref- | und Mars, 5; — Berech- |
| fend, 260. | nung d. Scherer'schen Beob- |
| Thermometer - Messungen, in | achtungen, 206, 208. |
| der Schweiz, 275, 276. | Troughton, Verfertiger eines |
| Thurgau, f. Gallen. | Araeometers, 69; — Gefäfs- |
| Tilefus, Atlas zu der Krusen- | Barometer, 72. |
| stern'schen Reise um die | Turin, Höhe über dem Mee- |
| Welt, 63; — über die See- | re, 487. |
| blasen, 63; — über den | |

U.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ukise, arabische Münze, 243. | Uranus, Oppol v. 1813, 288 f. |
| Ulea, mittl. Temperat., 275. | Urseren an der Matt, Höhe, |
| Umea, mittl. Temp., 275. | 269. |
| Unterwald, Höhe, 268. | Utliberg, Höhe, 266. |

Valen-

V.

- Valentin, zu dessen Reise gehörige Karten, 353.
 Vegetation in der Schweiz, f. Schweiz.
 Venedig, wichtig f. Geschichte und Geographie, 444.
 Venus, Neigung der Bahn, 338; — Beobb. ders. im Jahre 1813, 378.
 Venus - Masse, Wichtigkeit der Kenntniss derselben, 5; — vorzüglich bestimmbar durch Mercur, 6; — Art und Weise, sie dadurch zu bestimmen, 7, 8; — Resultate dieser Bestimmung, 15, 23, 114.
 Vesta, Störungen derselben, 222 f.
 Vier Waldstädter - See, Höhe, 267.
 de Vignolles, widerlegt Casini, 428.
 Vitruv, Ziehung d. Mittagslinie, 397.
 Voss, Erklärung e. Stelle in Virgils Landbau, 551.
 Vries, Auffuchung einer Insel, 82.

W.

- Wahlenberg, Georg. de veget. et clim. in Helvetia etc., 263; — Flora Laponica, 263.
 Wargentin, beob. den Cometen von 1750, 430.
 Wafen, Höhe, 269.
 Weidler's meteor. lucid. ann. 1730, 430.
 Wels, Stadtkirche, geograph. Breite, 139.
 Wiener Sternwarte, geogr. Breite, 138.
 v. Wisniewsky, beobachtet den großen Cometen von 1811 nach seiner Conjunction m. d. Sonne, 96, 480.
 Wunderburg, die, 304.
 Wurm, Arbeiten über Mercurstheorie, 4; — Bestimmung der Massen von Venus und Mars, 5.

X.

- Xun - chi, Chinesischer Kaiser, 432.

Z.

- v. Zach, rectificirte Beobachtungen des großen Cometen von 1811 im ersten Zweige seiner Bahn, 24 f.; — Beobachtung der Mars - Opposition v. 1813, 314; — Beobachtungen des Mars in der größten südlichen und nördlichen heliocentrischen Breite, 316, 325; — Schiefe der Ekliptik, 334; — Fehler in dessen Sonnentafeln (Gotha 1804), 348; — über dessen Bestimmung einiger Fixsterne, 479.
- Zanetti, Dell' origine etc., 434.
- Zeitbestimmung, durch Stern-Azimuthen, 574.
- Zürch, mittl. Temper., 276.
- Zürcher - See, Höhe, 166.
- Zumdorf, Höhe, 270.
- Zurla, il Mappamondo di Fra Mauro etc., 435, 445, 446, 450; — Inhalts - Anzeige dieses Werks, 451, 452.

Berichtigungen

im letzten November-Hefte.

S. 408 Z. 15 und folg. heisst es besser und richtiger: *lineae ad diametrum ordinatae* sagt also eben das aus, was *lineae ad diametrum applicatae* in der lateinischen Uebersetzung von dem Werke des Apollonius über die Kegelschnitte anzeigt, u. s. w.

Ibid. Z. 10 v. u. statt *Linie* lese man *Linien*.

S. 409 u. 410 steht einigemal *Ptolomaeus* statt *Ptolemaeus*.

S. 412 Z. 7 d. Anmerk. statt *Rosoius* lese man *Roffius*.

S. 414 Z. 6. v. u. statt $XD':XD$ lese man: $XD:XD'$.

Ibid. Z. 4 v. u. muss ebenfalls das Verhältniss umgekehrt werden.

S. 415 Z. 2 statt DB' lese man $D'B'$.

S. 417 muss 5 mal, Z. 5, 10, 11, 12 v. u., statt D gesetzt werden D' .

S. 420 Z. 9 ist statt $\frac{\alpha' - \alpha}{2}$ zu setzen $\frac{\alpha - \alpha'}{2}$.

S. 422 Z. 3 statt $C'A$ lese man CA' .

Ibid. Z. 13 statt $C'A', C''A''$ lese man CA', CA'' .

Sechs Monatsstücke, jedes von sechs bis acht Bogen, machen einen Band aus, der mit einem Sachen- und Namen-Register geschlossen wird; zwey Bände einen Jahrgang. Der Preis eines Jahrgangs ist 6 Thaler Conv. Geld, und man kann zu jeder Zeit in das Abonnement eintreten, muß aber den ganzen laufenden Jahrgang nehmen. Einzelne Monatsstücke kosten 14 ggr.

Man macht die Bestellungen bey den Post-Expeditionen und Buchhandlungen jedes Orts, welche die Exemplare von unterzeichneter Buchhandlung auf dem gewöhnlichen Wege beziehen.

Auch sind bey uns zu haben:

de Lindenau Tables barométr. pour faciliter le Calcul des Nivelllements et des mesures des hauteurs par le Baromètre. 4^o.

2 Thlr. 12 gl.

Ejusdem Tabulae Veneris novae et correctae. Fol. min. 2 Thlr.

de Zach Tabulae Motuum Solis novae et corr. quibus acced.

Fixar. praecip. Catal. nov. ex observat. astr. ann. 1787-90 in spec. astr. Goth. habitis. 1792 Fol. min. 6 Thlr.

Ejusdem Fixarum praecip. Catal. nov. etc. (*besonders gedruckt*)

3 Thlr.

— Tabulae mot. fol. etc. Supplement 1804. 1 Thlr. 12 gl.

— Astronom. Tafeln der mittl. geraden Aufsteig. der Sonne etc. zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc. (*beym Observiren zu brauchen*). Gebund. 6 gl.

— Nachrichten von der k. preuss. trigonom. und astronom. Aufnahme von Thüringen etc. und von der Gotha'schen Gradmessung I. Th. 2 Thlr.

— Tabulae spec. Aberr. et Nutat. una cum insignior. 494 stell. zod. Catalogo novo etc. Vol. I. II. 4^o broch. 20 Thlr.

— Tables abrégées et port. du soleil. 1 Thlr. 12 gl.

— Tables abr. et port. de la lune. 2 Thlr. (*Beyde in kl. 4. broch.*)

— Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour 1404 étoiles etc. 8^o broch. 3 Thlr. 12 gl.

Beckersche Buchhandlung in Gotha.





3 9015 06589 5834

A 575935



